

## **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

---

### **MEDICAMENTO FITOTERÁPICO**

*Chamomilla recutita*

**Nome popular:** Camomila

**Parte utilizada:** Capítulos florais

### **APRESENTAÇÕES:**

Pomada de 100 mg em embalagem com bisnaga de 10g.

### **USO TÓPICO**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS**

### **COMPOSIÇÃO:**

#### **Pomada**

#### **Ad-Muc® 100 mg:**

Cada 1 g de pomada contém:

Extrato fluido de *Chamomilla recutita* ..... 100 mg  
(equivalente a 0,30 mg de apigenina - 7 glucosídeo)

Excipientes: tintura de mirra, glicerol, álcoois de lanolina, álcool ceto-estearílico, petrolato branco, petrolato líquido, goma xantana, metilparabeno, óleo de menta, sacarina sódica e água purificada.

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

---

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Ad-Muc®** é indicado para o tratamento das gengivas e da mucosa da oral, nos casos de gengivite (inflamação da gengiva), estomatite (inflamação da mucosa oral) e outras inflamações da cavidade bucal. Também é indicado nas irritações bucais originadas de dentaduras mal ajustadas.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**Ad-Muc®** contém em sua formulação extrato fluido de Camomila (*Chamomilla recutita*), que possui reconhecidas propriedades anti-inflamatórias.

A Camomila possui diversas substâncias anti-inflamatórias que auxiliam no processo de cicatrização de pequenas feridas na mucosa bucal: o camazuleno exerce efeito anti-inflamatório,

enquanto o  $\alpha$ -bisabolol, outro componente da camomila, também apresenta ação anti-inflamatória e promove a regeneração tecidual (cicatrização). Os polissacarídeos presentes na camomila possuem atividade imunoestimulante, ou seja, estimulam os mecanismos de defesa do corpo. O efeito antibacteriano foi demonstrado com o uso do óleo essencial da camomila.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Ad-Muc®** não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, aos parabenos (metilparabeno, presente na formulação), e às plantas da família *Compositae*.

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Gravidez** – Até o momento, não foram relatados efeitos adversos com o uso de **Ad-Muc®** em mulheres grávidas. Entretanto, recomenda-se evitar o uso excessivo durante o período de gestação.

**Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez, desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.**

**Pediatria** – **Ad-Muc®** não deve ser usado por crianças menores de 3 anos de idade.

**Geriatrics (idosos)** – não há restrições específicas para o uso de **Ad-Muc®** em pacientes idosos.

Não são conhecidas interações medicamentosas com o uso de **Ad-Muc®**.

Não são conhecidas interferências em exames laboratoriais com o uso de **Ad-Muc®**.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Contém sacarina sódica (edulcorante).**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Mantenha **Ad-Muc®** em temperatura ambiente (15 a 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto: Pomada marrom-amarelada a marrom, com textura cremosa e odor de menta e camomila.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso tópico. Este medicamento deve ser administrado somente pela via recomendada para evitar riscos desnecessários.

Lavar e secar as mãos antes do manuseio do produto.

Aplicar **Ad-Muc®** duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, após escovar os dentes ou após as refeições, até o desaparecimento dos sintomas ou conforme orientação médica.

Aplicar **Ad-Muc®** na gengiva com a ponta do dedo seco (utilizar o dedo indicador para as regiões externas da gengiva e o dedo polegar para as regiões internas) e massagear as mucosas. A gengiva deve ser massageada em movimentos circulares, dirigidos para a coroa do dente. Em caso de salivação aumentada, deve-se secar a gengiva antes da massagem.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

No caso de esquecimento de dose, passar a pomada ao lembrar, não sobrepondo a dose. Não ultrapassar 2 aplicações diárias.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações de hipersensibilidade.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de superdosagem com o uso de **Ad-Muc®**.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.0974.0172

Registrado e produzido por:

**Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.**

Av. Paulo Ayres, 280 – Taboão da Serra – SP

CEP 06767-220

CNPJ 49.475.833/0001-06

**SAC 0800 724 6522**

Ou

Produzido por:

**Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.**

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039 – Bragança Paulista – SP

CEP: 12929-600

