

FARMARIN CPHD
CONCENTRADO ÁCIDO COM GLICOSE
cloreto de sódio + cloreto de potássio + ASSOCIAÇÃO

APRESENTAÇÕES

Solução para hemodiálise, apresentada em frasco de plástico transparente contendo 5 L nas concentrações: 1:44 – K⁺ 2,0 Ca⁺⁺3,0; 1:44 - K⁺ 1,5 Ca⁺⁺2,5; 1:44 - K⁺ 1,5 Ca⁺⁺3,5; 1:34 - K⁺ 2,0 Ca⁺⁺3,0; 1:34 - K⁺ 1,0 Ca⁺⁺3,5; 1:34 - K⁺ 1,0 Ca⁺⁺2,5 e 1:34 - K⁺ 2,0 Ca⁺⁺2,5.

VIA EXTRACORPÓREA

Uso exclusivo em máquinas de hemodiálise e filtro hemodialisador.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada 1000 mL contém:

	F2 Ácida 1:44 K ⁺ 2,0 Ca ⁺⁺ 3,0	F2 Ácida 1:44 K ⁺ 1,5 Ca ⁺⁺ 2,5	F2 Ácida 1:44 K ⁺ 1,5 Ca ⁺⁺ 3,5	F3 Ácida 1:34 K ⁺ 2,0 Ca ⁺⁺ 3,0	F3 Ácida 1:34 K ⁺ 1,0 Ca ⁺⁺ 2,5	F3 Ácida 1:34 K ⁺ 1,0 Ca ⁺⁺ 3,5	F3 Ácida 1:34 K ⁺ 2,0 Ca ⁺⁺ 2,5
cloreto de sódio	263,0 g	272,0 g	272,0 g	210,80 g	210,70 g	210,70 g	210,70 g
cloreto de potássio	6,71 g	5,70 g	5,7 g	5,22 g	2,30 g	2,30 g	4,70 g
cloreto de cálcio (Sol. 37,5%)	19,92 g	6,40 g	9,0 g	15,55 g	6,40 g	9,00 g	6,40 g
cloreto de magnésio 6H ₂ O	4,59 g	4,90 g	4,9 g	3,55 g	3,50 g	3,50 g	3,50 g
ácido acético	16,2 g	13,30 mL	13,3 mL	6,31 g	11,30 mL	11,30 mL	11,30 mL
glicose anidra	45,0 g	45,0 g	45,0 g	35,00 g	35,00 g	35,00 g	35,00 g
água para injetáveis q.s.p.	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL
Composição eletrolítica após diluição com a fração básica correspondente:							
sódio	138,0 mEq/L	137,0 mEq/L	137,0 mEq/L	138,0 mEq/L	138,0 mEq/L	138,0 mEq/L	138,0 mEq/L
potássio	2,0 mEq/L	1,5 mEq/L	1,5 mEq/L	2,0 mEq/L	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L	2,0 mEq/L
cálcio	3,0 mEq/L	2,5 mEq/L	3,5 mEq/L	3,0 mEq/L	2,5 mEq/L	3,5 mEq/L	2,5 mEq/L
magnésio	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L	1,0 mEq/L
cloreto	106,0 mEq/L	109,0 mEq/L	112,0 mEq/L	109,0 mEq/L	110,5 mEq/L	111,5 mEq/L	111,5 mEq/L
acetato	6,0 mEq/L	4,0 mEq/L	4,0 mEq/L	3,0 mEq/L	3,0 mEq/L	3,0 mEq/L	3,0 mEq/L
bicarbonato	32 mEq/L	33 mEq/L	33 mEq/L	32 mEq/L	32 mEq/L	32 mEq/L	32 mEq/L
glicose	5,5 mMol/L	1,0 g/L	1,0 g/L	5,5 mMol/L	1,0 g/L	1,0 g/L	1,0 g/L

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado em procedimentos de hemodiálise, em casos de insuficiência renal crônica e aguda (intoxicações por substâncias dialisáveis) ou disfunção renal, utilizado em máquinas de hemodiálise.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A hemodiálise é um processo artificial que substitui a função renal quando os rins não funcionam, ou funcionam insuficientemente, ou ainda, quando não existem. Através da hemodiálise se elimina do organismo as escórias, o excesso de água acumulado e ainda se devolve a composição eletrolítica normal ao plasma, por retirada do excesso de eletrólitos e possível reposição de outros. Na hemodiálise uma membrana artificial semipermeável interpõe entre sangue e o líquido de diálise permitindo as trocas necessárias para a retirada e/ou reposição de substâncias do organismo.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

As contraindicações não são diretamente relacionadas com a solução, mas sim ao tratamento por hemodiálise que é contraindicado para pacientes que apresentem impossibilidade ou problemas no acesso vascular, sendo que este é essencial na aplicação da hemodiálise.

O procedimento de hemodiálise deve ter avaliação clínica do médico quanto a quadros que possam ser agravados pelo procedimento, tais como: hipotensão arterial e sangramento.

Durante a gravidez a hemodiálise é possível, mas também problemática, pois acomete grandes riscos para a mãe e a criança.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A variação de cor de incolor para amarelo-pálido é normal, não significando alteração da eficácia do produto.

Prescrição a critério médico.

Usar obrigatoriamente em conjunto com solução de bicarbonato de sódio 8,4% ou Farmacart® Farmarin (bicarbonato de sódio em pó).

Para cada quadro clínico é necessária uma avaliação médica da fórmula a ser utilizada e o tipo de filtro dialisador.

Use somente o frasco com o lacre da tampa intacto.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

F2 Ácida 1:44

Atenção: contém 45g de glicose /1000 mL.

F3 Ácida 1:34

Atenção: contém 35g de glicose/1000 mL.

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).

Prazo de validade: 12 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O conteúdo do frasco, após o rompimento do lacre, é destinado à utilização imediata.

Não reutilizar a embalagem vazia.

Solução límpida, incolor a levemente amarelada, com odor característico.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A utilização deste medicamento ocorrerá em ambiente hospitalar, orientada e executada por profissionais especializados e não dependerá da conduta do paciente.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

O produto não desenvolve reações adversas, desde que observadas prescrições e indicações médicas.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro: 1.1688.0004

Registrado e produzido por:

Farmarin Indústria e Comércio Ltda

Rua Pedro de Toledo, 600 – Guarulhos – SP

CNPJ 58.635.830/0001-75 - Indústria Brasileira

SAC: 0800 101 106

sac@farmarin.com.br

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**USO SOB PRESCRIÇÃO**

B50007139/00

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 12/06/2026.