



**Calmador®**

**(Ácido acetilsalicílico + Cafeína)**

**Laboratório Saúde LTDA**

**Comprimido**

**500 mg + 30 mg**



## **I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Calmador®**

Ácido acetilsalicílico + cafeína

### **APRESENTAÇÃO**

Comprimidos

Display contendo 25 envelopes com 4 comprimidos.

### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido contém:

ácido acetilsalicílico.....	500 mg
cafeína.....	30 mg

Excipientes: celulose microcristalina e amidoglicolato de sódio



## II – INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Calmador<sup>®</sup> é indicado como analgésico e antipirético, especialmente para o tratamento de dores, redução da febre e dor de cabeça.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento é um analgésico com ação antipirética, portanto, atua aliviando a dor e a febre. Por possuir a substância cafeína potencializa a ação analgésica do ácido acetilsalicílico.

A cafeína apresenta ainda um efeito estimulante no humor, no estado de alerta e na atenção, promove a constrição (diminuição do calibre) dos vasos sanguíneos do cérebro, o que pode contribuir para o alívio das dores de cabeça.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Calmador<sup>®</sup> é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, a outros salicilatos ou a qualquer outro componente da fórmula do produto.**

Este medicamento é contraindicado para pacientes predispostos a dispepsias (indigestão), ou sabidamente portadores de alguma lesão da mucosa gástrica (úlceras).

Também é contraindicado para pacientes com intolerância gástrica ao ácido acetilsalicílico e portadores de lesão hepática grave, além de pacientes hemofílicos (com problemas de sangramento). Deve-se tomar cuidado em pacientes com função renal comprometida.

**Calmador<sup>®</sup> é contraindicado nos três primeiros meses de gravidez, e após esse período, só deve ser empregado nos casos de absoluta necessidade e sob orientação médica. Sua utilização também é contraindicada em grávidas no final da gestação por prolongar o tempo de sangramento favorecendo a ocorrência de hemorragias.**

A terapia com o ácido acetilsalicílico deverá ser suspensa, no mínimo, 2 semanas antes de cirurgias.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use este medicamento caso tenha asma ou úlcera no estômago.

**Não use este medicamento caso tenha histórico de asma causada por uso anterior deste ou de outro medicamento com ação parecida ou caso tenha problemas no estômago.**

**O uso de ácido acetilsalicílico pode causar a Síndrome de Reye, uma doença rara, mas grave, em crianças ou adolescentes com sintomas gripais ou catapora.**

**O tratamento com este medicamento não deve se prolongar por mais de 7 dias, a menos que recomendado pelo médico, pois pode causar problemas nos rins, estômago, intestino, coração e vasos sanguíneos.**

O uso de ácido acetilsalicílico deve ser interrompido pelo menos 2 semanas antes de qualquer procedimento cirúrgico.

Durante o tratamento, recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. A ação irritante do álcool no estômago é aumentada quando é ingerido com este medicamento, podendo aumentar o risco de úlcera e sangramento.

Pacientes com intolerância ao álcool, ou seja, pacientes que reagem até mesmo a pequenas quantidades de certas bebidas alcoólicas, apresentando sintomas como espirros, lacrimejamento e



rubor pronunciado da face, demonstram que podem ser portadores de síndrome de asma analgésica prévia não diagnosticada.

Em tratamentos prolongados, recomenda-se o controle periódico do quadro sanguíneo através de seu médico. Este medicamento, por possuir ácido acetilsalicílico pode inibir a função plaquetária e prolongar o tempo de sangramento (favorecer a hemorragia), sendo este efeito reversível com a suspensão do medicamento. Assim, deve-se ter cautela em pacientes portadores de doenças intrínsecas da coagulação ou em uso de anticoagulantes, tais como os cumarínicos (fenindiona, varfarina).

Atenção especial deve ser dada para pacientes que possuem:

- problemas hematológicos (sanguíneos) e tomam anticoagulantes.
- diabetes e que tomam hipoglicemiantes (glibenclamida, clorpropamida, tolazamida, glicazida, fenformina).
- portadores de úlcera péptica.
- lúpus eritematoso.
- angina (dores fortes no peito).
- problemas renais e hepáticos.
- suspeita de dengue

A reação de choque anafilático (urticária/coceira, inchaço dos lábios e olhos, congestão nasal, tontura, dificuldade de respirar) pode ocorrer principalmente em indivíduos sensíveis. Portanto, o ácido acetilsalicílico deve ser prescrito com cuidado a pacientes asmáticos ou atópicos.

**Uso na gravidez e amamentação** - este medicamento é absolutamente contraindicado nos três primeiros meses de gravidez e após esse período, só deve ser empregado nos casos de absoluta necessidade e sob orientação médica.

No caso particular do ácido acetilsalicílico, que devido a vários mecanismos prolonga o tempo de sangramento, a sua atividade e utilização é contraindicada em grávidas no fim da gestação.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

A amamentação deve ser evitada durante e até 48 horas após o uso deste medicamento devido a possível excreção pelo leite materno.

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Uso em idosos** - não foi relatado restrições quanto ao uso do produto em pacientes com mais de 65 anos.

### **Interações Medicamentosas:**

#### **Interações medicamento-medimento:**

**ácido acetilsalicílico aumenta a ação de:** varfarina; fenindiona; heparina; glimepirida; hidrocortisona e aldosterona; metotrexato; insulina (deve-se ajustar a dosagem desta substância); tiludronato e anticonvulsivantes.

**ácido acetilsalicílico diminui a ação de:** esmolol; sotalol; bisoprolol; carvedilol; metoprolol; betaxolol; carteolol; levobunolol; metilpranolol; timolol; atenolol; propranolol; captopril; enalapril; furosemida; naproxeno; cetoprofeno; ibuprofeno; piroxicam; tenoxicam; meloxicam; diclofenaco; aceclofenaco; sulindac; nimesulida; fentiazac; fenitoína; probenecida; espirolactona e sulfimpirazona.

**ácido acetilsalicílico tomado juntamente com:**



**alendronato de sódio:** pode resultar no aumento de náuseas e diarreia;

**drogas corticosteroides:** a hidrocortisona e a aldosterona podem aumentar o risco de úlceras pépticas; diltiazem: risco de aumento de sangramento;

**anti-hipertensivos:** podem mascarar seus benefícios terapêuticos, especialmente aqueles que são diuréticos, tais como a furosemida, espironolactona, ou tiazídicos;

**lítio:** o ácido acetilsalicílico pode aumentar a concentração de lítio no sangue;

**vacina contra a varicela:** pode resultar na Síndrome de Reye, doença rara, mas grave. Recomenda-se tomar ácido acetilsalicílico e seus derivados somente 6 meses após tomar a vacina;

**verapamil:** pode aumentar o risco de sangramento;

**zafirlucaste:** pode aumentar a concentração deste medicamento no sangue, aumentando seus efeitos colaterais;

**barbituratos (fenobarbital) e outros sedativos (lexotan, bromazepam):** podem mascarar os sintomas respiratórios da superdosagem com o ácido acetilsalicílico.

**Drogas que aumentam os efeitos do ácido acetilsalicílico:** acetazolamida, cimetidina, ácido para-aminobenzoico.

**Drogas que diminuem os efeitos do ácido acetilsalicílico:** antiácidos (uso contínuo), colestiramina (deve-se tomar somente após 30 minutos da tomada do ácido acetilsalicílico).

**A cafeína aumenta:** a cafeína aumenta a excreção renal do lítio.

**A cafeína tomada juntamente com:** ansiolíticos - bromazepam: podem ter a sua ação ansiolítica anulada; ginkgo biloba: aumenta o sangramento.

**Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Calmador® é um comprimido circular, liso e branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Uso oral**

Uso adulto: tomar 1 a 2 comprimidos. Se necessário, repetir de 4 em 4 horas, até o limite de 6 comprimidos ao dia.



Dose máxima diária recomendada: 6 comprimidos/dia que equivale a 3g/dia de ácido acetilsalicílico e 180mg/dia de cafeína.

Tomar preferencialmente após as refeições, com um pouco de água.

Este medicamento não deve ser administrado em altas doses, ou por períodos prolongados, sem controle médico.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não há motivos significativos para se preocupar caso esqueça de tomar uma dose do medicamento.

Caso necessite utilizá-lo novamente, retome o seu uso da maneira recomendada, respeitando os intervalos e horários estabelecidos, não devendo dobrar a dose porque esqueceu de tomar a anterior.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Ao classificar a frequência das reações, utilizamos os seguintes parâmetros:

**Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).**

**Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).**

**Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento).**

**Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento).**

**Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento).**

**Reações comuns:** reação alérgica; ressecamento da pele; irritação estomacal; náuseas, vômitos; *Síndrome de Stevens-Johnson*.

**Reações raras:** hipoglicemia: (suor em excesso, sonolência, fraqueza, tremores, visão dupla ou turva, fome súbita, confusão mental); choque anafilático (urticária/coceira, inchaço dos lábios e olhos, congestão nasal, tontura, dificuldade de respirar); destruição das plaquetas; anemia hemolítica; hemorragia silenciosa no estômago; úlcera péptica com ou sem hemorragia; ototoxicidade (inflamação do ouvido), sendo mais comum quando há a utilização de altas doses e por tempo prolongado; insuficiência renal, principalmente em pacientes que dependem das prostaglandinas para funcionamento renal; asma: tem sido reportados casos de crise asmática, particularmente em pacientes com intolerância ao ácido acetilsalicílico; angina (dores no peito): pode piorar os ataques de angina aumentando a sua frequência; em doenças virais pode ser manifestada a Síndrome de Reye.

Doses elevadas de cafeína podem provocar taquicardia, náuseas, vômitos, dor no estômago, dores de cabeça, insônia, tremores e raramente, ritmo cardíaco irregular, arritmias, úlcera gastroduodenal, convulsões, distúrbios visuais e abortamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**



## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Doses elevadas de cafeína podem provocar taquicardia, náuseas, vômitos, dor no estômago, dores de cabeça, insônia, tremores e raramente, ritmo cardíaco irregular, arritmias, úlcera gastroduodenal, convulsões, distúrbios visuais e abortamento.

Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. No caso de superdose acidental, procurar orientação médica para obter o tratamento necessário, de acordo com a gravidade da intoxicação.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.**



**III – DIZERES LEGAIS:**

Registro nº 1.0049.0106

**Registrado e Produzido por:**

**Laboratório Saúde LTDA**

Av. Comendador Tavares, nº 84 e 89 – Bairro Navegantes – Porto Alegre – RS.

C.N.P.J.: 91.671.792/0001-81 – Indústria Brasileira

**SAC 51 3024-4422**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em (01/12/2025).**





Anexo B  
Histórico de Alterações de Bula

Dados da Submissão Eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	No. Expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
14/09/2018	0898815183	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	14/09/2018	0898815183	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	14/09/2018	Versão Inicial	VP/VPS	Comprimido
13/02/2019	0135982197	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	13/02/2019	0135982197	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	13/02/2019	Identificação do Medicamento	VP/VPS	Comprimidos
							Dizeres Legais		
31/01/2020	0298813205	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	31/01/2020	0298813205	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	31/01/2020	Dizeres Legais	VP/VPS	Comprimidos
06/11/2020	3893949205	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	06/11/2020	3893949205	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	06/11/2020	Dizeres Legais	VP/VPS	Comprimidos
13/05/2025	0644851252	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	13/05/2025	0644851252	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	13/05/2025	Dizeres Legais	VP/VPS	Comprimidos
22/05/2025	0689094256	10450 - SIMILAR - Notificação da Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	22/05/2025	0689094256	10450 - SIMILAR - Notificação da Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	22/05/2025	Item I - Identificação do Medicamento Item 4 – O que devo saber antes de usar este medicamento; Item 5 – Onde, como e por quanto tempo posso guardar	VP/VPS	Comprimidos

							esse medicamento. Item III – Dizeres Legais		
		10450 - SIMILAR - Notificação da Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12			10450 - SIMILAR - Notificação da Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12		Item 4 – O que devo saber antes de usar este medicamento;  Item 5 – Onde, como e por quanto tempo posso guardar esse medicamento.  Item III - Dizeres Legais	VP/VPS	Comprimidos