



# **maleato de dexclorfeniramina**

**Solução 2mg/5mL**

---

## MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES AO PACIENTE



# maleato de dexclorfeniramina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

---

## APRESENTAÇÕES

**Solução 2mg/5mL**

Embalagens contendo 1 e 50 frascos com 100mL + 1 e 50 copos-medida.

## USO ORAL

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS**

## COMPOSIÇÃO

Cada 5mL da solução contém:

maleato de dexclorfeniramina.....2mg

Veículo q.s.p.....5mL

Excipientes: álcool etílico, sorbitol, sacarose, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, aroma de framboesa, corante vermelho ponceaux e água de osmose reversa.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O maleato de dexclorfeniramina é destinado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação na pele) e eczemas alérgicos (dermatite).

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O maleato de dexclorfeniramina é um anti-histamínico (antialérgico), por isso ajuda a reduzir os sintomas da alergia, prevenindo os efeitos da histamina, que é uma substância produzida pelo próprio organismo.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar.

O maleato de dexclorfeniramina, como os demais anti-histamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs).

**Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

##### Advertências

Mantenha este medicamento fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Não permita que outra pessoa utilize este medicamento e não o utilize para tratar outras doenças. Não utilize este produto com maior frequência ou em doses maiores do que o recomendado na bula.

**Se você teve qualquer alergia séria ou qualquer reação incomum a outro produto para alergia, tosse ou resfriado, ou se você desenvolveu algum tipo de reação enquanto estava tomando maleato de dexclorfeniramina, entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de continuar o tratamento com este produto.**

Este medicamento pode afetar o comportamento de algumas pessoas, tornando-as sonolentas, com tontura e estado de alerta diminuído. Tenha certeza de como você reage a este medicamento antes de realizar atividades que possam ser perigosas se você não estiver alerta.

**Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.**

Não se esqueça de dizer ao seu médico ou farmacêutico, antes de iniciar o tratamento com este produto, se você tem glaucoma ou algum outro problema ocular, problemas no intestino ou estômago, úlcera, próstata aumentada, entupimento das vias urinárias ou dificuldade em urinar, doença no coração, pressão alta, problemas na tireoide ou problemas respiratórios, pois este medicamento deve ser usado com cautela nestas situações.

**Este medicamento pode causar doping.**

#### **Precauções**

Os antialérgicos têm efeito aditivo com o álcool e outros depressores do Sistema Nervoso Central, como sedativos, hipnóticos e tranquilizantes.

#### **Uso em idosos**

Em pacientes com mais de 60 anos de idade poderá causar maior sonolência, vertigem e pressão baixa.

#### **Uso em crianças**

Os antialérgicos podem causar excitação em crianças.

#### **Uso durante a gravidez e amamentação**

A segurança durante a gravidez ainda não foi comprovada. O maleato de dexclorfeniramina poderá ser utilizado durante os primeiros dois trimestres de gestação somente se claramente necessário e sob estrito acompanhamento médico.

**Este produto não deverá ser utilizado durante o terceiro trimestre de gestação porque recém-nascidos e prematuros poderão apresentar reações severas aos anti-histamínicos. Não foi comprovado se este medicamento é excretado no leite materno e, portanto, deve haver precaução na administração a mulheres que estão amamentando.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista**

#### **Interações Medicamentosas**

##### **Interações medicamento-medimento**

Os IMAO's prolongam e intensificam os efeitos dos antialérgicos, podendo ocorrer hipotensão grave, barbitúricos e depressores do SNC podem potencializar os efeitos sedativos da dexclorfeniramina, antidepressivos tricíclicos. A ação dos anticoagulantes orais pode ser diminuída por anti-histamínicos.

Depressores do Sistema Nervoso Central como sedativos, hipnóticos e tranquilizantes, pode potencializar os efeitos sedativos.

##### **Interações medicamento-doenças**

A epilepsia pode potencializar os efeitos sedativos.

#### **Interações em testes laboratoriais**

Comunique seu médico ou farmacêutico se você for fazer algum teste de pele para detectar alergia. O tratamento com maleato de dexclorfeniramina deverá ser suspenso dois dias antes da execução do teste, pois este medicamento poderá afetar os resultados.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Atenção: Contém o corante vermelho ponceaux, que pode eventualmente, causar reações alérgicas.**

**Este medicamento contém 4,4275% de álcool (etanol) e pode causar intoxicação, especialmente em crianças.**

**Atenção: contém 100mg de sacarose/mL.**

**Atenção: Contém sacarose e sorbitol. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com insuficiência de sacarose-isomaltase.**

**Atenção: Deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (DE 15°C A 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Características do medicamento:** Solução límpida de coloração vermelho alaranjado com aroma e sabor de framboesa.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **USO ORAL**

Adultos e crianças maiores de 12 anos: 5mL 3 a 4 vezes por dia. Não ultrapassar a dose máxima de 12mg/dia (ou seja, 30mL/dia).

Crianças de 6 a 12 anos: 2,5mL três vezes por dia. Um máximo de 6mg diários (ou seja, 15mL/dia).

Crianças de 2 a 6 anos: 1,25mL três vezes por dia. Um máximo de 3mg diários (ou seja, 7,5mL/dia).

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de tomar uma dose na hora certa, tome-a assim que possível e depois reajuste os horários de acordo com esta última tomada, continuando o tratamento de acordo com os novos horários programados. Não dobre a dose para compensar a dose esquecida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Poderá ocorrer sonolência leve ou moderada durante o uso deste medicamento.

**Reações Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

Sonolência leve ou moderada durante o uso;

**Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

**Cardiovasculares:** pressão baixa; dor de cabeça; palpitação;

**Gerais devido o uso de antialérgico:** urticária; prurido; erupções na pele; sensibilidade na pele quando exposta ao sol; aumento do suor no corpo; calafrios; fraqueza; choque anafilático (reação alérgica grave);

**Gastrintestinais:** azia; desconforto gástrico; constipação; náusea;

**Geniturinários:** dor ao urinar; aumento da quantidade de micções; alterações no ciclo menstrual;

**Hematológicos:** anemia hemolítica; anemia hipoplásica; trombocitopenia e agranulocitose;

**Neurológicos:** visão borrada; nervosismo;

**Respiratórios:** espessamento das secreções brônquicas; compressão do tórax; desconforto nasal; dificuldade respiratória.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Na ocorrência de superdosagem, o tratamento de emergência deve ser iniciado imediatamente. A dose letal de dexclorfeniramina estimada no homem é de 2,5 a 5,0mg/kg.

As manifestações podem variar desde depressão do Sistema Nervoso Central como: sedação, apneia (suspensão da respiração), redução do estado de alerta mental, colapso no coração, excitação (insônia, alucinações, tremores ou convulsões) até morte.

Outros sinais e sintomas podem incluir tontura, zumbidos, ataxia (incapacidade de coordenar os movimentos musculares), visão opaca e pressão baixa. Excitação, assim como os sinais e sintomas semelhantes à ação da atropina (manifestações no estômago e intestino, boca seca, pupilas fixas e dilatadas, rubor e aumento da temperatura do corpo), são mais observadas em crianças.

**Tratamento:** considerar as medidas padrão para remoção de qualquer droga que não foi absorvida pelo estômago, tais como: absorção por carvão vegetal ativado administrado sob a forma de suspensão em água e lavagem gástrica. O agente preferido para a lavagem gástrica, em crianças, é a solução salina fisiológica. Em adultos, poderá ser usada água filtrada; entretanto, antes de se proceder à instilação seguinte, deverá ser retirado o maior volume possível do líquido já administrado. Os agentes catárticos salinos atraem água para o intestino por osmose e, portanto, podem ser valiosos por sua ação diluente rápida do conteúdo intestinal. Após administrar-se tratamento de emergência, o paciente deverá permanecer sob observação clínica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

Registro nº 1.0370.0309

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659

Registrado e produzido por:

**LABORATÓRIO TEUTO**

**BRASILEIRO S/A.**

CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA

CEP 75132-140 – Anápolis – GO



**SAC** | 0800 62 18 00†  
**teuto.com.br**

**Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 01/07/2014.**

## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

| Dados da submissão eletrônica |                   |                                                                            | Dados da petição/notificação que altera bula |                   |                                                                            |                   | Dados das alterações de bulas                                    |                  |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº. do expediente | Assunto                                                                    | Data do expediente                           | Nº. do expediente | Assunto                                                                    | Data de aprovação | Itens de bula                                                    | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                                    |
| 17/10/2014                    | 0934779/14-8      | 10459 - GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12         | 17/10/2014                                   | 0934779/14-8      | 10459 - GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12         | 17/10/2014        | Versão inicial                                                   | VP               | -0,4mg/mL sol or ct fr vd amb x 100mL + cp med 10mL.<br>-0,4mg/mL sol or ct 50 fr vd amb x 100mL + 50 cp med 10mL (emb hosp). |
| 15/12/2014                    | 1122638/14-2      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC – 60/12 | 15/12/2014                                   | 1122638/14-2      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC – 60/12 | 15/12/2014        | Identificação do Medicamento                                     | VP               | -0,4mg/mL sol or ct fr vd amb x 100mL + cp med 10mL.<br>-0,4mg/mL sol or ct 50 fr vd amb x 100mL + 50 cp med 10mL (emb hosp). |
| 02/02/2017                    | 0181767/17-1      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC – 60/12 | 02/02/2017                                   | 0181767/17-1      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC – 60/12 | 02/02/2017        | 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? | VP               | -0,4mg/mL sol or ct fr vd amb x 100mL + cp med 10mL.<br>-0,4mg/mL sol or ct 50 fr vd amb x 100mL + 50 cp med 10mL (emb hosp). |
| 22/07/2021                    | 2853177/21-1      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC – 60/12 | 22/07/2021                                   | 2853177/21-1      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC – 60/12 | 22/07/2021        | N/A                                                              | VP               | -0,4mg/mL sol or ct fr vd amb x 100mL + cp med 10mL.<br>-0,4mg/mL sol or ct 50 fr vd amb x 100mL + 50 cp med 10mL (emb hosp). |
| 14/02/2023                    | 0152021/23-0      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula –             | 14/02/2023                                   | 0152021/23-0      | 10452 - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula –             | 14/02/2023        | Dizeres legais (SAC)                                             | VP               | -0,4mg/mL sol or ct fr vd amb x 100mL + cp med 10mL.<br>-0,4mg/mL sol or ct 50 fr vd amb x 100mL + 50 cp                      |

|            |   |                                                                                           |            |   |                                                                                           |            |                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                           |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |   | RDC – 60/12                                                                               |            |   | RDC – 60/12                                                                               |            |                                                                                                                                                                         |    | med 10mL (emb hosp).                                                                                                                      |
| 24/09/2025 | - | 10452 -<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>RDC – 60/12 | 24/09/2025 | - | 10452 -<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>RDC – 60/12 | 24/09/2025 | Apresentação<br>4. O que devo saber<br>antes de usar este<br>medicamento?<br>5.Onde, como e por<br>quanto tempo posso<br>guardar este<br>medicamento?<br>Dizeres legais | VP | -0,4mg/mL sol or ct fr vd<br>amb x 100mL + cp med<br>10mL.<br>-0,4mg/mL sol or ct 50 fr<br>vd amb x 100mL + 50 cp<br>med 10mL (emb hosp). |