

# **topiramato**

VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Comprimido Revestido

25mg, 50mg e 100mg

# topiramato

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

## APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos de 25mg de topiramato em embalagem com 60 comprimidos.

Comprimidos revestidos de 50mg de topiramato em embalagem com 60 comprimidos.

Comprimidos revestidos de 100mg de topiramato em embalagem com 60 comprimidos.

## USO ORAL

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

### Cada comprimido revestido de topiramato 25mg contém:

topiramato ..... 25mg

Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, hipromelose, dióxido de titânio, polietilenoglicol.

### Cada comprimido revestido de topiramato 50mg contém:

topiramato ..... 50mg

Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, opadry amarelo (hipromelose, macrogol, dióxido de titânio e óxido de ferro).

### Cada comprimido revestido de topiramato 100mg contém:

topiramato ..... 100mg

Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, opadry amarelo (hipromelose, macrogol, dióxido de titânio e óxido de ferro).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O topiramato é indicado em monoterapia tanto em pacientes com epilepsia recentemente diagnosticada como em pacientes que recebiam terapia adjuvante e serão convertidos à monoterapia.

O topiramato é indicado, para adultos e crianças, como adjuvante no tratamento de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária e crises tônico-clônicas generalizadas primárias.

O topiramato é indicado, também, para adultos e crianças como tratamento adjuvante das crises associadas à Síndrome de Lennox-Gastaut.

O topiramato é indicado, em adultos, como tratamento profilático da enxaqueca. O uso de topiramato para o tratamento agudo da enxaqueca não foi estudado.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O topiramato é um medicamento anticonvulsivante, com múltiplos mecanismos de ação, eficaz no tratamento da epilepsia e na profilaxia da enxaqueca. O topiramato influencia vários processos químicos no cérebro, reduzindo a hiperexcitabilidade de células nervosas, que pode causar crises epiléticas e crises de enxaqueca.

Para o tratamento em pacientes recém-diagnosticados com epilepsia que só tomam o topiramato ou que passarão a tomar somente o topiramato, o efeito terapêutico foi observado dentro de 2 semanas de tratamento.

Na terapia associada a outros medicamentos em adultos e crianças com convulsões parciais ou generalizadas tônico-clônicas, o efeito terapêutico foi observado nas primeiras quatro semanas de tratamento.

Para a prevenção de enxaqueca em adultos, o efeito terapêutico foi observado dentro do primeiro mês após início do tratamento.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar topiramato se você for alérgico a qualquer ingrediente do produto. Não deve ser administrado durante a gravidez.

Na indicação de profilaxia da enxaqueca, o topiramato é contraindicado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar, caso não estejam utilizando um método contraceptivo altamente eficaz.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

**Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano:** Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Avise seu médico sobre problemas de saúde ou alergias que você tem ou teve no passado.

Informe ao seu médico se você tem ou teve pedras nos rins. Ele deverá recomendar que você ingira muito líquido enquanto estiver se tratando com topiramato. Informe seu médico se você apresentar problemas de visão e/ou dor nos olhos.

#### **Interrupção do tratamento com topiramato**

Nos pacientes com ou sem histórico de crises epiléticas ou epilepsia, as drogas antiepiléticas, incluindo o topiramato, devem ser gradativamente descontinuadas, para minimizar a possibilidade de crises epiléticas ou aumento da frequência de crises epiléticas. Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Verifique sempre se você tem a quantidade necessária de comprimidos e nunca deixe que falem.

Nas situações onde a retirada rápida de topiramato é por solicitação médica, seu médico deverá realizar monitoração apropriada.

#### **Insuficiência renal**

A principal via de eliminação do topiramato inalterado e seus metabólitos é através dos rins. A eliminação pelos rins é dependente da função renal e independe da idade. Pacientes com insuficiência renal moderada ou severa podem levar de 10 a 15 dias para atingir as concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio, em comparação com o período de 4 a 8 dias, observado em pacientes com função renal normal.

Em todos os pacientes, a titulação da dose deverá ser orientada pelo resultado clínico (isto é, controle das crises, evitando efeitos colaterais), considerando-se que pacientes sabidamente portadores de insuficiência renal poderão precisar de um tempo mais longo para alcançar o estado de equilíbrio, a cada dose.

Informe ao seu médico se você tem ou teve problemas renais.

#### **Hidratação**

Diminuição e ausência da transpiração foram reportadas em associação com o uso de topiramato. A diminuição da transpiração e o aumento da temperatura corpórea podem ocorrer especialmente em crianças jovens expostas ao calor.

A hidratação adequada durante o uso de topiramato é muito importante. A hidratação pode reduzir o risco de pedras nos rins. Ingerir líquidos antes e durante atividades como exercícios físicos ou exposição a temperaturas elevadas pode reduzir o risco de eventos adversos relacionados ao calor.

#### **Transtornos do humor / Depressão**

Um aumento na incidência de transtornos do humor e depressão tem sido observado durante o tratamento com topiramato. Informe ao seu médico se você apresentar alterações de humor ou depressão.

#### **Ideação suicida/ suicídio**

O uso de medicamentos para tratar a epilepsia, inclusive topiramato, aumenta o risco de pensamentos ou comportamentos suicidas em pacientes que utilizam estes medicamentos para qualquer indicação. O mecanismo para este risco não é conhecido.

**Se em algum momento você tiver pensamentos ou comportamentos suicidas, entre em contato com seu médico imediatamente.**

#### **Reações cutâneas graves**

Reações cutâneas graves [síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET)] foram relatadas em

pacientes utilizando topiramato. A maioria dos casos ocorreram em pacientes utilizando concomitantemente outros medicamentos conhecidamente associados à SSJ e NET. Houve, também, vários casos em pacientes recebendo monoterapia. Caso haja suspeita de SSJ ou NET, o tratamento com topiramato deve ser descontinuado. Avise seu médico a respeito de outros medicamentos que você esteja tomando.

### **Cálculos renais (nefrolitíase)**

Alguns pacientes, especialmente aqueles com predisposição à formação de cálculos renais, podem ter risco aumentado de formação de cálculo renal e sinais e sintomas associados, tais como cólica renal, dor renal e dor em flanco (dor na lateral do abdômen).

Fatores de risco de cálculos renais incluem antecedentes de cálculo renal, histórico familiar de nefrolitíase e hipercaliúria (nível elevado de cálcio na urina) (vide “O que devo saber antes de usar este medicamento – Acidose metabólica”). Nenhum desses fatores de risco pode antecipar com certeza a formação de cálculo durante tratamento com topiramato. Além disso, pacientes utilizando outros medicamentos associados à possibilidade de ocorrência de nefrolitíase podem ter um risco aumentado.

Informe ao seu médico se você tem ou teve pedras nos rins, ou se há histórico familiar de cálculo renal.

### **Insuficiência hepática**

O topiramato deve ser administrado com cuidado em pacientes com insuficiência hepática, uma vez que a depuração do topiramato pode estar reduzida neste grupo de pacientes.

### **Síndrome da miopia aguda associada a glaucoma agudo de ângulo fechado secundário**

Uma síndrome consistindo de miopia aguda associado com glaucoma de ângulo fechado secundário tem sido relatada em pacientes em uso de topiramato. Os sintomas incluem início agudo de redução da acuidade visual e/ou dor ocular.

Achados oftalmológicos podem incluir alguns ou todos os seguintes: miopia, midríase (dilatação da pupila), redução da câmara anterior, hiperemia ocular (vermelhidão), descolamento da coróide, descolamento do epitélio pigmentado da retina, estrias maculares e aumento da pressão intraocular. Os sintomas ocorrem, caracteristicamente, no primeiro mês após do início do tratamento com topiramato. Ao contrário do glaucoma de ângulo fechado primário, que é raro em pessoas com menos de 40 anos, o glaucoma de ângulo fechado secundário associado com topiramato tem sido relatado tanto em pacientes pediátricos como adultos. O tratamento inclui a interrupção do topiramato, o mais rápido possível de acordo com a avaliação do médico, e medidas apropriadas para reduzir a pressão intraocular. Estas medidas geralmente resultam na redução da pressão intraocular.

Elevada pressão intraocular de qualquer natureza, se não for tratada, pode acarretar em graves sequelas, incluindo perda permanente da visão.

Informe seu médico se você apresentar problemas de visão, redução da acuidade visual, miopia, vermelhidão e/ou dor nos olhos.

### **Alterações no campo visual**

Alterações no campo visual têm sido relatadas em pacientes que receberam topiramato, independente da pressão intraocular elevada. Em estudos clínicos, a maioria destas alterações foram reversíveis após a interrupção do tratamento com topiramato. Se ocorrerem problemas visuais durante qualquer momento do tratamento com topiramato, você deve entrar em contato com seu médico, pois ele decidirá se é necessário interromper o tratamento.

### **Acidose metabólica**

Hipercloremia (aumento de cloro no sangue), hiato não aniônico, acidose metabólica (isto é, redução do bicarbonato sérico abaixo do intervalo de referência normal na ausência de alcalose respiratória) estão associados ao tratamento com topiramato. A redução no bicarbonato ocorre geralmente no início do tratamento, mas pode ocorrer ao longo da duração do tratamento.

A acidose metabólica crônica não tratada, situação em que o pH do sangue se torna ácido, pode aumentar o risco de nefrolitíase (pedras nos rins) ou nefrocalcinose (depósitos de cálcio nos rins) [vide “O que devo saber antes de usar este medicamento? - Cálculos renais (nefrolitíase)”].

Dependendo das condições de base, recomenda-se avaliação adequada, incluindo níveis de bicarbonato sérico, durante o tratamento com topiramato. Se a acidose metabólica (acidez do sangue) ocorrer e persistir, deve-se considerar redução da dose ou interrupção do topiramato (usando redução gradual da dose).

### **Hiperamonemia e encefalopatia**

Hiperamonemia (aumento da amônia no sangue) com ou sem encefalopatia foi relatada no tratamento com topiramato (vide “Quais os males que este medicamento pode me causar?”). O risco para hiperamonemia com topiramato parece

estar relacionado à dose. A hiperamonemia foi relatada com mais frequência quando o topiramato foi utilizado concomitantemente ao ácido valproico (vide “Interações medicamentosas”).

Os sintomas clínicos de encefalopatia hiperamonêmica muitas vezes incluem alterações agudas no nível de consciência e/ou da função cognitiva com letargia. Na maioria dos casos, a encefalopatia hiperamonêmica desaparece com a descontinuação do tratamento. Em pacientes que desenvolvem letargia inexplicável, ou alterações no estado mental associadas à monoterapia com topiramato ou terapia adjuvante, recomenda-se que o médico considere encefalopatia hiperamonêmica e medição dos níveis de amônia.

### **Suplementação nutricional**

Informe seu médico se você perder peso durante o tratamento com topiramato, para que ele possa considerar a suplementação da dieta ou o aumento da ingestão de alimentos.

### **Efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas**

O topiramato age sobre o sistema nervoso central, podendo produzir sonolência, tontura ou outros sintomas relacionados. Isto pode causar distúrbios visuais e/ou visão turva. Tais reações adversas podem ser potencialmente perigosas para pacientes dirigindo veículos ou operando máquinas.

Certifique-se de que o medicamento não altera seu estado de alerta antes de você dirigir, operar máquinas ou executar tarefas que podem ser perigosas, caso você não esteja atento.

**Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas caso não esteja atento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.**

**O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaio ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.**

### **Lactose**

**Atenção: Contém lactose monoidratada. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

**Atenção: Contém lactose monoidratada.**

Apresentação de 25 mg:

**Atenção: Contém 30,85 mg de lactose monoidratada/comprimido revestido.**

Apresentação de 50 mg:

**Atenção: Contém 61,7 mg de lactose monoidratada/comprimido revestido.**

Apresentação de 100 mg:

**Atenção: Contém 123,4 mg de lactose monoidratada/comprimido revestido.**

### **Corante**

Apresentação de 25 mg:

**Atenção: Contém o corante dióxido de titânio que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.**

Apresentação de 50 mg e 100 mg:

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

### **Gravidez e Amamentação**

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Seu médico decidirá se você poderá tomar topiramato. Como qualquer outro anticonvulsivante, há um risco para o feto se você estiver usando topiramato durante a gravidez. Informar ao médico se está amamentando.

Antes do início do tratamento com topiramato em mulheres com potencial para engravidar, deve ser realizado um teste de gravidez e um método contraceptivo altamente eficaz deve ser utilizado.

Você deve ser devidamente informada sobre os riscos relacionados ao uso de topiramato durante a gravidez.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

### **Interações medicamentosas**

Avise seu médico a respeito de outros medicamentos que você esteja tomando, inclusive aqueles que você comprou sem

receita médica e quaisquer outros remédios ou suplementos dietéticos que você esteja usando. É muito importante que seu médico saiba se você está tomando digoxina, anticoncepcionais orais, metformina ou quaisquer outras drogas antiepilépticas, como fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital e primidona. Você também deve informá-lo caso ingira bebidas alcoólicas ou esteja tomando drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso (depressores do sistema nervoso central).

#### - Efeitos do topiramato sobre outras drogas antiepilépticas

A associação de topiramato a outras drogas antiepilépticas (fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, primidona) não afeta suas concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio, exceto, ocasionalmente, em alguns pacientes, em que a adição de topiramato à fenitoína poderá resultar em aumento das concentrações plasmáticas de fenitoína. Isto se deve possivelmente à inibição de uma enzima (CYP2C19) que elimina a fenitoína do sangue. Consequentemente deverá ser realizada monitorização do nível plasmático de fenitoína em qualquer paciente em tratamento com fenitoína que apresente sinais ou sintomas clínicos de toxicidade.

#### - Efeitos de outras drogas antiepilépticas sobre topiramato

A fenitoína e a carbamazepina diminuem as concentrações plasmáticas do topiramato. A adição ou descontinuação da fenitoína ou da carbamazepina ao tratamento com topiramato poderá requerer um ajuste de dose deste último. A titulação da dose deverá ser realizada de acordo com o efeito clínico. Tanto a adição quanto a retirada do ácido valproico não produzem mudanças clinicamente significativas nas concentrações plasmáticas de topiramato e, portanto, não exigem ajuste da dose do topiramato. Os resultados destas interações estão resumidos na tabela a seguir.

| AED coadministrada | Concentração da AED | Concentração de topiramato |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| fenitoína          | ↔**                 | ↓ (48%)                    |
| carbamazepina      | ↔                   | ↓ (40%)                    |
| ácido valproico    | ↔                   | ↔                          |
| lamotrigina        | ↔                   | ↔                          |
| fenobarbital       | ↔                   | NE                         |
| primidona          | ↔                   | NE                         |

↔ sem efeito sobre as concentrações plasmáticas (alteração ≤ 15%)

\*\* = concentrações plasmáticas aumentadas em alguns pacientes

↓ = diminuição das concentrações plasmáticas

NE = não estudado

AED = droga antiepiléptica

#### - Outras interações medicamentosas

**digoxina:** Quando o topiramato for associado ou descontinuado em pacientes submetidos a tratamento com a digoxina, recomenda-se atenção à monitoração rotineira e cuidadosa das concentrações no soro de digoxina.

**Anticoncepcionais:** A possibilidade de redução da eficácia do contraceptivo e aumento no sangramento de escape deve ser considerada em pacientes em uso de contraceptivos orais combinados e topiramato. Informe seu médico se você faz uso de contraceptivos hormonais contendo estrogênios ou apenas progestinas (progestagênios) e apresentar qualquer alteração em seus padrões menstruais. A eficácia contraceptiva pode ser reduzida, mesmo na ausência de sangramento de escape.

**lítio:** Em voluntários saudáveis, foi observada uma redução (18% para ASC) na exposição sistêmica para o lítio durante a administração concomitante com topiramato 200 mg/dia. Nos pacientes com transtorno bipolar, a farmacocinética do lítio não foi afetada durante o tratamento com topiramato em doses de 200 mg/dia; entretanto, foi observado aumento na exposição sistêmica (26% para ASC) depois de doses do topiramato de até 600 mg/dia. Os níveis do lítio devem ser monitorados quando coadministrados com topiramato.

**risperidona:** os estudos de interação droga-droga conduzidos sob condições de dose única e múltipla em voluntários saudáveis e em pacientes com transtorno bipolar atingiram resultados similares. Quando administrado concomitantemente com topiramato em doses escalonadas de 100, 250 e 400 mg/dia houve uma redução na exposição

sistêmica (16% e 33% para ASC no estado de equilíbrio nas doses de 250 e 400 mg/dia, respectivamente) da risperidona (administrada em doses que variando de 1 a 6 mg/dia). Alterações mínimas na farmacocinética do total de partes ativas (risperidona mais 9-hidróxirisperidona) e nenhuma alteração para 9-hidróxirisperidona foram observadas. Não houve mudança clinicamente significativa na exposição sistêmica do total de partes ativas da risperidona ou do topiramato; portanto, não é provável que esta interação tenha significância clínica.

**hidroclorotiazida:** Um estudo de interação medicamentosa conduzido em voluntários sadios avaliou a farmacocinética no estado de equilíbrio da hidroclorotiazida (25 mg a cada 24 horas) e do topiramato (96 mg a cada 12 horas) quando administrados isolados ou concomitantemente. Os resultados deste estudo indicaram que a  $C_{máx}$  do topiramato aumentou 27% e a ASC aumentou 29% quando a hidroclorotiazida foi associada ao topiramato. A significância clínica desta alteração é desconhecida. A associação de hidroclorotiazida ao tratamento com topiramato pode precisar de um ajuste da dose do topiramato. A farmacocinética da hidroclorotiazida no estado de equilíbrio não foi influenciada significativamente pela administração concomitante do topiramato. Os resultados laboratoriais clínicos indicaram redução no potássio sérico após administração do topiramato ou da hidroclorotiazida, sendo maior quando a hidroclorotiazida e o topiramato foram administrados em combinação.

**metformina:** Quando o topiramato é administrado ou retirado em pacientes tratados com metformina, deve-se dar atenção especial à monitorização rotineira para um controle adequado do diabetes.

**pioglitazona:** Quando o topiramato é associado ao tratamento com pioglitazona ou pioglitazona é associada ao tratamento com topiramato, deve-se dar atenção especial à monitorização rotineira dos pacientes para um controle adequado do diabetes.

**gliburida:** Quando o topiramato é adicionado à terapia da gliburida ou a gliburida é adicionada a terapia do topiramato, deve dar atenção especial à monitorização rotineira dos pacientes para um controle adequado do diabetes.

#### **Interação com álcool e depressores do SNC**

Não houve avaliação nos estudos clínicos, da administração concomitante de topiramato e álcool ou outras drogas depressoras do SNC.

Não tome bebidas alcoólicas durante o tratamento com topiramato, pois a combinação dos dois pode provocar sonolência e tontura.

#### **- Outras Formas de Interação:**

**Agentes que predisõem ao cálculo renal (nefrolitíase):** O topiramato pode aumentar o risco de nefrolitíase em pacientes em uso concomitante de outros agentes que predisõem à nefrolitíase. Durante o tratamento com topiramato, tais agentes deverão ser evitados, uma vez que eles criam um ambiente fisiológico que aumenta o risco de formação de cálculo renal.

**ácido valproico:** A administração concomitante do topiramato e do ácido valproico foi associada com hiperamonemia (aumento da amônia no sangue) com ou sem encefalopatia nos pacientes que toleraram uma ou outra droga isolada. Na maioria dos casos, os sintomas e os sinais cessaram com a descontinuação de uma ou outra droga (vide “O que devo saber antes de usar este medicamento?”). Esta reação adversa não é devido a uma interação farmacocinética.

Hipotermia, definida como queda não intencional da temperatura corpórea para  $<35^{\circ}\text{C}$ , foi relatada em associação com o uso concomitante de topiramato e ácido valproico, ambos em conjunto com hiperamonemia e na ausência de hiperamonemia. Esse evento adverso em pacientes usando concomitantemente topiramato e valproato pode ocorrer após o início do tratamento com topiramato ou após o aumento da dose diária de topiramato.

**Medicamentos anticoagulantes antagonistas de vitamina K:** Respostas diminuídas do Tempo de Protrombina / Razão Normalizada Internacional (TP / RNI) foram relatadas após administração concomitante de topiramato com medicamentos anticoagulantes antagonistas de vitamina K. Monitore cuidadosamente a RNI durante a administração concomitante de terapia com topiramato e medicamentos anticoagulantes antagonistas de vitamina K.

**Estudos adicionais de interação medicamentosa farmacocinética:** Estudos clínicos foram conduzidos para avaliar a interação medicamentosa farmacocinética potencial entre o topiramato e outros agentes. As alterações na  $C_{máx}$  ou na ASC, como resultado das interações, estão descritas a seguir. A segunda coluna (concentração do fármaco concomitante) descreve o que acontece com a concentração do fármaco concomitante listado na primeira coluna quando topiramato é associado. A terceira coluna (concentração do topiramato) menciona como a coadministração do fármaco listado na primeira coluna modifica a concentração do topiramato.

## Resumo dos resultados dos estudos adicionais de interação medicamentosa farmacocinética

| Fármaco concomitante                   | Concentração do fármaco concomitante <sup>a</sup>                                                       | Concentração do topiramato <sup>a</sup>                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amitripilina                           | ↔<br>20% de aumento na C <sub>máx</sub> e na ASC do metabólito nortriptilina                            | NE                                                                                                                                 |
| di-hidroergotamina (oral e subcutânea) | ↔                                                                                                       | ↔                                                                                                                                  |
| haloperidol                            | ↔<br>31% de aumento na ASC do metabólito reduzido                                                       | NE                                                                                                                                 |
| propranolol                            | ↔<br>17% de aumento na C <sub>máx</sub> para 4-hidróxiprópranolol (50 mg de topiramato a cada 12 horas) | 9% e 16% de aumento na C <sub>máx</sub> , 9% e 17% de aumento na ASC (40mg e 80mg de propranolol a cada 12 horas, respectivamente) |
| sumatriptana (oral e subcutâneo)       | ↔                                                                                                       | NE                                                                                                                                 |
| pizotifeno                             | ↔                                                                                                       | ↔                                                                                                                                  |
| diltiazem                              | 25% de diminuição na ASC do diltiazem e 18% de diminuição na DEA, e ↔ para DEM*                         | 20% de aumento na ASC                                                                                                              |
| venlafaxina                            | ↔                                                                                                       | ↔                                                                                                                                  |
| flunarizina                            | 16% de aumento na ASC (50 mg de topiramato a cada 12 horas) <sup>b</sup>                                | ↔                                                                                                                                  |

<sup>a</sup> Os valores % são as variações na média da C<sub>máx</sub> ou ASC do tratamento em relação a monoterapia.

↔ = sem efeito sobre a C<sub>máx</sub> e ASC (alteração ≤ 15%) do componente originário.

NE = não estudado.

\*DEA = desacetil diltiazem, DEM = N-demetil diltiazem.

<sup>b</sup> A ASC da flunarizina aumentou 14% em indivíduos com uso isolado de flunarizina. O aumento na exposição pode ser atribuído ao acúmulo durante o estado de equilíbrio.

### Interação com alimentos

O topiramato pode ser tomado com ou sem alimentos.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### Características físicas e organolépticas:

O topiramato de 25 mg: comprimido filme-revestido, com coloração branco a quase branco, biconvexo, circular, com inscrição gravada “AHI” de um lado e plano do outro lado;

O topiramato de 50 mg: comprimido filme-revestido, com coloração amarelo claro, biconvexo, circular, com inscrição gravada “AHI” de um lado e plano do outro lado;

O topiramato de 100 mg: comprimido filme-revestido, com coloração amarelo escuro, biconvexo, circular, com inscrição gravada “AHI” de um lado e plano do outro lado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em geral, topiramato deve ser tomado duas vezes ao dia. Contudo, seu médico poderá recomendar que você tome o medicamento uma vez ao dia, ou em doses maiores ou menores.

Seu médico começará o tratamento com uma dose baixa, aumentando-a gradativamente, até atingir a dose adequada ao controle de sua epilepsia. Tome os comprimidos com bastante água, sem parti-los, triture-os ou mastigá-los. Se preferir, você pode tomar topiramato junto às refeições. Se, acidentalmente, você tomar uma dose muito grande de topiramato, procure imediatamente o seu médico.

Em crianças, o tratamento é iniciado com uma dose baixa que é aumentada gradativamente até atingir a dose ótima para controle das crises epiléticas.

Para o controle ideal, tanto em adultos como em crianças, recomenda-se iniciar o tratamento com uma dose baixa, seguida de titulação até uma dose eficaz.

Recomenda-se não partir os comprimidos.

Não é necessário monitorar as concentrações plasmáticas de topiramato para otimizar o tratamento. Raramente, o tratamento concomitante com fenitoína poderá exigir o ajuste de dose da fenitoína para que resultados clínicos ótimos sejam alcançados. A adição ou retirada da fenitoína e da carbamazepina do tratamento coadjuvante com topiramato poderá exigir o ajuste da dose do topiramato.

O topiramato pode ser administrado com ou sem alimentos.

### **• Tratamento adjuvante em epilepsia**

#### **Adultos**

A dose mínima eficaz é 200 mg ao dia. Em geral, a dose total diária varia de 200 mg a 400 mg, dividida em duas tomadas. Alguns pacientes eventualmente poderão necessitar de doses de até 1600 mg por dia, que é a dose máxima. Recomenda-se que o tratamento seja iniciado com uma dose baixa, seguida por uma titulação da dose até que se chegue à dose adequada.

O tratamento deve ser iniciado com 25 a 50 mg, administrados à noite, durante uma semana. Posteriormente, a intervalos de 1 ou 2 semanas, a dose deverá ser aumentada de 25 a 50 mg/dia e dividida em duas tomadas. A titulação da dose deverá ser orientada pelos resultados clínicos. Alguns pacientes poderão obter eficácia com uma dose única diária.

Essas recomendações posológicas se aplicam a todos os pacientes adultos, incluindo idosos, desde que não haja doença renal subjacente. Porém, nos pacientes sob tratamento com hemodiálise, há necessidade de uma dose suplementar.

#### **Crianças acima de 2 anos de idade**

A dose total diária de topiramato recomendada para crianças é de 5 a 9 mg/kg/dia, dividida em duas tomadas. A titulação deve ser iniciada com 25 mg (ou menos, baseado na faixa de 1 a 3 mg/kg/dia) administrados à noite, durante a primeira semana. Posteriormente, a dose deve ser aumentada em 1 a 3 mg/kg/dia (dividida em duas tomadas), a intervalos de 1 ou 2 semanas, até alcançar uma resposta clínica ótima. A titulação de dose deve ser orientada pela resposta clínica.

Doses diárias de até 30 mg/kg/dia foram bem toleradas nos estudos realizados.

### **• Monoterapia em epilepsia**

Quando drogas antiepiléticas (AEDs) concomitantes são retiradas a fim de manter o tratamento com topiramato em monoterapia, deve-se considerar os efeitos que isto pode ter sobre o controle das crises convulsivas. Exceto por razões de segurança que exijam uma retirada abrupta das outras drogas antiepiléticas, recomenda-se a descontinuação gradual com redução de aproximadamente um terço da dose a cada 2 semanas.

Quando fármacos indutores enzimáticos são retirados, os níveis plasmáticos de topiramato irão aumentar. Uma diminuição da dose de topiramato pode ser necessária, se for clinicamente indicado.

#### **Adultos**

A titulação da dose deve ser iniciada com 25 mg, administrado à noite, por uma semana. Então, a dose deve ser

aumentada em 25 ou 50 mg ao dia, a intervalos de 1 ou 2 semanas, dividida em duas tomadas. Se o paciente for incapaz de tolerar o esquema de titulação, aumentos menores ou intervalos mais longos entre os aumentos da dose podem ser usados. A dose e a velocidade de titulação devem ser orientadas pelo resultado clínico.

Em adultos, a dose alvo inicial recomendada para o topiramato em monoterapia é de 100 mg/dia e a dose diária máxima recomendada é 500 mg. Alguns pacientes com formas refratárias de epilepsia toleraram doses de 1000 mg/dia de topiramato em monoterapia. Estas recomendações aplicam-se a todos os adultos, incluindo idosos sem doença renal subjacente.

### **Crianças acima de 2 anos de idade**

Em crianças acima de 2 anos de idade a dose inicial varia de 0,5 a 1 mg/kg, à noite, durante uma semana. A seguir a dose deve ser aumentada em 0,5 a 1 mg/kg/dia à intervalos de 1 a 2 semanas, dividida em duas tomadas. Se a criança for incapaz de tolerar o esquema de titulação da dose, aumentos menores ou intervalos maiores entre os aumentos da dose podem ser usados. A dose e a velocidade da titulação devem ser orientadas pelo resultado clínico.

A dose-alvo inicial recomendada para o topiramato em monoterapia em crianças é de 3 a 6 mg/kg/dia.

Crianças com crises de início parcial de diagnóstico recente receberam doses de até 500 mg/dia.

### **• Enxaqueca**

#### **Adultos**

O tratamento deve ser iniciado com 25 mg à noite durante 1 semana. A dose deve então ser aumentada em 25 mg/dia, uma vez por semana. Se o paciente for incapaz de tolerar o esquema de gradação, intervalos maiores entre os ajustes de dose podem ser usados.

A dose total diária de topiramato recomendada na profilaxia de enxaqueca é 100 mg/dia, divididos em duas tomadas. Alguns pacientes podem se beneficiar de uma dose diária total de 50 mg. Pacientes receberam dose diária total de até 200 mg/dia. A dose e a velocidade de gradação devem ser orientadas pelo resultado clínico.

### **• Populações especiais**

#### **Insuficiência renal**

Pacientes com insuficiência renal moderada e severa ( $CL_{CR} < 70$  mL/min) podem necessitar de uma redução de dose. É recomendada a administração de metade da dose usual de início e de manutenção.

O topiramato é removido do plasma por hemodiálise, uma dose suplementar de topiramato igual a aproximadamente metade da dose diária deverá ser administrada nos dias de hemodiálise. Esta dose suplementar deverá ser dividida em duas tomadas, ao início e ao término da hemodiálise. A dose suplementar poderá ser ajustada dependendo das características do equipamento de diálise que estiver sendo utilizado.

#### **Insuficiência hepática**

O topiramato deve ser administrado com cautela em pacientes com insuficiência hepática.

**Pacientes idosos:** as doses recomendadas são válidas também para pacientes idosos. Não há necessidade de ajuste das doses, desde que esses pacientes não tenham doença nos rins.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que você se lembrar. Porém, se você estiver perto da hora de tomar a próxima dose, **não** tome a dose que você esqueceu e continue o tratamento normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

As reações adversas são apresentadas nesta seção. Reações adversas são eventos adversos que foram considerados razoavelmente associados ao uso de topiramato, com base na avaliação abrangente das informações de eventos adversos disponíveis. Em casos individuais, uma relação causal com o topiramato não pode ser estabelecida com confiança. Portanto, pelo fato de que os estudos clínicos são conduzidos em condições amplamente variadas, as taxas de reações adversas observadas nos estudos clínicos de um medicamento não podem ser diretamente comparadas com as taxas nos estudos clínicos de outros medicamentos e podem não refletir as taxas observadas na prática clínica.

### Dados de estudos clínicos

A segurança de topiramato foi avaliada a partir de um banco de dados de estudos clínicos composto de 4.111 pacientes (3.182 tratados com topiramato e 929 com placebo) que participaram de 20 estudos duplo-cegos e 2.847 pacientes que participaram de 34 estudos abertos, respectivamente, para o tratamento de convulsões tônico-clônicas generalizadas primárias, convulsões de início parcial, convulsões associadas à síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia ou enxaqueca de diagnóstico novo ou recente. As informações apresentadas neste item foram obtidas a partir de dados agrupados.

A maioria das reações adversas foi de severidade leve a moderada."

### Dados de estudos duplo-cegos, controlados por placebo, de terapia adjuvante para epilepsia

#### Pacientes adultos

As reações adversas relatadas em  $\geq 1\%$  dos pacientes adultos tratados com o topiramato em estudos duplo-cegos, controlados por placebo de terapia adjuvante para epilepsia são apresentadas na Tabela 1. As reações adversas com incidência  $> 5\%$  no intervalo de dose recomendado (200 a 400 mg/dia) em adultos em estudos duplo-cegos, controlados por placebo de terapia adjuvante para epilepsia em ordem decrescente de frequência incluíram sonolência, tontura, fadiga, irritabilidade, perda de peso, bradipsiquismo (lentificação do pensamento), parestesia (formigamento), diplopia (visão dupla), coordenação anormal, náusea, nistagmo, letargia, anorexia, disartria (dificuldade para falar), visão turva, diminuição do apetite, comprometimento de memória e diarreia.

**Tabela 1. Reações Adversas Relatadas por  $\geq 1\%$  dos Pacientes Adultos Tratados com topiramato em Estudos Duplo-Cegos, controlados por Placebo de Terapia Adjuvante para Epilepsia**

| Classe de Sistema/Órgão<br>Reação Adversa      | topiramato<br>200-400 mg/dia<br>(N=354)<br>% | topiramato<br>600-1.000 mg/dia<br>(N=437)<br>% | Placebo<br>(N=382)<br>% |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição</b> |                                              |                                                |                         |
| Anorexia                                       | 5,4                                          | 6,2                                            | 1,8                     |
| Diminuição do apetite                          | 5,1                                          | 8,7                                            | 3,7                     |
| <b>Transtornos Psiquiátricos</b>               |                                              |                                                |                         |
| Bradipsiquismo                                 | 8,2                                          | 19,5                                           | 3,1                     |
| Transtorno de linguagem expressiva             | 4,5                                          | 9,4                                            | 1,6                     |
| Estado confusional                             | 3,1                                          | 5,0                                            | 0,8                     |
| Depressão                                      | 3,1                                          | 11,7                                           | 3,4                     |
| Insônia                                        | 3,1                                          | 6,4                                            | 4,5                     |
| Agressão                                       | 2,8                                          | 3,2                                            | 1,8                     |
| Agitação                                       | 1,7                                          | 2,3                                            | 1,3                     |
| Raiva                                          | 1,7                                          | 2,1                                            | 0,5                     |
| Ansiedade                                      | 1,7                                          | 6,6                                            | 2,9                     |
| Desorientação                                  | 1,7                                          | 3,2                                            | 1,0                     |
| Humor alterado                                 | 1,7                                          | 4,6                                            | 1,0                     |
| <b>Transtornos do Sistema Nervoso</b>          |                                              |                                                |                         |
| Sonolência                                     | 17,8                                         | 17,4                                           | 8,4                     |
| Tontura                                        | 16,4                                         | 34,1                                           | 13,6                    |
| Parestesia                                     | 8,2                                          | 17,2                                           | 3,7                     |
| Coordenação anormal                            | 7,1                                          | 11,4                                           | 4,2                     |
| Nistagmo                                       | 6,2                                          | 11,7                                           | 6,8                     |
| Letargia                                       | 5,6                                          | 8,0                                            | 2,1                     |
| Disartria                                      | 5,4                                          | 6,2                                            | 1,0                     |
| Comprometimento da memória                     | 5,1                                          | 10,8                                           | 1,8                     |

|                                                                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Distúrbio de atenção                                                                      | 4,5  | 11,9 | 1,8  |
| Tremor                                                                                    | 4,0  | 9,4  | 5,0  |
| Amnésia                                                                                   | 3,4  | 5,3  | 1,0  |
| Distúrbio do equilíbrio                                                                   | 3,4  | 3,9  | 2,4  |
| Hipoestesia                                                                               | 3,1  | 5,9  | 1,0  |
| Tremor intencional                                                                        | 3,1  | 4,8  | 2,9  |
| Disgeusia (alteração do paladar)                                                          | 1,4  | 4,3  | 0,8  |
| Comprometimento mental                                                                    | 1,4  | 5,0  | 1,3  |
| Distúrbio da fala                                                                         | 1,1  | 2,7  | 0,5  |
| <b>Distúrbios Oftalmológicos</b>                                                          |      |      |      |
| Diplopia (visão dupla)                                                                    | 7,3  | 12,1 | 5,0  |
| Visão turva                                                                               | 5,4  | 8,9  | 2,4  |
| Distúrbio visual                                                                          | 2,0  | 1,4  | 0,3  |
| <b>Distúrbios Gastrintestinais</b>                                                        |      |      |      |
| Náusea                                                                                    | 6,8  | 15,1 | 8,4  |
| Diarreia                                                                                  | 5,1  | 14,0 | 5,2  |
| Dor abdominal superior                                                                    | 3,7  | 3,9  | 2,1  |
| Constipação                                                                               | 3,7  | 3,2  | 1,8  |
| Desconforto estomacal                                                                     | 3,1  | 3,2  | 1,3  |
| Dispepsia                                                                                 | 2,3  | 3,0  | 2,1  |
| Boca seca                                                                                 | 1,7  | 3,7  | 0,3  |
| Dor abdominal                                                                             | 1,1  | 2,7  | 0,8  |
| <b>Distúrbios do Tecido</b>                                                               |      |      |      |
| <b>Músculoesquelético e do Tecido Conjuntivo</b>                                          |      |      |      |
| Mialgia                                                                                   | 2,0  | 2,5  | 1,3  |
| Espasmos musculares                                                                       | 1,7  | 2,1  | 0,8  |
| Dor torácica musculoesquelética                                                           | 1,1  | 1,8  | 0,3  |
| <b>Distúrbios Gerais Condições no Local de Administração</b>                              |      |      |      |
| Fadiga                                                                                    | 13,0 | 30,7 | 11,8 |
| Irritabilidade                                                                            | 9,3  | 14,6 | 3,7  |
| Astenia                                                                                   | 3,4  | 3,0  | 1,8  |
| Distúrbio da marcha                                                                       | 1,4  | 2,5  | 1,3  |
| <b>Investigações</b>                                                                      |      |      |      |
| Perda de peso                                                                             | 9,0  | 11,9 | 4,2  |
| A dose recomendada para a terapia adjuvante de epilepsia em adultos é de 200- 400 mg/dia. |      |      |      |

#### Dados de estudos duplo-cegos, controlados por placebo, de terapia adjuvante para epilepsia

##### Pacientes pediátricos

As reações adversas relatadas em > 2% dos pacientes pediátricos tratados com o topiramato (2 a 16 anos de idade) em estudos duplo-cegos, controlados por placebo de terapia adjuvante para epilepsia são apresentadas na Tabela 2. As reações adversas com incidência > 5% no intervalo de dose recomendado (5 a 9 mg/kg/dia) em ordem decrescente de frequência incluíram diminuição do apetite, fadiga, sonolência, letargia, irritabilidade, distúrbio de atenção, perda de peso, agressão, erupção cutânea, comportamento anormal, anorexia, distúrbio do equilíbrio e constipação.

**Tabela 2. Reações Adversas Relatadas por  $\geq 2\%$  dos Pacientes Pediátricos Tratados com o topiramato em Estudos Duplo-Cegos, Controlados por Placebo de Terapia Adjuvante para Epilepsia**

| Classe de Sistema/Órgão<br>Reação Adversa                                                                       | topiramato<br>(N=104)<br>% | Placebo<br>(N=102)<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição</b>                                                                  |                            |                         |
| Diminuição do apetite                                                                                           | 19,2                       | 12,7                    |
| Anorexia                                                                                                        | 5,8                        | 1,0                     |
| <b>Transtornos Psiquiátricos</b>                                                                                |                            |                         |
| Agressão                                                                                                        | 8,7                        | 6,9                     |
| Comportamento anormal                                                                                           | 5,8                        | 3,9                     |
| Estado confusional                                                                                              | 2,9                        | 2,0                     |
| Humor alterado                                                                                                  | 2,9                        | 2,0                     |
| <b>Transtornos do Sistema Nervoso</b>                                                                           |                            |                         |
| Sonolência                                                                                                      | 15,4                       | 6,9                     |
| Letargia                                                                                                        | 13,5                       | 8,8                     |
| Distúrbios de atenção                                                                                           | 10,6                       | 2,0                     |
| Distúrbios do equilíbrio                                                                                        | 5,8                        | 2,0                     |
| Tontura                                                                                                         | 4,8                        | 2,9                     |
| Comprometimento da memória                                                                                      | 3,8                        | 1,0                     |
| <b>Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais</b>                                                       |                            |                         |
| Epistaxe                                                                                                        | 4,8                        | 1,0                     |
| <b>Distúrbios gastrintestinais</b>                                                                              |                            |                         |
| Constipação                                                                                                     | 5,8                        | 4,9                     |
| <b>Distúrbios do Tecido Cutâneo e Subcutâneo</b>                                                                |                            |                         |
| Erupção Cutânea                                                                                                 | 6,7                        | 5,9                     |
| <b>Distúrbios Gerais e Condições no Local da Administração</b>                                                  |                            |                         |
| Fadiga                                                                                                          | 16,3                       | 4,9                     |
| Irritabilidade                                                                                                  | 11,5                       | 8,8                     |
| Distúrbio da marcha                                                                                             | 4,8                        | 2,0                     |
| <b>Investigações</b>                                                                                            |                            |                         |
| Perda de Peso                                                                                                   | 9,6                        | 1,0                     |
| A dose recomendada para a terapia adjuvante de epilepsia em crianças (2-16 anos de idade) é de 5 a 9 mg/kg/dia. |                            |                         |

#### **Dados dos estudos duplo-cegos, controlados e de monoterapia para epilepsia**

##### **Pacientes adultos**

As reações adversas relatadas em  $\geq 1\%$  dos pacientes adultos tratados com o topiramato em estudos duplo-cegos, controlados e de monoterapia para epilepsia são apresentadas na Tabela 3. As reações adversas que apresentaram incidência  $> 5\%$  na dose recomendada (400 mg/dia) em ordem decrescente de frequência incluíram parestesia, perda de peso, fadiga, anorexia, depressão, comprometimento da memória, ansiedade, diarreia, astenia, disgeusia e hipoestesia.

**Tabela 3: Reações Adversas Relatadas por  $\geq 1\%$  dos Pacientes Adultos Tratados com o topiramato em Estudos Duplo-Cegos, Controlados de Monoterapia para Epilepsia**

| <b>Classe de Sistema/Órgão</b><br>Reação Adversa          | <b>topiramato<br/>50 mg/dia<br/>(N=257)<br/>%</b> | <b>topiramato<br/>400 mg/dia<br/>(N=153)<br/>%</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático</b>        |                                                   |                                                    |
| Anemia                                                    | 0,8                                               | 2,0                                                |
| <b>Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição</b>            |                                                   |                                                    |
| Anorexia                                                  | 3,5                                               | 12,4                                               |
| Diminuição do apetite                                     | 2,3                                               | 2,6                                                |
| <b>Transtornos Psiquiátricos</b>                          |                                                   |                                                    |
| Depressão                                                 | 4,3                                               | 8,5                                                |
| Ansiedade                                                 | 3,9                                               | 6,5                                                |
| Bradipsiquismo                                            | 2,3                                               | 4,6                                                |
| Transtorno de linguagem expressiva                        | 3,5                                               | 4,6                                                |
| Humor depressivo                                          | 0,8                                               | 2,6                                                |
| Humor alterado                                            | 0,4                                               | 2,0                                                |
| Alterações de humor                                       | 1,6                                               | 2,0                                                |
| <b>Transtornos do Sistema Nervoso</b>                     |                                                   |                                                    |
| Parestesia                                                | 18,7                                              | 40,5                                               |
| Comprometimento da memória                                | 1,2                                               | 7,2                                                |
| Disgeusia                                                 | 2,3                                               | 5,9                                                |
| Hipoestesia                                               | 4,3                                               | 5,2                                                |
| Distúrbio do equilíbrio                                   | 1,6                                               | 3,3                                                |
| Disartria                                                 | 1,6                                               | 2,6                                                |
| Distúrbio cognitivo                                       | 0,4                                               | 2,0                                                |
| Letargia                                                  | 1,2                                               | 2,0                                                |
| Comprometimento mental                                    | 0,8                                               | 2,0                                                |
| Comprometimento das habilidades psicomotoras              | 0                                                 | 2,0                                                |
| Sedação                                                   | 0                                                 | 1,3                                                |
| Alteração de campo visual                                 | 0,4                                               | 1,3                                                |
| <b>Distúrbios oftalmológicos</b>                          |                                                   |                                                    |
| Olho seco                                                 | 0                                                 | 1,3                                                |
| <b>Distúrbios do Ouvido e do Labirinto</b>                |                                                   |                                                    |
| Dor de ouvido                                             | 0                                                 | 1,3                                                |
| Zumbido                                                   | 1,6                                               | 1,3                                                |
| <b>Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais</b> |                                                   |                                                    |
| Dispneia                                                  | 1,2                                               | 2,0                                                |
| Rinorreia                                                 | 0                                                 | 1,3                                                |
| <b>Distúrbios Gastrointestinais</b>                       |                                                   |                                                    |
| Diarreia                                                  | 5,4                                               | 6,5                                                |
| Parestesia Oral                                           | 1,2                                               | 3,3                                                |

|                                                                       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| Boca seca                                                             | 0,4  | 2,6  |
| Gastrite                                                              | 0,8  | 2,6  |
| Dor abdominal                                                         | 1,2  | 2,0  |
| Doença do refluxo gastroesofágico                                     | 0,4  | 2,0  |
| Sangramento gengival                                                  | 0    | 1,3  |
| <b>Distúrbios do Tecido Cutâneo e Subcutâneo</b>                      |      |      |
| Erupção Cutânea                                                       | 0,4  | 3,9  |
| Alopecia                                                              | 1,6  | 3,3  |
| Prurido                                                               | 0,4  | 3,3  |
| Hipoestesia facial                                                    | 0,4  | 2,0  |
| Prurido generalizado                                                  | 0    | 1,3  |
| <b>Distúrbios do Tecido Musculoesquelético e do Tecido Conjuntivo</b> |      |      |
| Espasmos musculares                                                   | 2,7  | 3,3  |
| Artralgia                                                             | 1,9  | 2,0  |
| Espasmos musculares involuntários                                     | 0,4  | 1,3  |
| <b>Distúrbios Renais e Urinários</b>                                  |      |      |
| Nefrolitíase                                                          | 0    | 2,6  |
| Disúria                                                               | 0,8  | 2,0  |
| Polaciúria                                                            | 0,8  | 2,0  |
| <b>Distúrbios do Sistema Reprodutivo e das Mamas</b>                  |      |      |
| Disfunção erétil                                                      | 0,8  | 1,3  |
| <b>Distúrbios Gerais e Condições no Local da Administração</b>        |      |      |
| Fadiga                                                                | 15,2 | 14,4 |
| Astenia                                                               | 3,5  | 5,9  |
| Irritabilidade                                                        | 3,1  | 3,3  |
| <b>Investigações</b>                                                  |      |      |
| Perda de peso                                                         | 7,0  | 17,0 |
| A dose recomendada para monoterapia em adultos é de 400 mg/dia.       |      |      |

#### Dados de estudos duplo-cegos, controlados e de monoterapia para epilepsia

##### Pacientes pediátricos

As reações adversas relatadas em  $\geq 2\%$  dos pacientes pediátricos tratados com o topiramato (10 a 16 anos de idade) em estudos duplo-cegos, controlados e de monoterapia para epilepsia são apresentadas na Tabela 4. As reações adversas com incidência  $> 5\%$  na dose recomendada (400 mg/dia) em ordem decrescente de frequência incluíram perda de peso, parestesia, diarreia, distúrbio de atenção, pirexia e alopecia.

**Tabela 4. Reações Adversas Relatadas por  $\geq 2\%$  dos Pacientes Pediátricos Tratados com o topiramato em Estudos Duplo-Cegos, Controlados de Monoterapia para Epilepsia**

| Classe de Sistema/Órgão                        | topiramato<br>50 mg/dia<br>(N=77)<br>% | topiramato<br>400 mg/dia<br>(N=63)<br>% |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Reação Adversa                                 |                                        |                                         |
| <b>Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição</b> |                                        |                                         |

|                                                                                     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Diminuição do apetite                                                               | 1,3 | 4,8  |
| <b>Transtornos Psiquiátricos</b>                                                    |     |      |
| Bradipsiquismo                                                                      | 0   | 4,8  |
| Humor alterado                                                                      | 1,3 | 4,8  |
| Depressão                                                                           | 0   | 3,2  |
| <b>Transtornos do Sistema Nervoso</b>                                               |     |      |
| Parestesia                                                                          | 3,9 | 15,9 |
| Distúrbio de atenção                                                                | 3,9 | 7,9  |
| <b>Distúrbios do Ouvido e do Labirinto</b>                                          |     |      |
| Vertigem                                                                            | 0   | 3,2  |
| <b>Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais</b>                           |     |      |
| Epistaxe                                                                            | 0   | 3,2  |
| <b>Distúrbios Gastrointestinais</b>                                                 |     |      |
| Diarreia                                                                            | 3,9 | 9,5  |
| Vômitos                                                                             | 3,9 | 4,8  |
| <b>Distúrbios do Tecido Cutâneo e Subcutâneo</b>                                    |     |      |
| Alopecia                                                                            | 0   | 6,3  |
| <b>Distúrbios Gerais e Condições no Local da Administração</b>                      |     |      |
| Pirexia                                                                             | 0   | 6,3  |
| Astenia                                                                             | 0   | 4,8  |
| <b>Investigações</b>                                                                |     |      |
| Perda de Peso                                                                       | 7,8 | 20,6 |
| <b>Circunstâncias Sociais</b>                                                       |     |      |
| Dificuldade de Aprendizado                                                          | 0   | 3,2  |
| A dose recomendada para monoterapia em crianças de 10 anos ou mais é de 400 mg/dia. |     |      |

#### Dados de estudos duplo-cegos, controlados por placebo, de profilaxia de enxaqueca

##### Pacientes adultos

As reações adversas relatadas em  $\geq 1\%$  dos pacientes adultos tratados com o topiramato em estudos duplo-cegos, controlados por placebo de profilaxia de enxaqueca são apresentadas na Tabela 5. As reações adversas com incidência  $> 5\%$  na dose recomendada (100 mg/dia) em ordem decrescente de frequência incluíram parestesia, fadiga, náusea, diarreia, perda de peso, disgeusia, anorexia, diminuição do apetite, insônia, hipoestesia, distúrbio de atenção, ansiedade, sonolência e transtorno de linguagem expressiva.

**Tabela 5: Reações Adversas Relatadas por  $\geq 1\%$  dos Pacientes Adultos Tratados com o topiramato em Estudos Duplo-Cegos, Controlados por Placebo de Profilaxia de Enxaqueca**

| Classe de Sistema/Órgão | topiramato<br>50 mg/dia<br>(N=227) | topiramato<br>100 mg/dia<br>(N=374) | topiramato<br>200 mg/dia<br>(N=501) | Placebo<br>(N=436) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Reação Adversa          | %                                  | %                                   | %                                   | %                  |

|                                                                       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição</b>                        |      |      |      |      |
| Anorexia                                                              | 3,5  | 7,5  | 7,2  | 3,0  |
| Diminuição do apetite                                                 | 5,7  | 7,0  | 6,8  | 3,0  |
| <b>Transtornos Psiquiátricos</b>                                      |      |      |      |      |
| Insônia                                                               | 4,8  | 7,0  | 5,6  | 3,9  |
| Ansiedade                                                             | 4,0  | 5,3  | 5,0  | 1,8  |
| Distúrbio de linguagem expressiva                                     | 6,6  | 5,1  | 5,2  | 1,4  |
| Depressão                                                             | 3,5  | 4,8  | 7,4  | 4,1  |
| Humor depressivo                                                      | 0,4  | 2,9  | 2,0  | 0,9  |
| Estado confusional                                                    | 0,4  | 1,6  | 2,0  | 1,1  |
| Alterações de humor                                                   | 1,8  | 1,3  | 1,0  | 0,2  |
| Labilidade de afeto                                                   | 0,4  | 1,1  | 0,2  | 0,2  |
| Bradipsiquismo                                                        | 1,8  | 1,1  | 3,4  | 1,4  |
| <b>Transtornos do Sistema Nervoso</b>                                 |      |      |      |      |
| Parestesia                                                            | 35,7 | 50,0 | 48,5 | 5,0  |
| Disgeusia                                                             | 15,4 | 8,0  | 12,6 | 0,9  |
| Hipoestesia                                                           | 5,3  | 6,7  | 7,4  | 1,4  |
| Distúrbio de atenção                                                  | 2,6  | 6,4  | 9,2  | 2,3  |
| Sonolência                                                            | 6,2  | 5,1  | 6,8  | 3,0  |
| Comprometimento da memória                                            | 4,0  | 4,5  | 6,2  | 1,6  |
| Amnésia                                                               | 3,5  | 2,9  | 5,2  | 0,5  |
| Tremor                                                                | 1,3  | 1,9  | 2,4  | 1,4  |
| Distúrbio do equilíbrio                                               | 0,4  | 1,3  | 0,4  | 0    |
| Comprometimento mental                                                | 0,4  | 1,1  | 1,8  | 0,9  |
| <b>Distúrbios oftalmológicos</b>                                      |      |      |      |      |
| Visão turva                                                           | 4,0  | 2,4  | 4,4  | 2,5  |
| <b>Distúrbios do Ouvido e do Labirinto</b>                            |      |      |      |      |
| Zumbido                                                               | 0,4  | 1,3  | 1,6  | 0,7  |
| <b>Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais</b>             |      |      |      |      |
| Dispneia                                                              | 1,3  | 2,7  | 1,6  | 1,4  |
| Epistaxe                                                              | 0,4  | 1,1  | 0,6  | 0,5  |
| <b>Distúrbios Gastrointestinais</b>                                   |      |      |      |      |
| Náusea                                                                | 9,3  | 13,6 | 14,6 | 8,3  |
| Diarreia                                                              | 9,3  | 11,2 | 10,0 | 4,4  |
| Boca seca                                                             | 1,8  | 3,2  | 5,0  | 2,5  |
| Parestesia oral                                                       | 1,3  | 2,9  | 1,6  | 0,5  |
| Constipação                                                           | 1,8  | 2,1  | 1,8  | 1,4  |
| Distensão abdominal                                                   | 0    | 1,3  | 0,2  | 0,2  |
| Desconforto estomacal                                                 | 2,2  | 1,3  | 1,0  | 0,2  |
| Doença do refluxo gastroesofágico                                     | 0,4  | 1,1  | 1,2  | 0,5  |
| <b>Distúrbios do Tecido Músculoesquelético e do Tecido conjuntivo</b> |      |      |      |      |
| Espasmos musculares involutários                                      | 1,8  | 1,3  | 1,8  | 0,7  |
| <b>Distúrbios Gerais e Condições no Local da Administração</b>        |      |      |      |      |
| Fadiga                                                                | 15,0 | 15,2 | 19,2 | 11,2 |
| Astenia                                                               | 0,9  | 2,1  | 2,6  | 0,5  |

|                                                                  |     |     |      |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|
| Irritabilidade                                                   | 3,1 | 1,9 | 2,4  | 0,9 |
| Sede                                                             | 1,3 | 1,6 | 1,0  | 0,5 |
| <b>Investigações</b>                                             |     |     |      |     |
| Perda de peso                                                    | 5,3 | 9,1 | 10,8 | 1,4 |
| A dose recomendada para profilaxia de enxaqueca é de 100 mg/dia. |     |     |      |     |

## Outros Dados de Estudos Clínicos

### Pacientes adultos

As reações adversas relatadas em estudos clínicos duplo-cegos controlados em < 1% dos pacientes adultos tratados com o topiramato ou em qualquer taxa em estudos clínicos abertos em pacientes adultos tratados com o topiramato são apresentadas a seguir.

- Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático: leucopenia, linfadenopatia, trombocitopenia;
- Distúrbios do Sistema Imunológico: hipersensibilidade;
- Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição: acidose hiperclorêmica, hipocalemia, aumento do apetite, acidose metabólica, polidipsia;
- Transtornos Psiquiátricos: comportamento anormal, anorgasmia, apatia, choro, distração, distúrbio no desejo sexual, disfemia (“gagueira”), despertar precoce, humor elevado, humor eufórico, afeto embotado, alucinação, alucinação auditiva, alucinação visual, hipomania, insônia inicial, ausência de fala espontânea, diminuição da libido, apatia, perda de libido, mania, insônia de manutenção, sensação orgásmica diminuída, ataque de pânico, distúrbio do pânico, reação de pânico, paranoia, perseveração, distúrbio de leitura, inquietação, distúrbio do sono, ideação suicida, tentativa de suicídio, choro excessivo, pensamento anormal;
- Transtornos do Sistema Nervoso: ageusia, acinesia, anosmia, afasia, apraxia, aura, sensação de queimação, síndrome cerebelar, distúrbio do ritmo circadiano do sono, falta de coordenação motora, crises parciais complexas, convulsões, nível de consciência diminuída, tontura postural, hipersecreção salivar, disestesia, disgrafia, discinesia, disfasia, distonia, tremor essencial, formigamento, convulsão do tipo grande mal, hiperestesia, hipersônia, hipogeusia, hipocinesia, hiposmia, neuropatia periférica, parosmia, sono de baixa qualidade, pré-síncope, fala repetitiva, distúrbio sensorial, perda sensorial, estupor (diminuição da reação aos estímulos do ambiente), síncope, não-responsividade a estímulo;
- Distúrbios Oftalmológicos: distúrbio de acomodação, percepção de profundidade visual alterada, ambliopia, blefarospasmo, cegueira transitória, cegueira unilateral, glaucoma, lacrimação aumentada, midríase, cegueira noturna, fotopsia, presbiopia, escotoma cintilante, escotoma, acuidade visual reduzida;
- Distúrbios do Ouvido e do Labirinto: surdez, surdez neurossensorial, surdez unilateral, desconforto no ouvido, audição comprometida;
- Distúrbios Cardíacos: bradicardia, bradicardia sinusal, palpitações;
- Distúrbios Vasculares: rubor, ondas de calor, hipotensão ortostática (pressão baixa), fenômeno de Raynauds;
- Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais: disfonia, dispneia de exercício, congestão nasal, hipersecreção sinusal paranasal;
- Distúrbios Gastrointestinais: desconforto abdominal, dor abdominal inferior, sensibilidade abdominal, hálito com odor, desconforto epigástrico, flatulência, glossodinia, hipoestesia oral, dor oral, pancreatite, hipersecreção salivar;
- Distúrbios do Tecido Cutâneo e Subcutâneo: anidrose, dermatite alérgica, eritema, erupção cutânea macular, descoloração da pele, odor anormal da pele, rosto inchado, urticária, urticária localizada.
- Distúrbios do Tecido Musculoesquelético e do Tecido Conjuntivo: dor no flanco, fadiga muscular, fraqueza muscular, rigidez musculoesquelética;
- Distúrbios Renais e Urinários: cálculo uretérico, cálculo urinário, hematúria, incontinência, urgência urinária, cólica renal, dor renal, incontinência urinária;
- Distúrbios do Sistema Reprodutivo e das Mamas: disfunção sexual;
- Distúrbios Gerais: edema facial, sensação anormal, sensação de estar bêbado, sensação de nervosismo, mal-estar, frio periférico, lentidão;
- Investigações: bicarbonato sanguíneo diminuído, cristais presentes na urina, teste de marcha em tandem anormal, contagem de leucócitos diminuída.

## Outros Dados de Estudos Clínicos

### Pacientes pediátricos

As reações adversas relatadas em estudos clínicos duplo-cegos controlados em < 2% dos pacientes pediátricos tratados com o topiramato ou em qualquer taxa em estudos clínicos abertos em pacientes pediátricos tratados com o topiramato são apresentadas a seguir.

- Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático: eosinofilia, leucopenia, linfadenopatia, trombocitopenia;

- Distúrbios do Sistema Imunológico: hipersensibilidade;
- Distúrbios Metabólicos e Nutricionais: acidose hiperclorêmica, hipocalemia, aumento do apetite;
- Transtornos Psiquiátricos: raiva, apatia, choro, distração, transtorno da linguagem de expressão, insônia inicial, insônia, insônia de manutenção, alterações de humor, perseveração, distúrbio do sono, ideação suicida, tentativa de suicídio;
- Transtornos do Sistema Nervoso: distúrbio no ritmo circadiano do sono, convulsão, disartria, disgeusia, convulsão do tipo grande mal, hipoestesia, comprometimento mental, nistagmo, parosmia, sono de baixa qualidade, hiperatividade psicomotora, habilidades psicomotoras comprometidas, síncope, tremores;
- Distúrbios Oftalmológicos: diplopia (visão dupla), lacrimação aumentada, visão turva;
- Distúrbios do Ouvido e do Labirinto: dor de ouvido;
- Distúrbios Cardíacos: palpitações, bradicardia sinusal;
- Distúrbios Vasculares: hipotensão ortostática (pressão baixa);
- Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais: congestão nasal, hipersecreção sinusal paranasal, rinorreia;
- Distúrbios Gastrointestinais: desconforto abdominal, dor abdominal, boca seca, flatulência, gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, sangramento gengival, glossodinia, pancreatite, parestesia oral, desconforto estomacal;
- Distúrbios do Tecido Musculoesquelético e do Tecido Conjuntivo: artralgia, rigidez musculoesquelética, mialgia;
- Distúrbios Renais e Urinários: incontinência, urgência urinária, polaciúria;
- Distúrbios Gerais: sensação anormal, hipertermia, mal-estar, lentidão.

### **Dados Pós-Comercialização**

Os eventos adversos primeiramente identificados como reações adversas durante a experiência pós-comercialização com o topiramato estão a seguir por categoria de frequência com base nas taxas de relatos espontâneos.

#### **Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

- Infecções e infestações: nasofaringite;
- Distúrbios do sangue e do sistema linfático: neutropenia;
- Distúrbios do sistema imunológico: edema alérgico;
- Distúrbios do metabolismo e da nutrição: hiperamonemia, encefalopatia hiperamonêmica;
- Transtornos psiquiátricos: sensação de desespero;
- Distúrbios oculares: sensação anormal nos olhos, glaucoma de ângulo fechado, edema conjuntival, distúrbio do movimento ocular, edema na pálpebra, maculopatia, miopia;
- Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais: tosse;
- Distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo: eritema multiforme, edema periorbital, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica;
- Distúrbios do tecido musculoesquelético e conjuntivo: inchaço articular, desconforto em membro;
- Distúrbios renais e urinários: acidose tubular renal, nefrocalcinose;
- Distúrbios gerais e reações no local da administração: edema generalizado, doença do tipo gripe;
- Investigações: aumento de peso.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Se, acidentalmente, você tomar uma dose muito grande de topiramato, procure imediatamente o seu médico.

Os sinais e sintomas de uma dose excessiva de topiramato são: convulsão, sonolência, distúrbio da fala, visão borrada, diplopia (visão dupla), atividade mental prejudicada, letargia, coordenação anormal, estupor (diminuição da reação aos estímulos do ambiente), hipotensão (pressão baixa), dor abdominal, agitação, tontura e depressão. Acidose metabólica severa também pode ocorrer.

Em caso de superdose, o topiramato deve ser administrando tratamento de suporte geral até que a toxicidade clínica tenha diminuído ou resolvido. A hemodiálise é um método eficaz para a retirada do topiramato do organismo. É importante manter a pessoa bem hidratada.

É aconselhável entrar em contato com um centro de controle de intoxicação para obter as recomendações mais recentes para o gerenciamento de uma superdose.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III - DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.0392.0193

**Fabricado por:**

**INTAS PHARMACEUTICALS LTD.**

Plot nº 457,458 – Matoda 382 210

Dist. Ahmedabad - Índia

**Importado por:**

**ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. Guido Caloi, 1985 – G. 01

Santo Amaro – São Paulo – SP

CNPJ 64.171.697/0001-46

**Registrado e distribuído por:**

**VITAMEDIC IND. FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua VPR 01 - Qd. 2A - Mód. 01

Daia – Anápolis – GO

CNPJ 30.222.814/0001-31



[www.vitamedic.ind.br](http://www.vitamedic.ind.br)



**VITAMEDIC**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO.**

**SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.**

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 02/08/2024.

## Anexo B

### Histórico de Alteração para a Bula

| Dados da Submissão eletrônica |               |                                                                  | Dados da petição/notificação que altera a bula |               |         |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº expediente | Assunto                                                          | Data do expediente                             | Nº expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bulas                                                                                                                                                                                                            | Versões (VP/VPS) | Apresentações Relacionadas                                                                                   |
| -                             | -             | 10452 -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto Bula<br>60/12 | -                                              | -             | -       | -                 | 3 - Quando não devo<br>usar este<br>medicamento<br><br>4 - O que devo saber<br>antes de usar este<br>medicamento.<br><br>5 - Onde, como e<br>por quanto tempo<br>posso guardar este<br>medicamento<br>e<br>Dizeres Legais | VP               | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |

|            |              |                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                           |        |                                                                                                                      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/11/2022 | 4967963/22-6 | 10452 -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto Bula<br>60/12 | - | - | - | - | - Dizeres legais.                                                                                         | VP/VPS | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |
| 04/04/2022 | 1519145/22-5 | 10452 -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto Bula<br>60/12 | - | - | - | - | Harmonização dos<br>excipientes do<br>medicamento;<br><br>Cuidados de<br>armazenamento do<br>medicamento. | VP     | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |

|            |              |                                                                  |   |   |   |   |                                                                                 |        |                                                                                                                      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/03/2022 | 1189891/22-1 | 10452 -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto Bula<br>60/12 | - | - | - | - | 4. O que devo saber<br>antes de usar este<br>medicamento?                       | VP     | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |
| 13/05/2021 | 1846199/21-9 | 10452 -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto Bula<br>60/12 | - | - | - | - | VPS: Item 5 e 9<br>Alteração RDC<br>406/20.<br><br>VPS/VP: alteração<br>de SAC. | VP/VPS | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |

|            |              |                                                                               |   |   |   |   |                                                           |        |                                                                                                                      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/07/2020 | 2485231/20-7 | 10452 -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto Bula<br>60/12              | - | - | - | - | 4. O que devo saber<br>antes de usar este<br>medicamento? | VP     | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |
| 18/04/2020 | 1188876/20-8 | 10459 -<br>GENÉRICO<br>Inclusão Inicial<br>de Texto de<br>Bula - RDC<br>60/12 | - | - | - | - | Versão Inicial                                            | VP/VPS | 25 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>50 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60<br><br>100 MG COM REV<br>CT BL AL/AL X 60 |