

L

anestésico local

S.S.WHITE 100

cloridratos de
lidocaína e de fenilefrina

SSWHITE

DENOMINAÇÃO GENÉRICA DOS PRINCÍPIOS ATIVOS

cloridrato de lidocaína monoidratada - DCB nº11386

cloridrato de fenilefrina - DCB nº 03926

Solução injetável

cloridrato de lidocaína 2g% e cloridrato de fenilefrina 0,04g%

S.S.White Artigos Dentários S.A.

BULA PARA O PACIENTE

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Cloridrato de Lidocaína 2%

Cloridrato de fenilefrina 0,04%

APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo 50 carpules de 1,8 mL.

PARENTERAL, COM INJEÇÃO INTRA-ÓSSEA, CONJUNTIVAL E INTRACANAL USO PEDIÁTRICO e ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada carpule contém:

cloridrato de lidocaína 0,036g

cloridrato de fenilefrina 0,00072g

Veículo aquoso isotônico q.s.p..... 1,8 mL

O veículo aquoso isotônico contém: cloreto de sódio, metilparabeno, metabissulfito de sódio e metilparabeno.

I - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O Anestésico Local S.S.White 100 é indicado para anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O **Anestésico Local S.S.White 100** irá provocar a perda da sensibilidade na região em que o cirurgião-dentista irá trabalhar por interromper temporariamente o movimento do impulso nervoso.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso tenha alguma alergia aos componentes da fórmula.

Se estiver tomando medicamentos como paracetamol ou fenacetina.

Os anestésicos locais do tipo amida são contra-indicados em pacientes com histórico de hipersensibilidade e não deve ser administrado em pacientes com hipovolemia, bloqueio cardíaco ou outros distúrbios de condução.

Para o uso do anestésico, mulheres grávidas devem seguir a orientação médica ou do cirurgião-dentista. Durante o período de aleitamento materno ou doação de leite humano, só utilize o anestésico com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois pode ser excretados no leite humano, podendo causar reações indesejáveis no bebê.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

As reações alérgicas a anestésicos locais são bastante raras. As reações adversas são geralmente sistêmicas, sendo manifestada por excitação, sonolência, nervosismo, vertigem, visão nublada, náuseas e vômitos, espasmos muscular e convulsão. O paciente deve ter cuidado para não traumatizar os lábios, língua, mucosa da bochecha ou palato mole quando estas estruturas forem anestesiadas. A ingestão de alimentos deve ser adiada até a volta da função e sensibilidade normais.

Uso em crianças: crianças com menos dez anos de idade raramente é necessário administrar ½ tubete (0,9 a 1 ml) da solução anestésica para obter o anestesiamento para o tratamento em um único dente.

Informe seu cirurgião-dentista se tiver suspeita ou confirmação de anemia.

Uso em idosos: a dose deverá ser a suficiente para produzir o efeito anestésico

Uso em pacientes com problemas de falha cardíaca congestiva, bradicardia , depressão respiratória ou insuficiência hepática a administração deve ser feita com cautela.

Nos doentes com mau estado geral e nos pacientes idosos, a dose ser diminuída.

Uso em pacientes com distúrbios mentais: pode ocorrer o risco de trauma tecidual.O cirurgião dentista deve alertar os responsáveis do paciente.

Interações Medicamentosas

Com o Cloridrato de Lidocaína

A administração simultânea de medicamentos vasopressores para o tratamento da hipotensão relacionada aos bloqueios obstétricos e de substâncias ocitócicas do tipo Ergô, poderá causar hipertensão grave e persistente ou acidentes cerebrovasculares.

Com o cloridrato de Fenilefrina

O uso concomitante de cloridrato de fenilefrina com outras aminas simpatomiméticas pode aumentar o risco de hipertensão e outros efeitos adversos cardiovasculares. A fenilefrina pode reduzir a eficácia de beta bloqueadores e outros anti-hipertensivos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5.ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar à temperatura ambiente de 15 a 30 °C protegido da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O Anestésico Local S.S.White 100 apresenta-se como solução límpida e isenta de partículas estranhas, contida em carpule. A qualquer alteração de cor do conteúdo do carpule, descarte-o.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6.COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O Anestésico Local S.S.WHITE 100 é de uso exclusivo do cirurgião dentista ou médico em consultório ou ambiente ambulatorial.

2. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O Anestésico Local S.S.WHITE 100 é de uso exclusivo do cirurgião dentista ou médico, sendo dos profissionais a responsabilidade do seu uso.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

3. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

No sistema nervoso central pode manifestar-se por excitação, sonolência, nervosismo, vertigem, visão nublada, náuseas e vômitos , tremores espasmo muscular e convulsão. Podem ficar doentes a língua e a região perioral.

Efeitos no sistema cardiovascular resultam em hipotensão , bradicardia arritmia e parada cardíaca raramente pode ocorrer.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

4. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O Anestésico Local S.S.WHITE 100 é de uso exclusivamente profissional no consultório, a dose que o paciente recebe é de responsabilidade do profissional. Caso isso ocorra, o próprio cirurgião-dentista irá detectar e dar os primeiros socorros.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento.

III - DIZERES LEGAIS

Reg. MS Nº 1.0411.0001.0043

Farmacêutico Responsável: Arnildo Kuwer Neto CRF RJ 3000

S.S.WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A

Rua Senador Alencar,160- Rio de Janeiro -RJ-Brasil

CNPJ 68.567.650/0001-57

Indústria Brasileira

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): 0800 701 0132

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DE CIRURGIÃO DENTISTA
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL**



Uso exclusivo do cirurgião-dentista.
Registro M. S. nº 1.0411.0001.004-3
Farm. Resp. Arnildo Kuwer Neto CRF RJ 3000

Produzido por S.S.White Artigos Dentários S/A
Rua Senador Alencar, 160 – Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CNPJ 68.567.650/0001-57
Indústria Brasileira

<http://www.sswhite.com.br>
e-mail: sac@sswhite.com.br

