



# LIDOJET

(cloridrato de lidocaína)

União Química Farmacêutica Nacional S/A

Solução injetável

20 mg/mL

## **LIDOJET**

cloridrato de lidocaína



### **Solução injetável**

---

#### **MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA**

#### **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

##### **FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

Solução injetável 20 mg/mL: embalagem contendo 10 frascos-ampola de 20 mL.

##### **USO PARENTERAL**

##### **ANESTESIA LOCORREGIONAL**

##### **NÃO ESTÁ INDICADO PARA RAQUIANESTESIA**

##### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

##### **COMPOSIÇÃO**

Cada mL contém:

cloridrato de lidocaína monoidratada .....21,330 mg\*

\*Equivalente à 20 mg de cloridrato de lidocaína anidro.

Veículos: cloreto de sódio, hidróxido de sódio, metilparabeno e água para injetáveis.

##### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

LIDOJET solução injetável é indicado para produção de anestesia local ou regional por técnicas de infiltração como a injeção percutânea; por anestesia regional endovenosa; por técnicas de bloqueio de nervo periférico como o plexo braquial e intercostal; e por técnicas neurais centrais, como os bloqueios epidural lombar e caudal.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

A solução injetável de LIDOJET contém o anestésico local cloridrato de lidocaína com indicação para infiltração e bloqueios nervosos. A lidocaína estabiliza a membrana neuronal por inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos efetuando deste modo a ação do anestésico local.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A lidocaína é contraindicada em pacientes com conhecida hipersensibilidade a anestésicos locais do tipo amida ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O PRODUTO SOMENTE DEVERÁ SER ADMINISTRADO POR PROFISSIONAIS EXPERIENTES NO DIAGNÓSTICO E CONTROLE DA TOXICIDADE DOSE-DEPENDENTE EMPREGADA E DE OUTRAS EMERGÊNCIAS AGUDAS QUE POSSAM SURTIR DO TIPO DE BLOQUEIO UTILIZADO, E SOMENTE DEPOIS DE SE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE OXIGÊNIO E DE OUTROS MEDICAMENTOS PARA RESSUSCITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E DE PESSOAL TREINADO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO E CONTROLE DAS REAÇÕES TÓXICAS E EMERGÊNCIAS RELACIONADAS.(ver itens “8. Quais os males que este medicamento pode me causar?” e “9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?”).

A FALTA OU A DEMORA NO ATENDIMENTO DA TOXICIDADE DOSE-RELACIONADA DO FÁRMACO E DA HIPOVENTILAÇÃO, SEJA QUAL FOR O MOTIVO E/OU ALTERAÇÕES NA SENSIBILIDADE, PODERÁ LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DA ACIDOSE, PARADA CARDÍACA E POSSÍVEL ÓBITO.

Quando apropriado, os pacientes devem ser informados anteriormente da possibilidade de perda temporária da sensação e atividade motora na metade inferior do corpo após administração de anestesia epidural.

A lidocaína deve ser usada com cuidado em pessoas com conhecida sensibilidade à ela.

As soluções de anestésicos locais contendo conservantes antimicrobianos (como por exemplo metilparabeno) não devem ser usadas para anestesia intratecal porque a segurança desses agentes não foi estabelecida em relação à injeção intratecal, intencional ou acidental.

#### **Gravidez:**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **Amamentação**

Da mesma forma que outros anestésicos locais, a lidocaína é excretada pelo leite materno, porém em pequenas quantidades, de tal modo que geralmente o risco é mínimo para a criança, quando utilizada nas doses terapêuticas.

Segundo a Academia Americana de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde a utilização de lidocaína pela mãe é compatível com a amamentação.

#### **Uso pediátrico**

Dosagens em crianças devem ser reduzidas, correspondentes a idade, peso corporal e condições físicas. (ver item “6. Como devo usar este medicamento?”).

#### **Interações medicamentosas**

A administração simultânea de fármacos vasopressores, para o tratamento da hipotensão relacionada aos bloqueios obstétricos e de fármacos ocitócicos do tipo Ergot, poderá causar hipertensão grave e persistente ou acidentes cerebrovasculares.

#### **Alterações de exames laboratoriais**

A injeção intramuscular de cloridrato de lidocaína pode resultar no aumento do nível de creatinina fosfoquinase. Portanto, o uso da determinação desta enzima sem separação da isoenzima, como teste de diagnóstico para a presença de infarto agudo do miocárdio, pode ficar comprometido pela injeção intramuscular de cloridrato de lidocaína.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Manter o produto em sua embalagem original e evitar calor excessivo (temperatura superior à 40°C); proteger da luz.

O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).

Os produtos parenterais deverão ser examinados visualmente quanto à presença de partículas estranhas e de alteração da cor do produto antes da administração. Não usar o produto se este contiver precipitado ou se sua coloração estiver rosada ou mais escura que levemente amarelada.

Agentes desinfetantes contendo metais pesados, que causem liberação dos respectivos íons (mercúrio, zinco, cobre, etc.) não devem ser usados na desinfecção da pele ou membranas mucosas, pois têm sido relatadas incidências de inchaço e edema.

A solução não deve ser mantida em contato com metais, porque o anestésico local promove a ionização do metal, liberando íons na solução, os quais podem ocasionar irritação tissular no local da injeção.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto físico:** solução límpida incolor.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A tabela de dosagens recomendadas, abaixo, resume os volumes e concentrações de cloridrato de lidocaína para os vários tipos de procedimentos anestésicos. As dosagens sugeridas nesta tabela são para adultos normais saudáveis e refere-se ao uso de solução sem vasoconstritor.

Quando grandes volumes são necessários, somente soluções com vasoconstritor devem ser usadas, exceto naqueles casos em que os fármacos vasopressores são contraindicados.

Estas doses recomendadas servem somente como guia para a quantidade de anestésico necessária na maioria dos procedimentos de rotina. Os volumes e concentrações reais a serem usadas dependem de fatores tais como, o tipo e extensão do procedimento cirúrgico, intensidade da anestesia e extensão do relaxamento muscular necessário, duração necessária da anestesia e da condição física do paciente. Em todos os casos devem ser adotadas a mais baixa concentração e a menor dose que produzam os resultados desejáveis. As dosagens devem ser reduzidas para crianças, para pacientes idosos e debilitados e para pacientes com doenças cardíacas e/ou hepáticas.

O início da anestesia, a duração da anestesia e a extensão do relaxamento muscular são proporcionais ao volume e concentração (dose total) do anestésico local usado.

Portanto, o aumento de concentração e volume do injetável de cloridrato de lidocaína injetável, diminui o tempo de início da anestesia, prolonga a duração da anestesia, promove uma grande extensão do relaxamento muscular e aumenta a expansão segmentar da anestesia.

Entretanto, aumentando o volume e concentração do cloridrato de lidocaína injetável, pode resultar numa profunda queda de pressão sanguínea quando usado em anestesia epidural.

Embora a incidência de outros efeitos com lidocaína seja muito baixa, deve ser executado com cautela o emprego de grandes volumes e concentrações, visto que a incidência de outros efeitos é diretamente proporcional à dose total do agente anestésico local injetado.

### **Dosagens recomendadas da solução injetável de cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor (sem epinefrina).**

#### **Infiltração**

**Infiltração percutânea:** concentração: 0,5 ou 1,0 %; volume 1 a 60 mL; dose total 5 a 300 mg

**Infiltração regional endovenosa:** concentração: 0,5%; volume 10 a 60 mL; dose total 50 a 300 mg

**Bloqueio nervoso periférico braquial:** concentração: 1,5 %; volume 15 a 20 mL; dose total 225 a 300 mg

**Bloqueio nervoso periférico dental:** concentração: 2,0 %; volume 1 a 5 mL; dose total 20 a 100 mg

**Bloqueio nervoso periférico intercostal:** concentração: 1,0 %; volume 3 mL; dose total 30 mg

**Bloqueio nervoso periférico paravertebral:** concentração: 1,0 %; volume 3 a 5 mL; dose total 30 a 100 mg

**Bloqueio nervoso periférico pudendo (de cada lado):** concentração: 1,0 %; volume 10 mL; dose total 100 mg

#### **Paracervical**

**Analgesia obstétrica (de cada lado):** concentração: 1,0 %; volume 10 mL; dose total 100 mg

#### **Bloqueio neural simpático**

**Cervical (gânglio estrelado):** concentração: 1,0 %; volume 5 mL; dose total 50 mg

**Lombar:** concentração: 1,0 %; volume 5 a 10 mL; dose total 50 a 100 mg

#### **Bloqueio neural central**

**Epidural\* torácico:** concentração: 1,0 %; volume 20 a 30 mL; dose total 200 a 300 mg

**Epidural\* lombar:** concentração: 1,0 %; volume 25 a 30 mL; dose total 250 a 300 mg

**Epidural\* analgesia:** concentração: 1,5 %; volume 15 a 20 mL; dose total 225 a 300 mg

**Epidural\* anestesia:** concentração: 2,0 %; volume 10 a 15 mL; dose total 200 a 300 mg

**Caudal analgesia obstétrica:** concentração: 1,0 %; volume 20 a 30 mL; dose total 200 a 300 mg

**Caudal analgesia cirúrgica:** concentração: 1,5 %; volume 15 a 20 mL; dose total 225 a 300 mg

\* A dose é determinada pelo número de dermatômos a serem anestesiados (2 a 3 mL/dermatômo).

Observação: As concentrações e volumes sugeridos servem somente como um guia. Outros volumes e concentrações podem ser usados contanto que as doses máximas recomendadas não sejam excedidas.

#### **Bloqueio epidural caudal e lombar**

Como precaução para possíveis reações adversas, observadas quando da perfuração não intencional no espaço subaracnoideo, uma dose teste de 2 a 3 mL de cloridrato de lidocaína a 1,5% deve ser administrada durante no mínimo 5 minutos antes da injeção do volume total necessário para o bloqueio epidural lombar ou caudal. A dose teste deve ser repetida em pacientes em que houve deslocamento do cateter.

A epinefrina, se contida na dose teste (10 a 15 µg têm sido sugeridos), pode servir como precaução de injeção intravascular não intencional.

Se injetado dentro do vaso sanguíneo, esta quantidade de epinefrina produz uma transitória “reação epinefrina” dentro de 45 segundos, consistindo no aumento do batimento cardíaco e pressão sanguínea sistólica, palidez perioral, palpitação e inquietação no paciente não sedado.

O paciente sedado pode exibir somente um aumento na pulsação de 20 ou mais batimentos por minuto por 15 ou mais segundos.

Pacientes sob a ação de betabloqueadores podem não manifestar alterações no batimento cardíaco, mas a pressão sanguínea monitorada pode detectar um aumento leve da pressão sanguínea sistólica. Deve-se aguardar um tempo adequado para o início da anestesia após a administração de cada dose teste.

No caso de injeção conhecida de grande volume de solução de anestésico local dentro do espaço subaracnoideo, após adequada ressuscitação e se o cateter estiver posicionado, considerar a recuperação do medicamento por drenagem em quantidade moderada do líquido (cerca de 10 mL) através do cateter epidural.

### **Dosagens máximas recomendadas**

**Adultos:** Lidocaína usada sem epinefrina, a dose máxima individual de não deve exceder 4,5 mg/kg do peso corporal e em geral recomenda-se que a dose máxima total não exceda 300 mg.

Para anestesia epidural ou caudal contínua, a dose máxima recomendada não deve ser administrada em intervalos menores que 90 minutos.

Quando anestesia epidural lombar ou caudal contínua for usada para procedimentos não obstétricos, uma quantidade maior de fármaco pode ser administrado para a produção adequada de anestesia.

A dose máxima recomendada por um período de 90 minutos de cloridrato de lidocaína para bloqueio paracervical em pacientes obstétricos e não obstétricos é de 200 mg.

Usualmente aplicam-se 50% da dose total em cada lado. Injetar lentamente esperando 5 minutos para cada lado.

**Crianças:** é difícil a recomendação de dose máxima sobre qualquer fármaco para crianças, pelas variações em função da idade e peso. Para crianças com mais de 3 anos de idade que tenham uma massa corporal normal sem gordura e desenvolvimento normal do corpo, a dose máxima recomendada é determinada pela idade e o peso da criança. Por exemplo, para uma criança com 5 anos pesando cerca de 25 kg, a dose de cloridrato de lidocaína não deve exceder 75 a 100 mg (3,0 a 4,0 mg/kg).

Na prevenção contra toxicidade sistêmica, apenas pequenas concentrações e doses efetivas devem ser usadas. Em alguns casos será necessário ter disponíveis concentrações diluídas com 0,9% de cloreto de sódio injetável para obter concentrações finais necessárias.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uma vez que este medicamento é administrado por um profissional da saúde em ambiente hospitalar não deverá ocorrer esquecimento do seu uso.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

As reações adversas listadas a seguir foram obtidas de dados de farmacovigilância e na literatura médica. Como estas reações são reportadas voluntariamente a partir de uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou relação causal com a exposição do medicamento.

**Reação muito comum (>1/10):** eritema (vermelhidão da pele) e petéquias (pontos vermelhos).

**Reação comum (>1/100 e <1/10):** edema (inchaço) e prurido (coceira).

As reações muito comuns e comuns foram descritas em adultos e crianças não graves.

Reações adversas com frequência desconhecida: cefaleia (dor de cabeça), sensação de ardência nos olhos, hiperemia conjuntiva (olho vermelho) e alteração no epitélio córneo (superfície dos olhos).

- **Sistêmicos:** hipersensibilidade, idiossincrasia ou da tolerância diminuída por parte do paciente.
- **Sistema nervoso central:** crises de ausência, nervosismo, apreensão, euforia, confusão, vertigem, sonolência, zumbido, visão nebulosa ou dupla, vômitos, sensação de calor, frio ou entorpecimento, contrações, tremores, convulsões, inconsciência, depressão e parada respiratória.
- **Sistema cardiovascular:** bradicardia (alteração do batimento cardíaco), hipotensão (diminuição da pressão arterial) e colapso cardiovascular, podendo resultar em parada cardíaca.
- **Alérgicas:** lesões cutâneas (lesões de pele), urticária (coceira), edema (inchaço) ou reações anafilactóides (reações similares às alérgicas).
- **Neurológicas:** Em estudo realizado com 10.440 pacientes que receberam lidocaína para anestesia espinal, a incidência de reações adversas relatadas foi de cerca de 3% para dor de cabeça postural, hipotensão e dor nas costas; 2% para tremores e menos que 1 % para sintomas nervosos periféricos, náusea, respiração inadequada e visão dupla.

Subseqüentes reações adversas podem depender particularmente da quantidade de medicamento administrada no espaço subaracnóideo (dentro do espaço da medula espinal). Isto pode incluir bloqueio espinal de grandeza variada (incluindo bloqueio espinal total), hipotensão secundária ao bloqueio espinal, perda do controle da bexiga e intestino, e perda da sensação perineal e função sexual. A persistente deficiência motora, sensorial e/ou autonômica (controle do esfíncter) de alguns segmentos espinais inferiores, com lenta recuperação (vários meses) ou incompleta recuperação, têm sido relatada raramente, quando da realização de bloqueio epidural caudal ou lombar. Dores nas costas e cefaleia têm sido observadas na utilização destes procedimentos anestésicos.

Há relatos de casos permanentes de lesões na musculatura extraocular, necessitando de cirurgia reparatória devido à administração retrobulbar.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Uma vez que este medicamento é administrado por um profissional de saúde em ambiente hospitalar não deverá ocorrer uso de uma quantidade maior do que a indicada deste produto, porém em caso de contato inadequado com esta medicação fora do ambiente hospitalar o paciente deve ser encaminhado prontamente ao serviço de pronto socorro mais próximo.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **DIZERES LEGAIS**

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

#### **USO RESTRITO A HOSPITAIS**

Registro MS – 1.0497.0111

Registrado por:

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-095

CNPJ 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas

CRF-SP nº 49136

Fabricado por:

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, nº 4.550

Bairro Aeroporto  
Pouso Alegre – MG – CEP: 37560-100  
CNPJ: 60.665.981/0005-41  
Indústria Brasileira

Ou

Fabricado na unidade fabril:  
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, nº 4.550  
Bairro Aeroporto  
Pouso Alegre – MG – CEP: 37560-100  
CNPJ: 60.665.981/0005-41  
Indústria Brasileira

Embalado por:  
**ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA.**  
Taboão da Serra - SP  
Indústria Brasileira

Ou

Registrado por:  
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90  
Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-095  
CNPJ 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

Fabricado por:  
**ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA.**  
Taboão da Serra - SP  
Indústria Brasileira  
Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas  
CRF-SP nº 49136



SAC 0800 011 1559

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 23/09/2019.**

**Anexo B**  
**Histórico de Alteração para a Bula**

| Dados da submissão eletrônica |                                     |                                                                                                                    | Dados da petição/notificação que altera bula |                  |                                                                                    |                   | Dados das alterações de bulas                      |                    |                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº do expediente                    | Assunto                                                                                                            | Data do expediente                           | Nº do expediente | Assunto                                                                            | Data de aprovação | Itens de Bula                                      | Versões (VP / VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                               |
| 08/2025                       | Gerado no momento do peticionamento | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | 30/05/2025                                   | 0734112/25-1     | 12161 - SIMILAR<br>– Mudança de<br>local de<br>fabricação<br>decorrente de<br>PGMP | 30/05/2025        | DIZERES LEGAIS                                     | VP<br><br>VPS      | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL<br><br>CX 12 FA VD<br>TRANS X 20 ML<br>(SAFETY<br>PACK)<br>CT 10 FA VD<br>TRANS X 20 ML |
| 04/03/2022                    | 0831788/22-4                        | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | N/A                                          | N/A              | N/A                                                                                | N/A               | IDENTIFICAÇÃO<br>DO PRODUTO<br>- DIZERES<br>LEGAIS | VP<br>VPS          | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL                                                                                         |

|            |              |                                                                                                                    |            |              |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                      |           |                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 25/02/2021 | 0758091/21-6 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | N/A        | N/A          | N/A                                                                       | N/A        | - IDENTIFICAÇÃO<br>DO PRODUTO<br>- 6. COMO DEVO<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br><br>- IDENTIFICAÇÃO<br>DO<br>PRODUTO<br>- 8. POSOLOGIA E<br>MODO DE USAR<br>- 9. REAÇÕES<br>ADVERSAS | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |
| 22/09/2020 | 3235436/20-3 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | 29/03/2019 | 0282540/19-6 | 11093 - RDC<br>73/2016 -<br>SIMILAR -<br>Inclusão de nova<br>apresentação | 01/07/2019 | - FORMA<br>FARMACÊUTICA E<br>APRESENTAÇÕES                                                                                                                                           | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |
| 30/01/2020 | 0305640/20-6 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | N/A        | N/A          | N/A                                                                       | N/A        | - FORMA<br>FARMACÊUTICA E<br>APRESENTAÇÕES<br>- REAÇÕES<br>ADVERSAS                                                                                                                  | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |

|            |              |                                                                                                                    |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 28/09/2018 | 0944418/18-1 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. PARA QUE ESTE<br>MEDICAMENTO É<br>INDICADO?<br>4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>5. ADVERTÊNCIAS<br>E PRECAUÇÕES<br>6. COMO DEVO<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>8. POSOLOGIA E<br>MODO DE USAR<br>9. REAÇÕES<br>ADVERSAS<br>DIZERES LEGAIS | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |
| 17/05/2018 | 0396383/18-7 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | IDENTIFICAÇÃO<br>DO<br>MEDICAMENTO                                                                                                                                                                                                                                           | VP        | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |
|            |              |                                                                                                                    |     |     |     |     | IDENTIFICAÇÃO<br>DO<br>MEDICAMENTO<br>2.<br>RESULTADOS<br>DE EFICÁCIA<br>4.CONTRAINDIC<br>AÇÕES<br>5.<br>ADVERTÊNCIAS<br>E<br>PRECAUÇÕES                                                                                                                                     | VPS       |                                  |
| 19/12/2017 | 2300323/17-5 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES<br>DE USAR ESTE<br>MEDICAMENTO<br>?<br>8. QUAIS OS<br>MALES QUE<br>ESTE<br>MEDICAMENTO<br>PODE ME<br>CAUSAR?<br>9. O QUE<br>FAZER SE                                                                                                            | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |

|            |              |                                                                                                                    |            |              |                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
|            |              |                                                                                                                    |            |              |                                                                                                            |            | ALGUÉM<br>USATR UMA<br>QUANTIDADE<br>MAIOR QUE A<br>INDICADA<br>DESTE<br>MEDICAMENTO<br>?<br><br>2.<br>RESULTADOS<br>DE EFICÁCIA<br>5.ADVERTENCI<br>AS E<br>PRECAUÇÕES<br>6.INTERAÇÕES<br>MEDICAMENTO<br>SAS<br>9.REAÇÕES<br>ADVERSAS |           |                                  |
| 11/09/2017 | 1937094/17-6 | 10450 –<br>SIMILAR –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>bulário RDC<br>60/12 | 12/08/2017 | 1693515/17-2 | 11012 - RDC<br>73/2016 -<br>SIMILAR -<br>Inclusão de local<br>de embalagem<br>secundária do<br>medicamento | 12/08/2017 | DIZERES<br>LEGAIS                                                                                                                                                                                                                     | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |
| 28/05/2015 | 0471364/15-8 | 10457 –<br>SIMILAR –<br>Inclusão Inicial<br>de Texto de Bula<br>– publicação no<br>bulário RDC<br>60/12            | N/A        | N/A          | N/A                                                                                                        | N/A        | VERSÃO<br>INICIAL                                                                                                                                                                                                                     | VP<br>VPS | Solução<br>injetável<br>20 mg/mL |

