

# amoxicilina

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999.



## Cápsula

LEIA ESTA BULA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO.

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Cápsula 500 mg: embalagem contendo 21 cápsulas.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 40 KG)

### COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

amoxicilina tri-hidratada.....574,26 mg\*

\*equivalente a 500 mg de amoxicilina

Excipientes: estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio e croscarmellose sódica.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A amoxicilina, antibiótico eficaz contra grande variedade de bactérias, é indicada para tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da amoxicilina. Entretanto, seu médico pode receitar este medicamento para outro uso. Se desejar mais informações, pergunte ao seu médico.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento contém uma penicilina chamada amoxicilina como ingrediente ativo. A amoxicilina pertence ao grupo dos antibióticos penicilínicos. A amoxicilina é usada no tratamento de uma gama de infecções causadas por bactérias, que podem manifestar-se nos pulmões (pneumonia e bronquite), nas amígdalas (amigdalite), nos seios da face (sinusite), no trato urinário e genital, na pele e nas mucosas. A amoxicilina atua destruindo as bactérias que causam essas infecções.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não pode ser administrado nem ingerido por pessoas alérgicas à amoxicilina, a outros antibióticos penicilínicos ou antibióticos similares, chamados cefalosporinas. Se você já teve uma reação alérgica (como erupções da pele) ao tomar um antibiótico, deve conversar com seu médico antes de usar amoxicilina.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina, informe seu médico:

- se você já apresentou reação alérgica a algum antibiótico. Isso pode incluir reações na pele ou inchaço na face ou pescoço ou dores no peito;
- se você apresenta febre glandular;
- se você toma medicamentos usados para prevenir coágulos sanguíneos (anticoagulantes), tais como varfarina, o seu médico fará um monitoramento e, se necessário, poderá sugerir ajustes na dose dos anticoagulantes;
- se você apresenta problema nos rins;
- se você não estiver urinando regularmente;
- se você já teve diarreia durante ou após o uso de antibióticos.

O uso prolongado também pode resultar, ocasionalmente, em supercrescimento de microrganismos resistentes a amoxicilina.

Este medicamento pode piorar algumas condições existentes ou causar efeitos colaterais graves, como reações alérgicas severas, reações cutâneas severas, dor no peito, vômitos repetitivos dentro de 1 a 4 horas após a administração de amoxicilina ou diarreia grave (colite pseudomembranosa). Você deve estar atento a determinados sintomas enquanto estiver fazendo uso de amoxicilina para ajudar a reduzir o risco de quaisquer

problemas. Dependendo da gravidade dos seus sintomas, seu médico pode solicitar a interrupção do tratamento com amoxicilina.

Amoxicilina pode causar uma condição grave no sistema imunológico, na qual a parte do corpo que combate doenças fica hiperativa, e essa condição pode ser fatal. Se você apresentar algum dos sintomas listados na seção 8 (Quais os males que este medicamento pode me causar?) enquanto estiver tomando amoxicilina, entre em contato com seu médico imediatamente.

#### **Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas**

Não se observaram efeitos adversos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas.

#### **Gravidez e amamentação**

A amoxicilina pode ser usada na gravidez desde que os benefícios potenciais sejam maiores que os riscos potenciais associados ao tratamento. Informe seu médico se você estiver grávida ou suspeitar que está grávida. Você não deve tomar este medicamento se estiver grávida, exceto se seu médico recomendar.

Você pode amamentar seu bebê enquanto estiver tomando amoxicilina, mas há excreção de quantidades mínimas de amoxicilina no leite materno. Se você estiver amamentando, informe ao seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Uso compatível com o aleitamento ou doação de leite humano. O uso desse medicamento não interfere no aleitamento do bebê.**

#### **Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

As recomendações especiais se referem às doses (ver Posologia, em Como devo usar este medicamento?).

#### **Interações medicamentosas**

Alguns medicamentos podem causar efeitos indesejáveis se você os ingerir durante o tratamento com amoxicilina. Não deixe de avisar seu médico caso você esteja tomando:

- medicamentos usados no tratamento de gota (probenecida ou alopurinol);
  - outros antibióticos;
  - pílulas anticoncepcionais (como acontece com outros antibióticos, talvez sejam necessárias precauções adicionais para evitar a gravidez);
  - anticoagulantes.
- metotrexato (usado para tratar doenças como câncer e psoríase grave).

A alimentação não interfere na ação de amoxicilina, que pode ser ingerido nas refeições.

**Atenção: Contém os corantes vermelho de azorrubina, azul brilhante, amarelo de quinolina e dióxido de titânio.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo profissional de saúde habilitado, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Cuidados de armazenamento**

##### **Manter fora do alcance de crianças**

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C); proteger da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto físico:** cápsula de gelatina dura nº 0, corpo cinza e tampa bordô, contendo pó branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Siga as orientações de seu médico sobre a maneira e a hora correta de tomar o medicamento. Ele vai decidir a quantidade diária que você precisa e o tempo durante o qual você deve usar este medicamento.

Leia esta bula com cautela. Se você tiver alguma dúvida, fale com seu médico.

Recomenda-se ingerir o medicamento nas refeições, embora ele continue eficaz mesmo que você o tome em outros horários.

Continue tomando este medicamento até o fim do tratamento prescrito pelo médico. Não pare somente porque se sente melhor.

**As cápsulas devem ser ingeridas inteiras com água. Não as mastigue.**

### **Posologia**

Atenção! Para algumas doses indicadas abaixo (doses inferiores a 500 mg) é necessário o uso da suspensão oral, converse com seu médico ou farmacêutico em caso de dúvida.

### **Dose para adultos e crianças acima de 40 kg**

**Dose padrão:** 500 mg (uma cápsula) três vezes ao dia (de 8 em 8 horas) nas infecções mais graves.

Tratamento com dosagem alta (máximo recomendável de 6 g ao dia em doses divididas): recomenda-se uma dose de 3 g (seis cápsulas) duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas) em casos que requerem tratamento de infecção respiratória purulenta (com a presença de pus) grave ou recorrente.

**Tratamento de curta duração (gonorreia): dose única de 3 g.**

**Erradicação de *Helicobacter pylori*:** para combater o *Helicobacter* (bactéria que ataca o estômago e o duodeno), recomenda-se o uso de amoxicilina no esquema de 1 g duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas), em associação com um medicamento conhecido como inibidor da bomba de prótons (exemplo: omeprazol, lansoprazol) e outro agente antimicrobiano (por exemplo claritromicina, metronidazol), por 7 dias.

### **Pacientes com insuficiência renal (dos rins)**

Na insuficiência renal, a eliminação do antibiótico é mais lenta. Conforme o grau dessa condição, seu médico pode indicar a redução da dose diária total de acordo com o esquema descrito a seguir.

### **Adultos e crianças acima de 40 kg:**

- insuficiência leve: nenhuma alteração de dose;
- insuficiência moderada: máximo de 500 mg (uma cápsula) duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas);
- insuficiência grave: máximo de 500 mg (uma cápsula) ao dia;

### **Pacientes que recebem diálise peritoneal**

Usa-se a mesma posologia indicada para pacientes com insuficiência renal grave. A diálise peritoneal (processo de limpeza das substâncias tóxicas do organismo através do peritônio, membrana que envolve o abdômen) não remove a amoxicilina do corpo.

### **Pacientes que recebem hemodiálise**

Usa-se a mesma posologia indicada para pacientes com insuficiência renal grave.

A amoxicilina é removida do sangue por hemodiálise (processo que substitui os rins na filtragem sanguínea). Portanto, uma dose adicional (500 mg para adultos e crianças acima de 40 kg ou 15 mg/kg para crianças abaixo de 40 kg) pode ser administrada durante e no final de cada diálise.

Seu médico poderá indicar tratamento por via parenteral (feito com aplicação de injeções intravenosas, intramusculares ou subcutâneas) nos casos em que a via oral for considerada inadequada (particularmente nos tratamentos urgentes de infecções graves).

Conforme o grau de insuficiência renal, talvez seu médico ache necessário reduzir a dose diária total.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**  
**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.**  
**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar, mas continue com o horário normal das demais. Só não tome duas doses com intervalo igual ou menor que 1 hora.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Avise seu médico o mais cedo possível se você não se sentir bem durante o tratamento com amoxicilina. Assim como todo medicamento, amoxicilina pode provocar reações adversas, porém isso não ocorre com todas as pessoas. Os efeitos colaterais deste medicamento geralmente são leves. Dependendo da gravidade dos seus sintomas, seu médico pode solicitar a interrupção do tratamento com amoxicilina.

##### **Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Diarreia (várias evacuações amolecidas por dia) e enjoo; quando isso acontece, os sintomas normalmente são leves e com frequência podem ser evitados tomando-se o medicamento no início das refeições. Se continuarem ou se tornarem graves, consulte o médico.
- Erupções da pele.

##### **Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Vômito, urticária e coceira.

##### **Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Diminuição de glóbulos brancos (leucopenia reversível), que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca.
- Baixa contagem de plaquetas (trombocitopenia reversível), que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas roxas) que surgem com mais facilidade que o normal.
- Níveis elevados de proteína no sangue que armazena ferro no corpo.
- Níveis elevados de triglicerídeos no sangue.
- Destruição de glóbulos vermelhos e consequentemente anemia (anemia hemolítica), que pode resultar em cansaço, dores de cabeça e falta de ar causada pela prática de exercícios físicos, vertigem, palidez e amarelamento da pele e/ou dos olhos.
- Sinais repentinos de alergia, como erupções da pele, prurido (coceira) ou urticária, inchaço da face, dos lábios, da língua ou de outras partes do corpo, falta de ar, respiração ofegante ou problemas para respirar; se esses sintomas ocorrerem, pare de usar amoxicilina e procure socorro médico o mais rápido possível.
- Dor no peito, que pode ser um sinal de uma reação alérgica potencialmente grave chamada síndrome de Kounis.
- Vômitos repetitivos (1 a 4 horas após a administração de **amoxicilina**), dores no estômago, sonolência anormal, diarreia e pressão baixa, que podem ser um sinal de uma reação alérgica grave denominada síndrome de enterocolite induzida por medicamentos.
- Convulsões (ataques) podem ocorrer em pacientes com função renal prejudicada ou que estejam recebendo doses altas do medicamento.
- Hipercinesia (presença de movimentos exacerbados e incontrolados), tontura.
- Candidíase mucocutânea, infecção micótica (causada por fungos) que normalmente afeta as partes íntimas ou a boca; na área genital, pode provocar coceira e queimação (com a presença de uma fina camada de secreção branca), e na boca ou na língua podem surgir pintas brancas dolorosas.
- Colite associada a antibióticos [inflamação no cólon (intestino grosso)], causando diarreia grave, que também pode conter sangue e ser acompanhada de cólicas abdominais.
- Sua língua pode mudar de cor, ficando amarela, marrom ou preta, e dar a impressão de ter pelos (língua pilosa negra).
- Inflamação da membrana que reveste o cérebro (meningite asséptica);
- Erupção cutânea com bolhas dispostas em círculo com crosta central ou como um colar de pérolas (doença IgA linear);
- Efeitos relacionados ao fígado; esses sintomas podem manifestar-se como enjoo, vômito, perda de apetite, sensação geral de mal-estar, febre, coceira, amarelamento da pele e dos olhos e escurecimento da urina e aumento de algumas substâncias (enzimas) produzidas pelo fígado.

- Reações cutâneas graves: erupção cutânea (eritema multiforme), que pode formar bolhas (com pequenas manchas escuras centrais rodeadas por uma área pálida, com um anel escuro ao redor da borda); erupção cutânea generalizada com bolhas e descamação da pele na maior parte da superfície corporal (necrólise epidérmica tóxica); erupções na pele com bolhas e descamação, especialmente ao redor da boca, nariz, olhos e genitais (síndrome de Stevens-Johnson); erupções na pele com bolhas contendo pus (exantema pustuloso); (erupções escamosas na pele, com bolhas e inchaços sob a pele (dermatite esfoliativa bolhosa).
- Doença renal (problemas para urinar, possivelmente com dor e presença de sangue ou cristais na urina).
- Sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue [incluindo o aumento de glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas] [reação do medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS)].
- Uma erupção cutânea vermelha comumente observada em ambos os lados das nádegas, parte interna superior das coxas, axilas, pescoço (Exantema Intertriginoso e Flexural Simétrico Relacionado a Medicamentos (SDRIFE)).
- Condição grave do sistema imunológico (linfo-histiocitose hemofagocítica/síndrome de ativação de macrófagos), os sinais incluem: febre; erupções cutâneas; problemas relacionados aos nervos, como tremores ou agitação, estado confusional; dor na parte do abdômen; amarelamento da pele e/ou dos olhos; glândulas inchadas no pescoço, axila e/ou virilha; sangramento e/ou hematomas com mais facilidade, aparência pálida e sensação de cansaço.

**Se qualquer desconforto incomum se manifestar enquanto você estiver tomando o medicamento, informe seu médico o mais breve possível.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

É pouco provável que ocorram problemas graves em caso de superdosagem de amoxicilina. As reações mais comuns são enjoo, vômito e diarreia. Procure seu médico para que os sintomas sejam tratados.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DE RECEITA**

### **DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.0497.1359

#### **Registrado por:**

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-095

CNPJ: 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira

#### **Produzido por:**

**CIMED Indústria de Medicamentos Ltda.**

Pouso Alegre – MG

Indústria Brasileira

OU

#### **Produzido por:**

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**

Guarulhos – SP

Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1559



**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 06/11/2025.**

**Anexo B**  
**Histórico de Alteração para a Bula**

| Dados da submissão eletrônica |                                     |                                                                                                | Dados da petição/notificação que altera bula |                  |         |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº do expediente                    | Assunto                                                                                        | Data do expediente                           | Nº do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de Bula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Versões (VP / VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/2025                       | Gerado no momento do peticionamento | 10452 – GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | N/A                                          | N/A              | N/A     | N/A               | <p>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?</p> <p>9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?</p> <p>DIZERES LEGAIS</p> <p>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <p>8. POSOLOGIA E MODO DE USAR</p> <p>9. REAÇÕES ADVERSAS</p> <p>DIZERES LEGAIS</p> | VP<br><br>VPS      | <p>Cápsula dura 500 mg</p> <p>CT BL AL PLAS PVC TRANS X 15</p> <p>CT BL AL PLAS PVC TRANS X 18</p> <p>CT BL AL PLAS PVC TRANS X 21</p> <p>CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30</p> <p>CT BL AL PLAS PVC TRANS X 300</p> <p>CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500</p> |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/07/2025 | 0878715/25-8 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>5. ONDE, COMO E POR<br>QUANTO TEMPO<br>POSSO GUARDAR<br>ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>DIZERES LEGAIS<br><br>5.ADVERTÊNCIAS E<br>PRECAUÇÕES<br>7.CUIDADOS DE<br>ARMAZENAMENTO<br>DO MEDICAMENTO<br>DIZERES LEGAIS | VP<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>VPS | Cápsula dura<br>500 mg<br><br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 15<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 18<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 21<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 30<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 300<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 500 |
| 17/02/2025 | 0218462/25-5 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>DIZERES LEGAIS<br><br>5. ADVERTÊNCIAS E<br>PRECAUÇÕES<br>DIZERES LEGAIS                                                                                                                                    | VP<br><br><br><br><br><br><br>VPS             | Cápsula dura<br>500 mg<br><br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 15<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 18<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 21<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 30<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 300<br>CT BL AL PLAS<br>PVC TRANS X 500 |
| 15/01/2024 | 0045263/24-8 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –                                          | N/A | N/A | N/A | N/A | -IDENTIFICAÇÃO DO<br>PRODUTO<br>4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE                                                                                                                                                                                               | VP<br><br>VPS                                 | Cápsula dura<br>500 mg<br><br>CAP GEL DURA CT<br>BL AL PLAS PVC                                                                                                                                                                                |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12                                                                               |     |     |     |     | <p>MEDICAMENTO?</p> <p>5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?</p> <p>-IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO</p> <p>8. POSOLOGIA E MODO DE USAR</p> <p>9. REAÇÕES ADVERSAS</p> |  | <p>TRANS X 15</p> <p>CAP GEL DURA CT</p> <p>BL AL PLAS PVC</p> <p>TRANS X 18</p> <p>CAP GEL DURA CT</p> <p>BL AL PLAS PVC</p> <p>TRANS X 21</p> <p>CAP GEL DURA CT</p> <p>BL AL PLAS PVC</p> <p>TRANS X 30</p> <p>CAP GEL DURA CT</p> <p>BL AL PLAS PVC</p> <p>TRANS X 300 (EMB HOSP)</p> <p>CAP GEL DURA CT</p> <p>BL AL PLAS PVC</p> <p>TRANS X 500 (EMB HOSP)</p> <p>PO SUS CT FR VD</p> <p>AMB X 150 ML +</p> <p>COP X 15 ML</p> |
| 03/07/2023 | 0681174/23-4 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | <p>2. RESULTADOS DE EFICÁCIA</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS</p> <p>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</p> <p>6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS</p> <p>8. POSOLOGIA E MODO DE USAR</p>                                                                                                                |  | <p>Cápsula</p> <p>500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 (EMB HOSP)</p> <p>500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 300 (EMB HOSP)</p> <p>500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30</p> <p>500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS</p>                                                                                                                                                                    |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     | 9. REAÇÕES ADVERSAS<br>DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                            |                               | X 21<br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/06/2022 | 4298988/22-8 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | - 4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>- 8. QUAIS OS MALES<br>QUE ESTE<br>MEDICAMENTO<br>PODE ME CAUSAR?<br>5. ADVERTÊNCIAS E<br>PRECAUÇÕES<br>9. REAÇÕES<br>ADVERSAS | VP<br><br><br><br><br><br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18 |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                  |           | 500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10/05/2022 | 2698320/22-2 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | - DIZERES LEGAIS | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15 |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2021 | 1659291/21-3 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | - DIZERES LEGAIS<br><br>-9. REAÇÕES<br>ADVERSAS<br>- DIZERES LEGAIS                        | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15 |
| 12/11/2019 | 3114964/19-2 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de                                                             | N/A | N/A | N/A | N/A | IDENTIFICAÇÃO DO<br>PRODUTO<br>6. COMO DEVO<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>DIZERES LEGAIS | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12                                                            |     |     |     |     | 8. QUAIS OS MALES<br>QUE ESTE<br>MEDICAMENTO<br>PODE ME CAUSAR?<br>DIZERES LEGAIS<br><br>IDENTIFICAÇÃO<br>1. INDICAÇÕES<br>3.<br>CARACTERÍSTICAS<br>FARMACOLÓGICAS<br>MODO DE USAR<br>9. REAÇÕES<br>ADVERSAS<br>DIZERES LEGAIS |           | X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15 |
| 29/09/2017 | 2045642/17-5 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8. QUAIS OS MALES<br>QUE ESTE<br>MEDICAMENTO<br>PODE ME CAUSAR?<br>5.ADVERTÊNCIAS E<br>PRECAUÇÕES<br>9.REAÇÕES<br>ADVERSAS                                                                                                     | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS                                                                                                                                                                                                                     |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                              |           | X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15 |
| 19/01/2017 | 0099829/17-0 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO? | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS                                                           |

|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15                                                                                     |
| 07/04/2015 | 0301029/15-5 | 10452 –<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | - Restrição de uso por<br>faixa etária<br>- 3. Quando não devo<br>usar este<br>medicamento?<br>- 5. Onde, como e por<br>quanto tempo posso<br>guardar este<br>medicamento?<br>- 6. Como devo usar<br>este medicamento?<br><br>- Restrição de uso por<br>faixa etária<br>- 2. Resultados de<br>eficácia<br>- 4. Contraindicações<br>- 7. Cuidados de<br>armazenamento do<br>medicamento<br>- 8. Posologia e modo<br>de usar | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS |

|            |              |                                                                              |     |     |     |     |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                              |     |     |     |     |                |           | X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15                                                                                                                                                                                                                       |
| 20/11/2013 | 0973232/13-2 | 10459 –<br>GENÉRICO –<br>Inclusão Inicial<br>de Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | Versão Inicial | VP<br>VPS | Cápsula<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 500 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 300 (EMB HOSP)<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 30<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 21<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X 18<br><br>500 MG CAP GEL<br>DURA CT BL AL<br>PLAS PVC TRANS<br>X 15 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|