

**bromoprida**

**GERMED FARMACÊUTICA LTDA**

**Cápsula dura**

**10 mg**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

bromoprida

“Medicamento Genérico, Lei nº. 9.787, de 1999”

### APRESENTAÇÕES

Cápsula dura de 10 mg. Embalagem contendo 6, 7, 10, 20, 30\*, 60\*, 100\*\*, 200\*\* ou 500\*\* unidades.

\*Embalagem fracionável

\*\*Embalagem hospitalar

### USO ORAL

#### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

Cada cápsula dura de 10 mg contém:

bromoprida ..... 10 mg

excipiente\* q.s.p. .... 1 cap dura

\*manitol, hipromelose, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, talco, estearato de magnésio.

Componentes da cápsula: gelatina, dióxido de titânio, azul brilhante, vermelho allura 129.

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A bromoprida está indicada para:

- distúrbios da motilidade gastrointestinal (alteração na movimentação do estômago e intestino);
- refluxo gastroesofágico (presença de conteúdo ácido dentro do esôfago proveniente do estômago);
- náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

A bromoprida é utilizada também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A bromoprida é um medicamento que estimula o movimento do tubo digestivo.

Tempo médio de início de ação: a ação da bromoprida se inicia 1 a 2 horas após administração por via oral.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A bromoprida não deve ser utilizada nos seguintes casos:

- em pacientes com antecedentes de alergia aos componentes da fórmula;
- quando a estimulação da motilidade gastrointestinal for perigosa, como por exemplo, na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal;
- em pacientes epilépticos ou que estejam recebendo outras drogas que possam causar reações extrapiramidais (relacionadas à coordenação dos movimentos), uma vez que a frequência e intensidade destas reações podem ser aumentadas;
- em pacientes com feocromocitoma (tumor da medula da suprarrenal), pois pode desencadear crise hipertensiva (aumento da pressão arterial), devido à provável liberação de catecolaminas (hormônio produzido pela glândula suprarrenal) do tumor. Tal crise hipertensiva pode ser controlada com fentolamina.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O uso de bromoprida deve ser cauteloso em gestantes, crianças, idosos, pessoas que sofrem de glaucoma (aumento da pressão intraocular), diabetes, doença de Parkinson, insuficiência dos rins e pressão alta. A bromoprida também deve ser usada com cautela caso você tenha apresentado alergia à neurolépticos (medicamentos antipsicóticos).

#### Gravidez e amamentação

Não existem estudos adequados e bem controlados com bromoprida em mulheres grávidas. A bromoprida é excretada pelo leite materno. Por isso, não deve ser administrada a mulheres grávidas ou que amamentam, a menos que, a critério médico os benefícios potenciais para a paciente superem os possíveis riscos para o feto ou recém-nascido.

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano. O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### **Populações especiais**

#### **Idosos**

A ocorrência de discinesia tardia (movimentos anormais ou perturbados) tem sido relatada em pacientes idosos tratados por períodos prolongados. Entretanto, não há recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento por pacientes idosos.

#### **Crianças**

As reações extrapiramidais (como inquietude, movimentos involuntários, fala enrolada, entre outros) podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens e podem ocorrer após uma única dose.

#### **Pacientes diabéticos**

A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos.

A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma hipoglicemia. Informe ao seu médico caso seja diabético e utilize insulina, pois a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes.

#### **Pacientes com insuficiência dos rins**

Considerando-se que a bromoprida é eliminada principalmente pelos rins, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada. Dependendo da sua condição clínica e caso julgue necessário, o seu médico poderá ajustar a dose do medicamento.

#### **Pacientes com câncer de mama**

A bromoprida pode aumentar os níveis de prolactina (hormônio lactogênico), o que deve ser considerado em pacientes com câncer de mama detectado previamente.

#### **Sensibilidade cruzada**

Informe ao médico se você tem alergia à procaina (anestésico) ou procainamida (medicamento para arritmia cardíaca), pois neste caso a bromoprida deve ser usada com cautela.

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, azul brilhante e vermelho allura 129.**

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

#### **- medicamento-medicamento**

Os efeitos de bromoprida na motilidade gastrointestinal (movimentos do estômago e intestinos) são antagonizados (inibidos) pelas drogas anticolinérgicas (medicamentos que inibem a ação da acetilcolina) e analgésicos narcóticos (medicamentos para a dor). Pode haver aumento dos efeitos sedativos quando se administra bromoprida junto com sedativos, hipnóticos, narcóticos ou tranquilizantes. Portanto, evite ingerir esses medicamentos durante o tratamento com bromoprida.

Informe ao seu médico caso você tenha pressão alta e esteja sob tratamento com inibidores da monoaminoxidase (tipo de medicamento antidepressivo), pois neste caso, a bromoprida deve ser usada com cuidado.

A bromoprida pode diminuir a absorção de fármacos pelo estômago (p/ex. digoxina) e acelerar aquelas que são absorvidas pelo intestino delgado (p/ex. paracetamol, tetraciclina, levodopa, etanol).

#### **- medicamento-substância química, com destaque para o álcool**

Pode haver aumento dos efeitos sedativos quando se administra bromoprida junto com álcool. Portanto, evite ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento com bromoprida.

#### **- medicamento-alimento**

Não há dados disponíveis até o momento sobre a interferência de alimentos na ação de bromoprida.

#### **- medicamento-exame laboratorial**

Não há dados disponíveis até o momento sobre a interferência de bromoprida em testes laboratoriais.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Aspecto do medicamento:

Cápsula de gelatina dura, na cor azul, contendo granulado na cor branca a levemente amarelada.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A bromoprida cápsula deve ser ingerida com líquido, por via oral.

### **Posologia**

A bromoprida cápsulas: tomar 1 cápsula de 12/12 horas ou de 8/8 horas, conforme orientação médica (dose máxima 60 mg/dia).

Não há estudos dos efeitos de bromoprida administrada por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

### **Populações especiais**

#### **Pacientes com insuficiência dos rins**

Considerando-se que a bromoprida é eliminada principalmente pelos rins, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada. Dependendo da sua condição clínica e caso julgue necessário, o seu médico poderá ajustar a dose do medicamento.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso esqueça de administrar uma dose de bromoprida, administre-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reação muito comum: inquietação, sonolência, cansaço e lassidão (diminuição de forças, esgotamento).

Com menor frequência podem ocorrer insônia, dor de cabeça, tontura, náuseas, sintomas extrapiramidais (relacionados à coordenação dos movimentos), galactorreia (produção de leite excessiva ou inadequada), aumento das mamas em homens, erupções cutâneas, incluindo urticária ou distúrbios intestinais.

As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, enquanto que movimentos anormais ou perturbados são comuns em idosos sob tratamentos prolongados.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento não existem casos publicados de superdose com o uso de bromoprida. Entretanto, caso seja administrada uma dose muito acima da dose recomendada, o aumento teórico das reações adversas descritas anteriormente não pode ser descartado.

Sintomas de superdose podem incluir sonolência, desorientação e reações extrapiramidais (relacionadas à coordenação dos movimentos). Os sintomas geralmente desaparecem em 24 horas.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III - DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.0583.0681

Registrado por: **GERMED FARMACÊUTICA LTDA**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, KM 08

Bairro Chácara Assay

Hortolândia/SP – CEP: 13186-901

CNPJ: 45.992.062/0001-65

Indústria Brasileira

Produzido por: **NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**

Manaus/AM



### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

SAC: 0800-747 60 60



Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 12/08/2025.

**bula-pac-036067-GER-v2**

### Histórico de Alteração da Bula

| Dados da submissão eletrônica |                |                                                                          | Dados da petição/notificação que altera bula |                |                                                                          |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº. expediente | Assunto                                                                  | Data do expediente                           | Nº. expediente | Assunto                                                                  | Data de aprovação | Itens de bula                                                                                                                                                                                                                                       | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                                                                  |
| 01/07/2014                    | 0514438/14-8   | 10459 – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12         | 01/07/2014                                   | 0514438/14-8   | 10459 – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12         | 01/07/2014        | Atualização de texto de bula conforme bula padrão publicada no bulário.<br><br>Submissão eletrônica para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.                                                                         | VP/VPS           | Cápsula gelatinosa dura de 10mg. Embalagem contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*, 100**, 200** ou 500** cápsulas. *Embalagem Fracionável. **Embalagem Hospitalar. |
| 26/11/2014                    | 1063212/14-3   | 10452 – GENÉRICO – Notificação de Alteração de texto de Bula – RDC 60/12 | 26/11/2014                                   | 1063212/14-3   | 10452 – GENÉRICO – Notificação de Alteração de texto de Bula – RDC 60/12 | 26/11/2014        | Adequação dos itens abaixo:<br>- APRESENTAÇÃO<br>- COMPOSIÇÃO<br>- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br>- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?<br>- CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO (PROFISSIONAL) | VP/VPS           | Cápsula dura de 10mg. Embalagem contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*, 100**, 200** ou 500** cápsulas. *Embalagem Fracionável. **Embalagem Hospitalar.            |

|            |              |                                                                                         |            |              |                                                                                                                                                |                                                  |                                  |        |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/02/2015 | 0122911/15-7 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | 09/02/2015 | 0122911/15-7 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12                                                     | 09/02/2015                                       | Alteração no item:<br>COMPOSIÇÃO | VP/VPS | Cápsula dura de 10mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** cápsulas.<br>*Embalagem Fracionável.<br>**Embalagem Hospitalar. |
| 02/06/2015 | 0489401/15-4 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | 04/05/2015 | 0382137/15-4 | 10249 –<br>GENÉRICO –<br>Inclusão de<br>local de<br>fabricação<br>do<br>medicamento<br>de liberação<br>convencional<br>com prazo de<br>análise | 25/05/2015<br>(RE N°<br>1.554, de<br>22/05/2015) | III-DIZERES LEGAIS               | VP/VPS | Cápsula dura de 10mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** cápsulas.<br>*Embalagem Fracionável.<br>**Embalagem Hospitalar. |
| 23/05/2016 | 1795419/16-3 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | N/A        | N/A          | N/A                                                                                                                                            | N/A                                              | III-DIZERES LEGAIS               | VP/VPS | Cápsula dura de 10mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** cápsulas.<br>*Embalagem Fracionável.<br>**Embalagem Hospitalar. |

|            |              |                                                                                         |     |     |     |     |                                                                          |        |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2021 | 0323115/21-1 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | III-DIZERES LEGAIS                                                       | VP     | Cápsula dura de 10mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** cápsulas.<br>*Embalagem Fracionável.<br>**Embalagem Hospitalar. |
|            |              |                                                                                         |     |     |     |     | 9. Reações Adversas<br>III-DIZERES LEGAIS                                | VPS    |                                                                                                                                                              |
| 30/06/2022 | 4365293/22-2 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | DIZERES LEGAIS                                                           | VP/VPS | Cápsula dura de 10mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** unidades.<br>*Embalagem fracionável<br>**Embalagem hospitalar   |
| 03/04/2024 | 0418671/24-9 | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4. O que devo saber antes<br>de usar este medicamento?<br>Dizeres Legais | VP     | Cápsula dura de 10 mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** unidades.<br>*Embalagem fracionável<br>**Embalagem hospitalar  |
|            |              |                                                                                         |     |     |     |     | 5. Advertências e<br>Precauções<br>Dizeres Legais                        | VPS    |                                                                                                                                                              |
| -          | -            | 10452 –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4. O que devo saber antes<br>de usar este medicamento?<br>Dizeres Legais | VP     | Cápsula dura de 10 mg. Embalagem<br>contendo 6, 7, 10, 20, 30*, 60*,<br>100**, 200** ou 500** unidades.<br>*Embalagem fracionável<br>**Embalagem hospitalar  |
|            |              |                                                                                         |     |     |     |     | 5. Advertências e<br>Precauções<br>Dizeres Legais                        | VPS    |                                                                                                                                                              |