

**amoxicilina**

**GERMED FARMACÊUTICA LTDA**

**Cápsula dura**

**500 mg**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

amoxicilina

“Medicamento Genérico, Lei nº. 9.787, de 1999”

### APRESENTAÇÕES

Cápsula dura de 500 mg. Embalagem contendo 15, 21, 30, 60\*, 72\*, 360\*\*, 504\*\* ou 510\*\* unidades.

\*Embalagem fracionável

\*\*Embalagem hospitalar

### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 40 KG)

### COMPOSIÇÃO

Cada cápsula dura de 500 mg contém:

amoxicilina tri-hidratada\* ..... 573,944 mg

excipiente\*\* q.s.p..... 1 cap dura

\*equivalente a 500 mg de amoxicilina.

\*\*croscarmelose sódica, estearato de magnésio e talco.

Componentes da cápsula dura: gelatina, dióxido de titânio, vermelho de azorrubina, azul brilhante e vermelho de eritrosina laca de alumínio.

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A amoxicilina, antibiótico eficaz contra grande variedade de bactérias, é indicada para tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da amoxicilina. Entretanto, seu médico pode receitar este medicamento para outro uso. Se desejar mais informações, pergunte ao seu médico.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A amoxicilina contém uma penicilina como ingrediente ativo. A amoxicilina pertence ao grupo dos antibióticos penicilínicos. A amoxicilina é usada no tratamento de uma gama de infecções causadas por bactérias, que podem manifestar-se nos pulmões (pneumonia e bronquite), nas amígdalas (amigdalite), nos seios da face (sinusite), no trato urinário e genital, na pele e nas mucosas. A amoxicilina atua destruindo as bactérias que causam essas infecções.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não pode ser administrado nem ingerido por pessoas alérgicas à amoxicilina, a outros antibióticos penicilínicos ou antibióticos similares, chamados cefalosporinas. Se você já teve uma reação alérgica (como erupções da pele) ao tomar um antibiótico, deve conversar com seu médico antes de usar amoxicilina.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina, informe seu médico:

- se você já apresentou reação alérgica a algum antibiótico. Isso pode incluir reações na pele, inchaço na face, pescoço ou dores no peito;
- se você apresenta febre glandular;
- se você toma medicamentos usados para prevenir coágulos sanguíneos (anticoagulantes), tais como varfarina, o seu médico fará um monitoramento e, se necessário, poderá sugerir ajustes na dose dos anticoagulantes;
- se você apresenta problema nos rins;
- se você não estiver urinando regularmente;
- se você já teve diarreia durante ou após o uso de antibióticos.

O uso prolongado também pode resultar, ocasionalmente, em supercrescimento de microrganismos resistentes a amoxicilina. A amoxicilina pode piorar algumas condições existentes ou causar efeitos colaterais graves, como reações alérgicas severas, reações cutâneas severas, dor no peito, vômitos repetitivos dentro de 1 a 4 horas após a administração de amoxicilina ou diarreia grave (colite pseudomembranosa). Você deve estar atento a determinados sintomas enquanto estiver recebendo amoxicilina para ajudar a reduzir o risco de quaisquer problemas.

### Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas

Não se observaram efeitos adversos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas.

### **Gravidez e amamentação**

A amoxicilina pode ser usada na gravidez desde que os benefícios potenciais sejam maiores que os riscos potenciais associados ao tratamento. Informe ao seu médico se você estiver grávida ou suspeitar que está grávida. Você não deve tomar este medicamento se estiver grávida, exceto se seu médico recomendar.

Você pode amamentar seu bebê enquanto estiver tomando amoxicilina, mas há excreção de quantidades mínimas de amoxicilina no leite materno. Se você estiver amamentando, informe ao seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Uso compatível com o aleitamento ou doação de leite humano. O uso desse medicamento não interfere no aleitamento do bebê.**

### **Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

As recomendações especiais se referem às doses (vide “Como Devo Usar Este Medicamento? em Posologia”).

### **Interações medicamentosas**

Alguns medicamentos podem causar efeitos indesejáveis se você os ingerir durante o tratamento com amoxicilina. Não deixe de avisar ao seu médico caso você esteja tomando:

- medicamentos usados no tratamento de gota (probenecida ou alopurinol);
- outros antibióticos;
  - pílulas anticoncepcionais (como acontece com outros antibióticos, talvez sejam necessárias precauções adicionais para evitar a gravidez);
- anticoagulantes.
- metotrexato (usado para tratar doenças como câncer e psoríase grave).

A alimentação não interfere na ação de amoxicilina, que pode ser ingerida nas refeições.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, azul brilhante, vermelho de eritrosina laca de alumínio, vermelho de azorrubina que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo profissional de saúde habilitado, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Aspecto do medicamento: Cápsulas de gelatina dura, de cor vermelha na cabeça e azul no corpo, contendo granulado branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Modo de usar**

Siga as orientações de seu médico sobre a maneira e a hora correta de tomar o medicamento. Ele vai decidir a quantidade diária que você precisa e o tempo durante o qual você deve usar este medicamento.

Leia esta bula com cautela. Se você tiver alguma dúvida, fale com seu médico.

Recomenda-se ingerir o medicamento nas refeições, embora ele continue eficaz mesmo que você o tome em outros horários.

Continue tomando este medicamento até o fim do tratamento prescrito pelo médico. Não pare somente porque se sente melhor.

As cápsulas devem ser ingeridas inteiras com água. Não as mastigue.

#### **Posologia**

Atenção! Para algumas doses indicadas abaixo (doses inferiores a 500 mg) é necessário o uso da suspensão oral,

converse com seu médico ou farmacêutico em caso de dúvida.

### **Dose para adultos e crianças acima de 40 kg**

Dose padrão: 500 mg (uma cápsula) três vezes ao dia (de 8 em 8 horas) nas infecções mais graves. **Tratamento com dosagem alta (máximo recomendável de 6 g ao dia em doses divididas):** recomenda-se uma dose de 3 g (seis cápsulas) duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas) em casos que requerem tratamento de infecção respiratória purulenta (com a presença de pus) grave ou recorrente.

**Tratamento de curta duração (gonorreia):** dose única de 3 g.

**Erradicação de *Helicobacter pylori*:** para combater o *Helicobacter* (bactéria que ataca o estômago e o duodeno), recomenda-se o uso de amoxicilina no esquema de 1 g duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas), em associação com um medicamento conhecido como inibidor da bomba de prótons (exemplo omeprazol, lansoprazol) e outro agente antimicrobiano (por exemplo claritromicina, metronidazol), por 7 dias.

### **Pacientes com insuficiência renal (dos rins)**

Na insuficiência renal, a eliminação do antibiótico é mais lenta. Conforme o grau dessa condição, seu médico pode indicar a redução da dose diária total de acordo com o esquema descrito a seguir.

Adultos e crianças acima de 40 kg

- insuficiência leve: nenhuma alteração de dose;
- insuficiência moderada: máximo de 500 mg (uma cápsula) duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas);
- insuficiência grave: máximo de 500 mg (uma cápsula) ao dia.

### **Pacientes que recebem diálise peritoneal**

Usa-se a mesma posologia indicada para pacientes com insuficiência renal grave. A diálise peritoneal (processo de limpeza das substâncias tóxicas do organismo através do peritônio, membrana que envolve o abdômen) não remove a amoxicilina do corpo.

### **Pacientes que recebem hemodiálise**

Usa-se a mesma posologia indicada para pacientes com insuficiência renal grave.

A amoxicilina é removida do sangue por hemodiálise (processo que substitui os rins na filtragem sanguínea). Portanto, uma dose adicional (500 mg para adultos e crianças acima de 40 kg ou 15 mg/kg para crianças abaixo de 40 kg) pode ser administrada durante e no final de cada diálise.

Seu médico poderá indicar tratamento por via parenteral (feito com aplicação de injeções intravenosas, intramusculares ou subcutâneas) nos casos em que a via oral for considerada inadequada (particularmente nos tratamentos urgentes de infecções graves).

Conforme o grau de insuficiência renal, talvez seu médico ache necessário reduzir a dose diária total.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar, mas continue com o horário normal das demais. Só não tome duas doses com intervalo igual ou menor que 1 hora.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Avise ao seu médico o mais cedo possível se você não se sentir bem durante o tratamento com amoxicilina.

Assim como todo medicamento, amoxicilina pode provocar reações adversas, porém isso não ocorre com todas as pessoas. Os efeitos colaterais deste medicamento geralmente são leves.

### **Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

- Diarreia (várias evacuações amolecidas por dia) e enjoo; quando isso acontece, os sintomas normalmente são leves e com frequência podem ser evitados tomando-se o medicamento no início das refeições. Se continuarem ou se tornarem graves, consulte o médico.
- Erupções da pele.

### **Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

- Vômito, urticária e coceira.

### **Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

- Diminuição de glóbulos brancos (leucopenia reversível), que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca;
  - Baixa contagem de plaquetas (trombocitopenia reversível), que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas roxas) que surgem com mais facilidade que o normal;
  - Destruição de glóbulos vermelhos e consequentemente anemia (anemia hemolítica), que pode resultar em cansaço, dores de cabeça e falta de ar causada pela prática de exercícios físicos, vertigem, palidez e amarelamento da pele e/ou dos olhos;
  - Sinais repentinos de alergia, como erupções da pele, prurido (coceira) ou urticária, inchaço da face, dos lábios, da língua ou de outras partes do corpo, falta de ar, respiração ofegante ou problemas para respirar; se esses sintomas ocorrerem, pare de usar amoxicilina e procure socorro médico o mais rápido possível;
  - Dor no peito, que pode ser um sinal de uma reação alérgica potencialmente grave chamada síndrome de Kounis;
  - Vômitos repetitivos (1 a 4 horas após a administração de amoxicilina), dores no estômago, sonolência anormal, diarreia e pressão baixa, que podem ser um sinal de uma reação alérgica grave denominada síndrome de enterocolite induzida por medicamentos;
  - Convulsões (ataques) podem ocorrer em pacientes com função renal prejudicada ou que estejam recebendo doses altas do medicamento;
  - Hiperreflexia (presença de movimentos exacerbados e incontrolados), tontura;
  - Candidíase mucocutânea, infecção micótica (causada por fungos) que normalmente afeta as partes íntimas ou a boca; na área genital, pode provocar coceira e queimação (com a presença de uma fina camada de secreção branca), e na boca ou na língua podem surgir pintas brancas dolorosas;
  - Colite associada a antibióticos (inflamação no cólon (intestino grosso), causando diarreia grave, que também pode conter sangue e ser acompanhada de cólicas abdominais);
  - Sua língua pode mudar de cor, ficando amarela, marrom ou preta, e dar a impressão de ter pelos (língua pilosa negra);
  - Inflamação da membrana que reveste o cérebro (meningite asséptica);
  - Erupção cutânea com bolhas dispostas em círculo com crosta central ou como um colar de pérolas (doença IgA linear);
  - Efeitos relacionados ao fígado; esses sintomas podem manifestar-se como enjoo, vômito, perda de apetite, sensação geral de mal-estar, febre, coceira, amarelamento da pele e dos olhos e escurecimento da urina e aumento de algumas substâncias (enzimas) produzidas pelo fígado;
  - Reações cutâneas graves: erupção cutânea (eritema multiforme), que pode formar bolhas (com pequenas manchas escuras centrais rodeadas por uma área pálida, com um anel escuro ao redor da borda); erupção cutânea generalizada com bolhas e descamação da pele na maior parte da superfície corporal (necrólise epidérmica tóxica); erupções na pele com bolhas e descamação, especialmente ao redor da boca, nariz, olhos e genitais (síndrome de Stevens-Johnson); erupções na pele com bolhas contendo pus (dermatite esfoliativa bolhosa); erupções escamosas na pele, com bolhas e inchaços sob a pele (exantema pustuloso);
  - Doença renal (problemas para urinar, possivelmente com dor e presença de sangue ou cristais na urina);
  - Sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue (incluindo o aumento dos glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas) (Reação do medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS)).
  - Uma erupção cutânea vermelha comumente observada em ambos os lados das nádegas, parte interna superior das coxas, axilas, pescoço (Exantema Intertriginoso e Flexural Simétrico Relacionado a Medicamentos (SDRIFE)).
- Se qualquer desconforto incomum se manifestar enquanto você estiver tomando o medicamento, informe seu médico o mais breve possível.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

É pouco provável que ocorram problemas graves em caso de superdosagem de amoxicilina. As reações mais comuns são enjoo, vômito e diarreia. Procure seu médico para que os sintomas sejam tratados.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **III - DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.0583.0880

Registrado por: **GERMED FARMACÊUTICA LTDA**  
 Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, KM 08  
 Bairro Chácara Assay  
 Hortolândia/SP - CEP: 13186-901

CNPJ: 45.992.062/0001-65  
Indústria Brasileira

Produzido por: **MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**  
Jaguariúna/SP

Ou

Produzido por: **MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**  
São Jerônimo/RS

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO - COM RETENÇÃO DA RECEITA**

**SAC: 0800 747 60 00**



**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 26/05/2025.**

**bula-pac-068926-GER-v3**

**Histórico de alteração da bula**

| Dados da submissão eletrônica |                  |                                                                            | Dados da petição/notificação que altera bula |                  |                                                                                                                    |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                |                  |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº do expediente | Assunto                                                                    | Data do expediente                           | Nº do expediente | Assunto                                                                                                            | Data de aprovação | Itens de bula                                                                                                                                | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                                                 |
| 19/12/2013                    | 1069447/13-1     | (10459) – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12         | N/A                                          | N/A              | N/A                                                                                                                | N/A               | Não houve alteração no texto de bula.<br>Submissão eletrônica Apenas para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA. | VP / VPS         | Embalagem com 15,21 ou 30 unidades.<br>Embalagem hospitalar contendo 504 ou 510 unidades                                                   |
| 21/08/2014                    | 0692687/14-8     | (10459) – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12         | 27/06/2014                                   | 0507397/14-9     | (10249) - GENÉRICO - Inclusão de local de fabricação Do medicamento De liberação convencional com prazo de análise | 04/08/2014        | Dizeres Legais                                                                                                                               | VP / VPS         | Embalagem com 15, 21 ou 30 unidades.<br>Embalagem Hospitalar contendo 504 ou 510 unidades.                                                 |
| 13/03/2015                    | 0226104/15-9     | (10452) – GENÉRICO – Notificação De Alteração De Texto De Bula – RDC 60/12 | N/A                                          | N/A              | N/A                                                                                                                | N/A               | Atualização conforme referência                                                                                                              | VP / VPS         | Cápsula dura de 500 mg em embalagem com 15 ou 21 unidades.                                                                                 |
| 25/01/2019                    | 0133732/17-7     | (10452) – GENÉRICO – Notificação De Alteração De Texto De Bula – RDC 60/12 | N/A                                          | N/A              | N/A                                                                                                                | N/A               | 4- O que devo saber antes de usar este medicamento<br>6- Como devo usar este medicamento                                                     | VP / VPS         | Embalagem Com 15, 21 ou 30 unidades.<br>Embalagem hospitalar contendo 360, 504 ou 510 unidades.<br>Embalagem fracionável Contendo 60 ou 72 |

|            |              |                                                                                           |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                           |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                |                               | unidades.                                                                                                                                                                 |
| 18/10/2018 | 1009295/18-1 | 10452)<br>–GENÉRICO –<br>Notificação De<br>Alteração De<br>Texto<br>De Bula –RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | I. Identificação do<br>medicamento<br>6. Como devo usar este<br>medicamento?<br><br>IDentificação<br>Do medicamento<br>1. Indicações<br>3.<br>Características<br>farmacológicas<br>8. Posologia e modo de usar | VP<br><br><br><br><br><br>VPS | Embalagem<br>Com 15, 21 ou 30<br>unidades.<br>Embalagem hospitalar<br>contendo 360, 504 ou<br>510 unidades.<br>Embalagem fracionável<br>contendo<br>60 ou 72 unidades.    |
| 20/11/2019 | 3200523/19-7 | 10452)<br>–GENÉRICO –<br>Notificação De<br>Alteração De<br>Texto<br>De Bula –RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5. Onde, como e por<br>quanto tempo posso<br>guardar este<br>medicamento?<br>8. Quais os<br>Males que este<br>Medicamento podeme causar?                                                                       | VP                            | Embalagem<br>Com 15,<br>21 ou 30 unidades.<br>Embalagem<br>hospitalar<br>contendo 360, 504 ou<br>510 unidades.<br>Embalagem fracionável<br>Contendo 60 ou<br>72 unidades. |
|            |              |                                                                                           |     |     |     |     | 3. Características<br>farmacológicas<br>7. Cuidados de<br>armazenamento do<br>medicamento<br>9. Reações adversas                                                                                               | VPS                           |                                                                                                                                                                           |
| 20/04/2021 | 1510040/21-5 | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula – RDC          | N/A | N/A | N/A | N/A | 9. REAÇÕES ADVERSAS                                                                                                                                                                                            | VPS                           | Embalagem com 15, 21<br>ou 30 unidades.<br>Embalagem hospitalar<br>contendo 360, 504 ou<br>510 unidades.                                                                  |

|            |              |                                                                                           |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 60/12.                                                                                    |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Embalagem fracionável<br>contendo 60 ou 72<br>unidades.                                                                                                                               |
| 27/07/2022 | 4461495/22-1 | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula – RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | <p>I. - IDENTIFICAÇÃO DO<br/>MEDICAMENTO<br/>COMPOSIÇÃO<br/>APRESENTAÇÕES</p> <p>4. O QUE DEVO SABER<br/>ANTES DE USAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>5. ONDE, COMO E POR<br/>QUANTO TEMPO POSSO<br/>GUARDAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>6. COMO DEVO USAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>7. O QUE DEVO FAZER<br/>QUANDO EU ME ESQUECER<br/>DE USAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>8. QUAIS OS MALES QUE<br/>ESTE MEDICAMENTO PODE<br/>ME CAUSAR?</p> <p>III - DIZERES LEGAIS</p> <p>I. - IDENTIFICAÇÃO DO<br/>MEDICAMENTO<br/>COMPOSIÇÃO<br/>APRESENTAÇÕES</p> <p>1. INDICAÇÕES</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS<br/>FARMACOLÓGICAS</p> <p>5. ADVERTÊNCIAS E<br/>PRECAUÇÕES</p> <p>7. CUIDADOS DE<br/>ARMAZENAMENTO DO<br/>MEDICAMENTO</p> <p>8. POSOLOGIA E MODO DE</p> | <p>VP</p> <p>VPS</p> | <p>Cápsula dura de 500<br/>mg. Embalagem<br/>contendo 15, 21, 30,<br/>60*, 72*, 360**, 504**<br/>ou 510** unidades.<br/>*Embalagem<br/>fracionável<br/>**Embalagem<br/>hospitalar</p> |

|            |              |                                                                                                                       |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                       |     |     |     |     | USAR<br>9. REAÇÕES ADVERSAS<br>III - DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                        |
| 07/07/2023 | 0700034/23-4 | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | VP:<br>4. O QUE DEVO SABER<br>ANTES DE USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>6. COMO DEVO USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>8. QUAIS OS MALES QUE<br>ESTE MEDICAMENTO PODE<br>ME CAUSAR?<br><br>VPS:<br>5. ADVERTÊNCIAS E<br>PRECAUÇÕES<br>6. INTERAÇÕES<br>MEDICAMENTOSAS<br>8. POSOLOGIA E MODO DE<br>USAR<br>9. REAÇÕES ADVERSAS | VP / VPS                                      | Cápsula dura de 500<br>mg. Embalagem<br>contendo 15, 21, 30,<br>60*, 72*, 360**, 504**<br>ou 510** unidades.<br>*Embalagem<br>fracionável<br>**Embalagem<br>hospitalar |
| 12/03/2024 | 0303540/24-9 | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | I - IDENTIFICAÇÃO<br>DO MEDICAMENTO<br>8. QUAIS OS MALES QUE<br>ESTE MEDICAMENTO<br>PODE ME CAUSAR?<br>DIZERES LEGAIS<br><br>I - IDENTIFICAÇÃO<br>DO MEDICAMENTO<br>9. REAÇÕES ADVERSAS<br>DIZERES LEGAIS                                                                                                             | VP<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>VPS | Cápsula dura de 500<br>mg. Embalagem<br>contendo 15, 21, 30,<br>60*, 72*,<br>360**, 504** ou 510**<br>unidades.<br>*Embalagem<br>fracionável<br>**Embalagem hospitalar |

|            |              |                                                                                                                          |                                |                                    |                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/06/2025 | 0842321/25-4 | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12    | 18/06/2025<br><br>(29/05/2025) | 0813692/25-1<br><br>(0727984/25-1) | 10506 - GENÉRICO -<br>Modificação Pós-<br>Registro - CLONE<br><br>(11022 - RDC 73/2016<br>- GENÉRICO -<br>Inclusão de local de<br>fabricação de<br>medicamento de<br>liberação convencional) | 29/05/2025 | <p>VP</p> <p>I - IDENTIFICAÇÃO DO<br/>MEDICAMENTO</p> <p>4. O QUE DEVO SABER<br/>ANTES DE USAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>5. ONDE, COMO E POR<br/>QUANTO TEMPO POSSO<br/>GUARDAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>DIZERES LEGAIS</p> <p>VPS</p> <p>I - IDENTIFICAÇÃO DO<br/>MEDICAMENTO</p> <p>4. ADVERTÊNCIAS E<br/>PRECAUÇÕES</p> <p>5. INTERAÇÕES<br/>MEDICAMENTOSAS</p> <p>6. CUIDADOS DE<br/>ARMAZENAMENTO DO<br/>MEDICAMENTO</p> <p>DIZERES LEGAIS</p> | VP<br><br>VPS | Cápsula dura de 500 mg.<br>Embalagem contendo<br>15, 21, 30, 60*, 72*,<br>360**, 504** ou 510**<br>unidades.<br>*Embalagem fracionável<br>**Embalagem hospitalar |
| -          | -            | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC<br>60/12 | N/A                            | N/A                                | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A        | <p>4. O QUE DEVO SABER<br/>ANTES DE USAR ESTE<br/>MEDICAMENTO?</p> <p>5. ADVERTÊNCIAS E<br/>PRECAUÇÕES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VP<br><br>VPS | Cápsula dura de 500 mg.<br>Embalagem contendo<br>15, 21, 30, 60*, 72*,<br>360**, 504** ou 510**<br>unidades.<br>*Embalagem fracionável<br>**Embalagem hospitalar |