

**DPREV CAPS
(colecalfiferol)**

MYRALIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

CÁPSULA MOLE

5.000 UI / 7.000 UI / 10.000 UI / 50.000 UI

DPREV CAPS

colecalfiferol

APRESENTAÇÕES**Cápsula mole 5.000 UI** - embalagem com 8, 30 e 60 cápsulas moles.**Cápsula mole 7.000 UI** - embalagem com 4, 8, 12, 30 e 60 cápsulas moles.**Cápsula mole 10.000 UI** - embalagem com 2, 4, 8, 10, 12, 15, 16 e 30 cápsulas moles.**Cápsula mole 50.000 UI** - embalagem com 4, 8, 12, 24 e 48 cápsulas moles.**USO ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS****COMPOSIÇÃO**

Cada cápsula mole contém:

colecalfiferol 5.000 UI 5,0 mg

Excipientes: racealfatocoferol, óleo de soja, gelatina, glicerol, amarelo de quinolina, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho, dióxido de titânio e água purificada.

Cada cápsula mole contém:

colecalfiferol 7.000 UI 7,0 mg

Excipientes: racealfatocoferol, óleo de soja, gelatina, glicerol, amarelo de quinolina, óxido de ferro vermelho, dióxido de titânio e água purificada.

Cada cápsula mole contém:

colecalfiferol 10.000 UI 10,0 mg

Excipientes: racealfatocoferol, óleo de soja, gelatina, glicerol, amarelo de quinolina, óxido de ferro amarelo, vermelho cochonilha, dióxido de titânio e água purificada.

Cada cápsula mole contém:

colecalfiferol 50.000 UI 50,0 mg

Excipientes: racealfatocoferol, óleo de soja, gelatina, glicerol, amarelo de quinolina, óxido de ferro amarelo, vermelho cochonilha, vermelho ponceau 4R e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

DPREV CAPS (colecalfiferol) é um medicamento a base de vitamina D₃ (colecalfiferol), indicado para prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea (perda dos minerais do osso), do raquitismo (depósito deficiente de cálcio nos ossos durante o crescimento), osteomalácia (alteração do depósito de minerais nos ossos que pode ocorrer no adulto e idoso) e prevenção no risco de quedas e fraturas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

DPREV CAPS (colecalfiferol) atua na absorção intestinal do cálcio e fósforo, fundamental para a mineralização óssea. A vitamina D₃, no tecido muscular, estimula a síntese proteica, crescimento dos miócitos e transporte de cálcio, e com isso apresenta efeito positivo sobre a força, volume, tônus e velocidade da contração muscular.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

DPREV CAPS (colecalfiferol) não deve ser utilizado em pacientes que apresentem hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É contraindicado também em pacientes que apresentam hipervitaminose D (absorção excessiva da vitamina), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente sanguínea e também em casos de má formação nos ossos.

Restrições a grupos de risco: não existem restrições ou cuidados especiais quanto ao uso do produto por pacientes idosos. Estudos tem relatado que idosos podem ter níveis mais baixos de vitamina D do que os adultos jovens, especialmente aqueles com pouca exposição solar.

Os níveis de referência recomendados para a vitamina D presente no sangue são:

- Acima de 20 ng/mL é o valor desejável para população saudável (até 60 anos);

- Entre 30 e 60 ng/mL é o valor recomendado para grupos de risco como: idosos (acima de 60 anos), indivíduos com fraturas ou quedas recorrentes, gestantes e lactantes, osteoporose (primária e secundária), doenças osteometabólicas, tais como raquitismo, osteomalácia, hiperparatireoidismo, doença crônica dos rins, síndromes de má-absorção, como após cirurgia bariátrica (redução do estômago) e doença inflamatória intestinal, medicações que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D, tais como: terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes, neoplasias malignas, sarcopenia e diabetes;
- Acima de 100 ng/mL: risco de toxicidade e hipercalcemia.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes com arteriosclerose, insuficiência cardíaca, hiperfosfatemia e insuficiência renal devem procurar orientação médica para avaliar risco/benefício da administração da vitamina D. Em caso de hipervitaminose D (absorção excessiva da vitamina D), recomenda-se administrar dieta com baixa quantidade de cálcio, grandes quantidades de líquido e se necessário glicocorticóides.

Informe seu médico caso você utilize antiácidos que contenham magnésio, pois o uso concomitante com vitamina D pode resultar em hipermagnesemia. Não se recomenda o uso simultâneo de vitamina D e calcifediol devido ao efeito aditivo e aumento do potencial tóxico. Preparações que contenham cálcio em doses elevadas ou diuréticos tiazídicos quando usados concomitantemente com vitamina D, aumentam o risco de hipercalcemia e as que contêm fósforo, também em doses elevadas, aumentam o potencial de risco de hiperfosfatemia. Não há restrições específicas quanto à ingestão concomitante de alimentos. As alterações em testes laboratoriais descritas em decorrência do uso da vitamina D são:

- alguns antiepiléticos (ex.: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína e primidona) podem aumentar a necessidade de vitamina D₃. O uso concomitante de **DPREV CAPS** (colecalfiferol) com outros produtos contendo vitamina D₃ não é recomendado devido ao efeito aditivo e aumento do potencial tóxico.
- os anticonvulsivos e os barbitúricos podem acelerar a metabolização de vitamina D₃, reduzindo a sua eficácia.
- alterações endócrinas e metabólicas: a toxicidade pela vitamina D em doses elevadas acima das recomendadas incluindo a nefrocalcinose/insuficiência renal e hipertensão, podem ocorrer com o uso prolongado de colecalfiferol. A hipervitaminose D é reversível com a descontinuação do tratamento ao menos que ocorra dano renal grave.
- anormalidades das gorduras do sangue: efeitos dislipidêmicos do colecalfiferol, caracterizados pela redução do HDL-colesterol e aumento do LDL-colesterol, tem sido observado quando as vitaminas são administradas isoladas em mulheres pós-menopausa.

Recomenda-se que você realize exames de quantificação de vitamina D periodicamente, de acordo com as instruções do seu médico.

Atenção: este medicamento contém soja.

Corantes

Para a concentração 5.000 UI: **Atenção: Contém os corantes amarelo de quinolina, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho e dióxido de titânio.**

Para a concentração 7.000 UI: **Atenção: Contém os corantes amarelo de quinolina, óxido de ferro vermelho e dióxido de titânio.**

Para a concentração 10.000 UI: **Atenção: Contém os corantes amarelo de quinolina, óxido de ferro amarelo, vermelho cochonilha e dióxido de titânio.**

Para a concentração 50.000 UI: **Atenção: Contém os corantes amarelo de quinolina, óxido de ferro amarelo, vermelho cochonilha e vermelho ponceau 4R.**

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O uso desse medicamento não interfere no aleitamento do bebê. Uso compatível com o aleitamento ou doação de leite humano.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o medicamento em sua embalagem original. Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

DPREV CAPS (colecalfiferol), de acordo com suas concentrações, encontra-se na forma de:

- 5.000 UI: Cápsula mole no formato oval, amarelo escuro opaco;
- 7.000 UI: Cápsula mole no formato oval, laranja claro opaco;
- 10.000 UI: Cápsula mole no formato oval, laranja escuro opaco;
- 50.000 UI: Cápsula mole no formato oval, laranja escuro opaco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

DPREV CAPS cápsula mole: deve ser utilizado por via oral.

A dose e a posologia de uso de **DPREV CAPS** devem ser definidas A CRITÉRIO MÉDICO, de acordo com a condição clínica, os níveis sanguíneos de vitamina D de cada paciente e a presença ou não do mesmo nos grupos de risco e a necessidade ou não do uso de doses de ataque ou manutenção, respeitando sempre as faixas terapêuticas definidas pelos estudos de eficácia e segurança. A dosagem pode variar de 1.000UI a 50.000 UI, dependendo da necessidade de uso de doses de ataque ou manutenção. Recomenda-se o monitoramento dos níveis séricos de 25OHD periodicamente após o início do tratamento e adequação da dose assim que os níveis desejados de 25OHD forem atingidos. O uso de suplementos de cálcio pode ser necessário, devendo o médico avaliar a necessidade ou não de uso deste.

Baseado nos estudos de eficácia e segurança que avaliaram o uso de colecalfiferol, recomenda-se as seguintes posologias:

Doses de ataque:

Osteomalácia: Ingerir 50.000 UI por semana ou conforme orientação médica.

Desmineralização óssea e Prevenção de quedas e fraturas em idosos: Ingerir de 6.000 UI a 10.000 UI ao dia ou 50.000 UI por semana ou conforme orientação médica, até a obtenção dos níveis de 25OHD desejados.

Doses de manutenção:

Raquitismo: Ingerir 5.000 UI ao dia, conforme orientação médica.

Osteomalácia: Ingerir de 1.000 UI a 2.000 UI ao dia ou de 7.000 UI a 14.000 UI por semana ou conforme orientação médica, para manutenção dos níveis de 25OHD desejados.

Desmineralização óssea e Prevenção de quedas e fraturas em idosos: Ingerir de 1.000 UI a 2.000 UI ao dia ou de 7.000 UI a 14.000 UI por semana ou conforme orientação médica, para manutenção dos níveis de 25OHD desejados.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Ingerir as cápsulas com quantidade suficiente de líquido.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de administrações repetidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Apesar de não haver a descrição da frequência com que ocorrem as reações adversas na literatura, os seguintes casos foram observados quando ocorre a ingestão excessiva de vitamina D₃: desenvolvimento de hipercalcemia (excesso de cálcio) e seus efeitos associados incluindo hipercalcúria (quantidade elevada de cálcio na urina), calcificação ectópica e dano cardiovascular e renal.

Na hipervitaminose D (absorção excessiva da vitamina), têm sido relatados casos de secura da boca, dor de cabeça, polidipsia (sensação de sede), poliúria (aumento no volume normal de urina), perda de apetite, náuseas, vômitos, fadiga, sensação de fraqueza, aumento da pressão arterial, dor muscular e prurido, perda de peso, gosto metálico, nefrocalcinose ou calcinose vascular e pancreatite. Entretanto, cabe ressaltar que esses casos são observados após administração de doses elevadas durante longos períodos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Na ocorrência de superdosagem a administração do produto deve ser imediatamente interrompida, instituindo-se tratamento sintomático e de suporte.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro: 1.1462.0025

Registrado por: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 - Caixa Postal 011
CEP: 13.864-304 - Aguaí/SP - CNPJ: 17.440.261/0001-25

Produzido por: Catalent Brasil Ltda.
Indaiatuba/SP

VENDA SOB PRESCRIÇÃO



HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA A BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
11/02/2019	0126987/19-9	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	Inclusão da marca DPREV CAPS, e exclusão das informações da concentração de 1.000 UI e 2.000 UI nos itens APRESENTAÇÕES, 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? (VP) e 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO (VPS)	VP / VPS	5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12
06/11/2019	3050897/19-5	10454 -ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Dizeres Legais	VP / VPS	5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12
02/03/2021	0823184/21-2	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	02/03/2021	0818984/21-6	10133 - ESPECÍFICO - Inclusão de local de embalagem secundária	02/03/2021	9. REAÇÕES ADVERSAS (VPS) Dizeres Legais	VP / VPS	5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4

									10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12
27/09/2023	1028906/23-4	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	26/04/2019 24/11/2020	0374671/19-2 4140754/20-7	1886 - ESPECÍFICO - Inclusão de Nova Apresentação Comercial	03/06/2019 22/02/2021	Apresentações	VP / VPS	5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 2 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 15 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 16 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 24 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 48

03/02/2025	0147546/25-7	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? e 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? (VP) 4. CONTRA-INDICAÇÕES e 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES (VPS) Dizeres legais	VP / VPS	5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 2 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 15 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 16 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 24 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 48
10/12/2025	Gerado após o peticionament o	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? (VP) 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES (VPS)	VP / VPS	5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 5000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60

									7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 2 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 15 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 16 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 12 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 24 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--