

# **aceclofenaco**

**Ranbaxy Farmacêutica Ltda**

**Comprimidos revestidos**

**100 mg**

## **I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

### **aceclofenaco**

Medicamento Genérico, Lei nº 9.787 de 1999.

### **APRESENTAÇÕES**

aceclofenaco 100 mg em embalagens com 12 ou 24 comprimidos revestidos.

### **USO ORAL**

### **USO ADULTO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido de 100 mg contém:

aceclofenaco..... 100 mg

Excipientes ..... q.s.p. 1 comprimido revestido

Excipientes: celulose microcristalina, croscarmellose sódica, povidona, palmito estearato de glicerila, hipromelose, dióxido de titânio, macrogol e talco.

## **II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

O aceclofenaco está indicado para o tratamento de processos dolorosos e inflamatórios tais como: dores de dentes, traumatismos, dores musculares (ex: lombares), dores pós-cirúrgicas (após o parto normal, após extração dentária), dores nas articulações dos ombros e reumatismos.

Também é eficaz no tratamento crônico de processos inflamatórios, como artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite anquilosante.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O aceclofenaco é um fármaco anti-inflamatório não esteroideal que é estruturalmente semelhante ao diclofenaco. Apresenta efeitos na inflamação, possuindo propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, o que leva ao alívio de diversas condições dolorosas.

O efeito analgésico do produto se inicia cerca de 30 (trinta) minutos após a ingestão do comprimido.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento é contraindicado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida ao aceclofenaco e/ou a qualquer componente da formulação. O aceclofenaco não deve ser administrado em pacientes alérgicos ao diclofenaco, pois se relata a ocorrência de reações alérgicas graves nestes pacientes, quando em tratamento com agentes anti-inflamatórios não esteroideais. Também não deve ser administrado àqueles que sofrem de broncoespasmo, urticária ou rinite aguda devido ao ácido acetilsalicílico ou a outros anti-inflamatórios não-esteroideais.

O aceclofenaco não deve ser usado em pacientes com úlcera do estômago ou duodeno, em fase ativa. A segurança de aceclofenaco em gestantes não foi testada. Contudo, medicamentos semelhantes podem causar risco fetal humano. Assim, este produto está contraindicado na gravidez, exceto quando, a critério médico, os seus benefícios superem os riscos.

Este produto é contraindicado durante a lactação.

**Pacientes que sofrem de tontura e vertigem ou outros distúrbios nervosos devem evitar tomar medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais quando vão operar automóveis ou outros equipamentos perigosos até que se saiba como estes fármacos em particular os afeta.**

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.**

**Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres grávidas.**

**Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A critério médico, orienta-se fazer um acompanhamento dos pacientes em tratamento prolongado com anti-inflamatórios não hormonais (ex: hemograma, provas de função hepática e renal).

Avise seu médico se você tiver alguma das seguintes doenças: doenças do estômago ou intestino; úlcera; problemas no coração; pressão alta; doenças nos rins; história de cirurgias recentes.

Em pacientes com alterações da função hepática (fígado), a dose de aceclofenaco deve ser reduzida. Como com qualquer outro agente anti-inflamatório não esteroidal, o tratamento de pacientes idosos deve ser conduzido com cautela.

A segurança e a eficácia do aceclofenaco em crianças menores de 12 (doze) anos de idade não foram estabelecidas.

**Não use este medicamento caso tenha problemas no estômago.**

**Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos.**

**Uso na gravidez e lactação:** O aceclofenaco não deve ser administrado quando houver suspeita ou durante a gravidez e lactação, a não ser que, a critério médico, os benefícios do tratamento esperados para a mãe superem os riscos potenciais para o feto. Você deve informar ao médico se está amamentando.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano. O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **Interações medicamentosas**

A administração de anti-inflamatórios não esteroidais com ácido acetilsalicílico não é recomendada pois a terapia concomitante pode aumentar a frequência dos efeitos colaterais.

Os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais aumentam a atividade do lítio e da digoxina.

O controle da pressão sanguínea de pacientes em tratamento com beta-bloqueadores, inibidores da ECA e diuréticos deve ser cuidadosamente monitorado em caso de administração concomitante de agentes anti-inflamatórios não esteroidais. Pacientes em tratamento com este tipo de substância e

concomitante tratamento com diuréticos poupadores de potássio podem apresentar aumento do potássio no sangue.

A administração de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais com anticoagulantes exige acompanhamento cuidadoso e provável ajuste de dosagem do agente anticoagulante.

Existem relatos isolados de hiperglicemia e hipoglicemia em pacientes diabéticos tomando aceclofenaco. Sendo assim, o médico deve levar em conta a possibilidade do ajuste de dosagem de agentes antidiabéticos orais.

Os anti-inflamatórios não esteroidais podem aumentar o potencial de toxicidade da ciclosporina e do metotrexato.

Convulsões podem ocorrer devido à interação entre as quinolonas e anti-inflamatórios não esteroidais. Estas podem ocorrer em pacientes sem história prévia de epilepsia ou convulsões.

### **Ingestão concomitante com outras substâncias**

Recomenda-se informar ao médico caso haja uso concomitante de medicamentos que contenham lítio, digoxina, anticoagulantes, antidiabéticos orais, diuréticos e outros analgésicos.

Não são conhecidas interações deste medicamento com alimentos e álcool. Entretanto, recomenda-se não ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento.

**Atenção: Contém o corante dióxido de titânio.**

**Não tome este medicamento por período maior do que está recomendado na bula ou recomendado pelo médico, pois pode causar problemas nos rins, estômago, intestino, coração e vasos sanguíneos.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### **Aspecto físico e características organolépticas:**

Comprimidos de coloração branca a esbranquiçado, circular, biconvexo e revestidos por película.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Posologia e administração**

A dose usual é de 1 (um) comprimido de 100 mg por via oral a cada 12 (doze) horas. A duração do tratamento pode variar dependendo do caso e deve ser orientada pelo médico.

A posologia deve ser individualizada de acordo com a indicação e características do paciente.

### **Pacientes idosos**

A dose para pacientes idosos deve ser a mesma que a usual para adultos. Entretanto, como ocorre com qualquer outro anti-inflamatório não esteroideal, o tratamento requer cuidados, já que estes pacientes, em geral, são mais susceptíveis às reações adversas a estas substâncias.

### **Insuficiência renal**

Não há evidências de que a dose de aceclofenaco deva ser modificada em pacientes com insuficiência renal leve, bem como não há dados suficientes que suportem o uso de aceclofenaco em pacientes com insuficiência renal grave.

### **Insuficiência hepática**

Para pacientes com insuficiência hepática leve, é indicada uma dose única diária de 100 mg. A segurança do uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais em pacientes com insuficiência hepática de intensidade leve a moderada não foi estudada.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**Esta bula é atualizada com frequência. Entretanto, a bula disponível através do QR Code corresponde à versão mais atual.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Use a medicação assim que se lembrar, caso tenha esquecido uma dose. Se o horário estiver próximo ao que seria a dose seguinte, pule a dose perdida e siga o horário das outras doses normalmente. Não dobre a dose para compensar a dose omitida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

A maioria dos efeitos adversos observados é reversível, e de intensidade leve, incluindo os gastrintestinais e tonturas ocasionais.

As seguintes reações adversas foram relatadas durante os estudos clínicos anteriores à comercialização, compreendendo cerca de 3.000 indivíduos:

### **Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

Gastrintestinais: desconforto gástrico; dor abdominal; náusea e diarreia.

Sistema nervoso central e periférico: tonturas.

Alterações de exames laboratoriais: elevação de enzimas hepáticas (exames que avaliam a integridade do fígado).

**Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

Gastrintestinais: gases; irritação gastrointestinal incluindo gastrites e úlceras pépticas; prisão de ventre; vômitos; estomatite ulcerosa.

Sistema nervoso central e periférico: vertigem.

Dermatológicas: coceira; erupção cutânea; dermatite.

Alterações de exames laboratoriais: aumento da creatinina e ureia (exames que medem a função renal).

**Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

Cardiovasculares: inchaço no corpo.

Respiratórias: falta de ar.

Hematológicas: anemia.

Orgânicos gerais: inchaço no rosto.

Sentidos: alteração da visão.

**Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):**

Gastrintestinais: inflamação do pâncreas; fezes escuras como “borra de café”; outras estomatites; hepatite aguda; icterícia (pele amarela).

Sistema nervoso central e periférico: formigamentos; tremores.

Psiquiátrico: depressão; alterações do sono (sonhos reais); sonolência; insônia.

Dermatológicas: eczema; rubor; manchas roxas pelo corpo.

Cardiovasculares: palpitações.

Musculoesqueléticos: câibras nas pernas.

Respiratórias: broncoespasmo; estridor.

Hematológicas: anemia por destruição dos glóbulos vermelhos; diminuição dos glóbulos brancos; diminuição das plaquetas.

Renais: perda de proteína pela urina.

Orgânicos gerais: dor de cabeça; cansaço; inchaço no rosto; acessos de calor; reações alérgicas; ganho de peso; choque anafilático.

Sentidos: alterações do paladar.

Alterações dos testes laboratoriais: elevação da fosfatase alcalina; elevação do potássio no sangue.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Caso ocorra administração de aceclofenaco em doses maiores do que a recomendada, procure atendimento médico imediatamente. O tratamento é realizado de acordo com o quadro e a gravidade

dos sintomas que podem surgir: irritação e hemorragia gastrintestinais, hipotensão, insuficiência renal, depressão respiratória e convulsões.

A absorção do aceclofenaco pode ser minimizada por lavagem gástrica e tratamento com carvão ativado. A diurese forçada, diálise ou hemoperfusão não são, provavelmente, eficazes na eliminação de agentes anti-inflamatórios não esteroidais como o aceclofenaco, devido à alta taxa de ligação protéica e ao metabolismo extensivo.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III) DIZERES LEGAIS**

**Registro:** 1.2352.0100

**Produzido por:**

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.  
Industrial Area 3 A.B. Road,  
Dewas - 455 001,  
Madhya Pradesh, Índia

**Registrado e importado por:**

Ranbaxy Farmacêutica Ltda.  
Rodovia GO 080 S/N, Lote 1/2, CH Retiro, Faz Planície, Goiânia - GO  
CEP: 74686-100  
CNPJ: 73.663.650/0001-90

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 704 7222

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**



ACEC\_VPAC\_08  
10/2026

## Anexo B – Histórico de Alteração da Bula

| Dados da submissão eletrônica |               |                                                                                         | Dados da petição/notificação que altera a bula |                  |         |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                                                 |                  |                                                                      |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº Expediente | Assunto                                                                                 | Data do expediente                             | Nº do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula                                                                                                                                                                 | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                           |
| 03/07/2014                    | 0529745/14-1  | 10459 –<br>GENÉRICO –<br>Inclusão Inicial<br>de Texto de Bula<br>– RDC 60/12            | N/A                                            | N/A              | N/A     | N/A               | Versão inicial                                                                                                                                                                | VP/VPS           | 100 MG COM REV CT STR<br>AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR<br>AL X 24 |
| 24/02/2016                    | 1298369/16-1  | 1418 -<br>GENÉRICO -<br>Notificação da<br>Alteração de<br>Texto de Bula                 | N/A                                            | N/A              | N/A     | N/A               | Dizeres legais                                                                                                                                                                | VP/VPS           | 100 MG COM REV CT STR<br>AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR<br>AL X 24 |
| 11/08/2017                    | 1682919/17-1  | 10452 -<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>RDC 60/12 | N/A                                            | N/A              | N/A     | N/A               | Dizeres legais<br><br>7. CUIDADOS DE<br>ARMAZENAMENTO DO<br>MEDICAMENTO<br><br>5. ONDE, COMO E POR<br>QUANTO TEMPO POSSO<br>GUARDAR ESTE<br>MEDICAMENTO?                      | VP/VPS           | 100 MG COM REV CT STR<br>AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR<br>AL X 24 |
| 24/11/2017                    | 2232571/17-9  | 10452 -<br>GENÉRICO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>RDC 60/12 | N/A                                            | N/A              | N/A     | N/A               | VP<br>3. QUANDO NÃO DEVO<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>4. O QUE DEVO SABER<br>ANTES DE USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>7. O QUE DEVO FAZER<br>QUANDO EU ME<br>ESQUECER DE USAR | VP/VPS           | 100 MG COM REV CT STR<br>AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR<br>AL X 24 |

|            |              |                                                                        |            |              |                                                                                     |            |                                                                                                                                                           |        |                                                                |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                        |            |              |                                                                                     |            | ESTE MEDICAMENTO?<br>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?<br><br>VPS<br>4. CONTRAINDICAÇÕES<br>9. REAÇÕES ADVERSAS                      |        |                                                                |
| 17/04/2018 | 0297744/18-3 | 10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula RDC 60/12 | N/A        | N/A          | N/A                                                                                 | N/A        | As bulas não sofreram alterações.<br>Peticionamento realizado para disponibilizar as bulas no Bulário Eletrônico.                                         | VP/VPS | 100 MG COM REV CT STR AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR AL X 24 |
| 01/04/2021 | 1254042/21-1 | 10452- GENÉRICO- Notificação da Alteração de Texto de Bula RDC 60/12   | N/A        | N/A          | N/A                                                                                 | N/A        | 9. REAÇÕES ADVERSAS                                                                                                                                       | VPS    | 100 MG COM REV CT STR AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR AL X 24 |
| 10/01/2024 | 0032369/24-7 | 10452- GENÉRICO- Notificação da Alteração de Texto de Bula RDC 60/12   | 24/10/2023 | 1152815/23-7 | 70798 - AFE - ALTERAÇÃO - Medicamentos e/ou Insumos Farmacêuticos - Endereço Matriz | 12/12/2023 | DIZERES LEGAIS VPS<br>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES                                                                                                        | VPS    | 100 MG COM REV CT STR AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR AL X 24 |
| 28/08/2024 | 1184436/24-0 | 10452- GENÉRICO- Notificação da Alteração de Texto de Bula RDC 60/12   | N/A        | N/A          | N/A                                                                                 | N/A        | IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO<br><br>DIZERES LEGAIS VP<br>3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?<br>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? | VP/VPS | 100 MG COM REV CT STR AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR AL X 24 |

|            |              |                                                                          |            |              |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                          |            |              |                                                                                                |            | 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>VPS<br>4. CONTRAINDICAÇÕES<br>10. SUPERDOSE                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                |
| 20/12/2024 | 1743760/24-8 | 10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 29/11/2024 | 1637335/24-9 | 11112 - RDC 73/2016 - GENÉRICO - Mudança de condição de armazenamento adicional do medicamento | -          | VP<br>5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>VPS<br>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO                                                                                                                                                                                                                         | VP/VPS | 100 MG COM REV CT STR AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR AL X 24 |
| 26/01/2026 | 0080907/26-1 | 10452- GENÉRICO- Notificação da Alteração de Texto de Bula RDC 60/12     | N/A        | N/A          | N/A                                                                                            | N/A        | VP<br>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br>5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?<br>6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>VPS<br>1) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO<br>4. CONTRAINDICAÇÕES<br>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES<br>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO.<br>8. POSOLOGIA E MODO DE USAR | VP/VPS | 100 MG COM REV CT STR AL X 12<br>100 MG COM REV CT STR AL X 24 |
| -          | -            | 10452- GENÉRICO-                                                         | 04/09/2026 | 0923537/26-1 | 70798 - AFE - ALTERAÇÃO -                                                                      | 22/09/2026 | DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VP/VPS | 100 MG COM REV CT STR AL X 12                                  |

|  |  |                                                              |  |  |                                                                       |  |  |  |                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|  |  | Notificação da<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>RDC 60/12 |  |  | MEDICAMENTOS<br>E/OU INSUMOS<br>FARMACÊUTICOS<br>- ENDEREÇO<br>MATRIZ |  |  |  | 100 MG COM REV CT STR<br>AL X 24 |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|