

VIDAZA[®]

azacitidina

UNITED MEDICAL LTDA.

Pó Liofilizado para Suspensão Injetável

100 mg / frasco

I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

VIDAZA[®]

azacitidina

APRESENTAÇÃO

VIDAZA[®] pó liofilizado para suspensão injetável, está disponível em frasco-ampola com 100 mg de azacitidina.

USO SUBCUTÂNEO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada frasco-ampola contém 100 mg de azacitidina.

Excipiente: manitol.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

VIDAZA[®] é indicado para o tratamento de pacientes com Síndrome Mielodisplásica (alteração das células sanguíneas) dos subtipos anemia refratária (redução de células que transportam oxigênio e gás carbônico) com excesso de blastos (células sanguíneas imaturas que não exercem suas funções), ou AREB, de acordo com a classificação FAB (classificação franco-americano-britânica, que considera que na mielodisplasia há alterações no formato e na função das células), a leucemia mieloide aguda (alteração sanguínea com excesso de células de defesa que não funcionam adequadamente) com 20 – 30% de blastos na medula óssea com displasia multilinhagem de acordo com a classificação OMS (classificação da Organização Mundial da Saúde que considera alterações no funcionamento de todas as células sanguíneas) e leucemia mielomonocítica crônica (classificação FAB modificada, classificação franco-americano-britânica, que considera que na mielodisplasia há casos em que a alteração está na células de defesa).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

VIDAZA[®] é conhecido como um agente que provoca a hipometilação das células doentes da medula óssea, ajudando a medula óssea do paciente melhorar sua função. Os efeitos citotóxicos da azacitidina causam a morte de células que se dividem rapidamente, incluindo células cancerosas que não respondam aos mecanismos de controle de crescimento normal.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

VIDAZA[®] é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a azacitidina ou manitol.

VIDAZA[®] é também contraindicado em pacientes com tumores hepáticos malignos avançados.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

VIDAZA[®] pode causar danos fetais quando administrado a uma mulher grávida.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente

seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Não houve nenhum estudo adequado e bem controlado em mulheres grávidas utilizando **VIDAZA**[®]. Se esta droga for utilizada durante a gravidez, ou se a paciente ficar grávida enquanto recebe esta droga a paciente deve ser avisada sobre o perigo potencial ao feto. Mulheres com potencial de terem crianças devem ser aconselhadas a evitar a gravidez enquanto receberem o tratamento com **VIDAZA**[®]. Use um método contraceptivo eficaz durante e até 3 meses após o tratamento.

Uso geriátrico

Nenhuma diferença na eficácia foi observada entre estes pacientes e pacientes mais jovens.

Uso no Sexo Masculino

Não existem dados sobre o efeito da azacitidina na fertilidade. Em animais, os efeitos adversos da azacitidina na fertilidade masculina têm sido documentados. Homens devem ser avisados a não fecundarem mulheres enquanto recebem tratamento com **VIDAZA**[®] e pelo menos, após 3 meses após receberem a última dose.

Mães em Aleitamento

Não é conhecido se a azacitidina ou seus metabólitos são excretados no leite humano. Devido ao potencial para tumorigenicidade demonstrado para azacitidina em estudos animais e o potencial de reações adversas graves, mulheres tratadas com azacitidina não devem amamentar.

Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois pode ser excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.

Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.

Populações Especiais

Os efeitos do comprometimento renal ou hepático, sexo, idade ou raça na farmacocinética de azacitidina não foram estudados.

Informe ao seu médico se você já teve um problema cardíaco, ataque cardíaco ou qualquer histórico de doença pulmonar.

Este medicamento pode causar danos ao fígado. Por isso, seu uso requer acompanhamento médico estrito e exames laboratoriais periódicos para controle.

A doação de sangue é contraindicada durante o tratamento com azacitidina e até o momento em que o seu médico determine que a doação seja segura após o seu término, devido ao dano que ele pode causar à pessoa que receber o sangue.

Interações Medicamentosas

Nenhum estudo clínico formal de interações medicamentosas com azacitidina não foi conduzido.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Os frascos não reconstituídos devem ser armazenados em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

VIDAZA® é um pó branco ou quase branco livre de impurezas visíveis.

VIDAZA® reconstituído é uma suspensão homogênea, turva e livre de aglomerados.

VIDAZA® reconstituído com água para injeção para administração subcutânea pode ser armazenado por até 1 hora a 25°C ou por até 22 horas entre 2°C e 8°C.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

TODO O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Primeiro Ciclo de Tratamento

A dose inicial recomendada para o primeiro ciclo de tratamento, para todos os pacientes, independentemente dos valores laboratoriais hematológicos basais, é de 75 mg/m² por via subcutânea diariamente, durante sete dias. Os pacientes devem ser pré-medicados para náusea e vômitos.

Ciclos Subsequentes de Tratamento

Os ciclos podem ser repetidos a cada quatro semanas. A dose pode ser aumentada para 100 mg/m² se nenhum efeito benéfico for observado após dois ciclos de tratamento e se nenhuma toxicidade que não seja náusea e vômito ocorrer. É recomendado que os pacientes sejam tratados por um mínimo de 4 a 6 ciclos. Porém, resposta completa ou parcial pode requerer mais que 4 ciclos de tratamento

Preparação de VIDAZA®

VIDAZA® é uma droga citotóxica e, assim como outros compostos potencialmente tóxicos, cautela deve ser tomada durante a manipulação e preparação de suspensões de **VIDAZA®**.

Se **VIDAZA®** reconstituído entrar em contato com a pele lave muito bem com água e sabão imediatamente. Se entrar em contato com membranas mucosas enxágue muito bem com água.

O profissional de saúde saberá como preparar o medicamento.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve seguir a orientação do médico e comparecer ao ambulatório para receber aplicações de **VIDAZA**. Para ter um tratamento eficaz, você não pode pular as doses ou tomar doses para compensar a que perdeu.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações adversas descritas em outras seções da bula:

- anemia neutropenia, trombocitopenia, creatinina sérica elevada, insuficiência renal, acidose tubular renal, hipocalemia, coma hepático.

Reações adversas que ocorrem mais comumente:

- náusea, anemia, trombocitopenia, vômitos, pirexia, leucopenia, diarreia, fadiga, eritema no local de injeção, constipação, neutropenia, equimose.

Reações adversas que mais frequentemente (>2%) resultam em intervenção clínica:

Descontinuação:

- leucopenia, trombocitopenia, neutropenia.

Suspensão da Administração:

- leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, pirexia, pneumonia, neutropenia febril.

Redução de Dose:

- leucopenia, neutropenia, trombocitopenia.

EXPERIÊNCIA PÓS-COMERCIALIZAÇÃO:

Os seguintes eventos foram relatados no cenário pós-comercialização:

Infecções e infestações:

- fasciíte necrosante (infecção que destrói o tecido abaixo da pele)

Transtornos do metabolismo e nutrição:

- síndrome de lise tumoral (destruição maciça de células tumorais com liberação de seu conteúdo no espaço extracelular)

Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino:

- doença pulmonar intersticial (DPI)

Pele e distúrbios do tecido subcutâneo:

- dermatose neutrofílica aguda febril, pioderma gangrenoso (dermatose rara envolvendo glóbulos brancos), vasculite cutânea (inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, que podem ficar mais grossas ou finas).

Distúrbios gerais e condições no local da administração:

- necrose no local da injeção

Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incluindo cistos e pólipos):

- Síndrome de diferenciação

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA

MEDICAMENTO?

Um caso de superdose com **VIDAZA**[®] foi relatado durante estudos clínicos. Um paciente apresentou diarreia, náusea e vômitos após receber uma dose IV única de aproximadamente 290 mg/m², quase 4 vezes a dose inicial recomendada. No evento de superdose o paciente deve ser monitorado com contagens sanguíneas apropriadas e deve receber tratamento de suporte, conforme necessário. Não existe nenhum antídoto específico para superdose com **VIDAZA**[®].

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.



III - DIZERES LEGAIS

Registro: 1.2576.0020.0010

Importado e Registrado por:

United Medical Ltda.
São Paulo, SP, Brasil.
CNPJ nº 68.949.239/0001-46

Produzido por:

Baxter Oncology GmbH
Halle/Westfalen, Alemanha

SAC 0800-7705180

sac.brasil@knighttx.com

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 10/12/2025.



VIDAZA[®] é marca registrada de Celgene Co.

Knight[®] é uma marca registrada de Knight Therapeutics Inc.

Histórico de Alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/12/2025	-	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	VP Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, Como E Por Quanto Tempo Posso Guardar Este Medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? III – Dizeres legais VPS Composição 5. Advertências e Precauções 7. Cuidados de armazenamento do medicamento 8. Posologia e modo de usar 9. Reações adversas III- Dizeres legais	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
20/12/2024	1740318/24-2	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	19/07/2024	0989969/24-0	10726 - Informações de Farmacovigilância	19/07/2024	VPS 5. Advertências e Precauções 9. Reações Adversas VP 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	VPS/VP	100 mg/frasco Pó Lio Inj
29/07/2024	1034206/24-9	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	10/05/2024	0625660/24-2	10726 - Informações de Farmacovigilância	10/05/2024	VPS 5. Advertências e Precauções VPS/VP Dizeres legais	VPS/VP	100 mg/frasco Pó Lio Inj
19/12/2023	1445386/23-2	10451 -	19/12/2023	1445386/23-2	Notificação de	19/12/2023	Dizeres Legais	VP/VPS	100 mg/frasco

		MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12			Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12				Pó Lio Inj
26/10/2023	1174703/23-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	26/10/2023	1174703237	Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	26/10/2023	VP Quais os males que este medicamento pode causar? VPS 9. Reações adversas	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
01/04/2022	1479526/22-3	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	01/04/2022	1479526/22-3	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	01/04/2022	VP 3. O que devo saber antes de usar este medicamento? VPS 5. Advertências e Precauções 9. Reações adversas Dizeres Legais (RT)	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
27/11/2021	4684203212	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	27/11/2021	4684203212	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	27/11/2021	VP 3. O que devo saber antes de usar este medicamento? VPS 5. Advertências e Precauções	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
16/03/2021	102405821-6	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	16/03/2021	102405821-6	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	16/03/2021	VPS 9. Reações adversas	VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
16/11/2017	221101917-4	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	16/11/2017	221101917-4	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	16/11/2017	VP Quais os males que este medicamento pode causar? VPS 9. Reações adversas	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
20/06/2016	1953030/16-7	Notificação de alteração de texto de	20/06/2016	1953030/16-7	Notificação de alteração de texto	20/06/2016	VP 8. Quais os males que este	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj

		bula – RDC 60/12			de bula – RDC 60/12		medicamento pode causar? Dizeres Legais VPS 9. Reações adversas Dizeres legais (RT)		
15/01/2016	1166206/16-9	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	21/10/2011	926996/11-7	Alteração de local de fabricação do medicamento	12/12/2012	VP 5. Onde, Como E Por Quanto Tempo Posso Guardar Este Medicamento? VPS 8. Posologia e Modo de usar Dizeres Legais	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
16/03/2015	0231348/15-1	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	16/03/2015	0231348/15-1	Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	16/03/2015	VPS 2. Resultados de eficácia	VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
11/09/2014	0752051/14-4	Inclusão Inicial de texto de bula – RDC 60/12	11/09/2014	0752051/14-4	Inclusão Inicial de texto de bula – RDC 60/12	11/09/2014	-	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj
10/12/2025	-	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	VP Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? III – Dizeres legais VPS Composição	VP/VPS	100 mg/frasco Pó Lio Inj

							5. Advertências e precauções 7. Cuidados de armazenamento do medicamento 8. posologia e modo de usar 9 Reações adversas III – Dizeres legais		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--