

# Wellbutrin

GlaxoSmithKline Brasil Ltda.

Comprimidos revestidos de liberação

prolongada

150mg e 300mg

- Profissional de Saúde -



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

### I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**Wellbutrin® XL**  
cloridrato de bupropiona

#### APRESENTAÇÕES

**Wellbutrin® XL** comprimidos revestidos de liberação prolongada contém 150 mg ou 300 mg de cloridrato de bupropiona, apresentados em embalagens contendo 7 ou 30 comprimidos.

#### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de **Wellbutrin® XL** 150 mg contém:  
cloridrato de bupropiona.....150 mg  
(equivalente a 130,19 mg de bupropiona)

Excipientes\* q.s.p. ....1 comprimido

\*álcool polivinílico, beenato de glicerila, etilcelulose, povidona, macrogol, eudragit L-30 D-55, dióxido de silício, citrato de trietila, álcool etílico\*\*, álcool isopropílico\*\*, tinta de impressão preta (verniz shellac, álcool isopropílico, óxido de ferro preto, álcool n-butilico, propileno glicol e hidróxido de amônia) e água purificada\*\*.

\*\*removido durante o processo

Cada comprimido de **Wellbutrin® XL** 300 mg contém:  
cloridrato de bupropiona.....300 mg  
(equivalente a 260,39 mg de bupropiona)

Excipientes\* q.s.p. ....1 comprimido

\*álcool polivinílico, beenato de glicerila, etilcelulose, povidona, macrogol, eudragit L-30 D-55, dióxido de silício, citrato de trietila, álcool etílico\*\*, álcool isopropílico\*\*, tinta de impressão preta (verniz shellac, álcool isopropílico, óxido de ferro preto, álcool n-butilico, propileno glicol e hidróxido de amônia) e água purificada\*\*.

\*\*removido durante o processo

#### USO ORAL

#### USO ADULTO

### II) INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

#### 1. INDICAÇÕES

**Wellbutrin® XL** é indicado no tratamento de episódios depressivos maiores ou na prevenção de recaídas e recorrências de episódios depressivos após resposta inicial satisfatória.

#### 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

A eficácia e a tolerabilidade da **Wellbutrin® XL** foram examinadas em sete estudos duplo-cegos.

Em um dos dois estudos idênticos de dose flexível (WXL101497, n = 576), **Wellbutrin® XL** (150-300 mg/dia) foi significativamente superior ao placebo no parâmetro primário, com mudanças da pontuação total da linha de base MADRS (Escala de Montgomery-Asberg para depressão) (p = 0,006). Efeitos estatisticamente significativos também foram encontrados em uma série de objetivos secundários, incluindo resposta e remissão na MADRS, gravidade e melhora global no CGI, *Sheehan Disability Scale*, MEI e Q-LES-Q. A eficácia de **Wellbutrin® XL** neste estudo foi muito semelhante ao comparador ativo, venlafaxina. No segundo estudo (AK130939, n = 591), **Wellbutrin® XL** não apresentou diferenças significativas do placebo para o parâmetro primário, para mudanças da pontuação total da linha de base MADRS (p = 0,146), embora efeitos estatisticamente significativos tenham sido observados para venlafaxina (p <0,001 versus placebo). [1, 2]

**Wellbutrin® XL** mostrou ser benéfico em pacientes idosos em um desenho de estudo placebo-controlado desenhado com dose flexível (AK130940, n = 420), conduzido durante o intervalo de dose 150-300 mg/dia. Efeitos estatisticamente significativos foram mostrados para respostas a MADRS, melhora global CGI, *Sheehan Disability Scale*, MEI e Q-LES-Q, embora apenas uma tendência tenha sido observada no parâmetro primário, para mudanças da pontuação total da linha de base MADRS (p = 0,085). [3]

Dois estudos controlados envolvendo placebo e escitalopram (AK130926, n=424 e AK130927, n=425) foram conduzidos em adultos no intervalo de dose de 300 mg/dia- 450 mg/dia. Após oito semanas de tratamento, os pacientes fazendo uso de **Wellbutrin® XL** apresentaram, em cada estudo, disfunção no orgasmo significativamente inferior que os pacientes tratados com escitalopram (p = 0,014 e p <0,001 versus escitalopram), embora a significância estatística para a **Wellbutrin® XL** versus placebo não tenha sido mostrada em nenhum estudo sobre o parâmetro coprincipal e sobre a mudança na pontuação total da linha de base HAMD (p = 0,179 e p = 0,184 versus placebo, respectivamente). **Wellbutrin® XL** separou do placebo em uma série de objetivos secundários: alteração a partir da randomização na escala



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

Hospital Anxiety and Depression, taxas de remissão aferidas pela HAMD-17 no estudo 1; e variação média no CGI-S a partir da randomização e taxas de resposta no CGI-I no estudo 2. [4]

Em um estudo de oito semanas com pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior (TDM) e redução dos níveis de prazer, interesse e energia (AK130931, n = 274), o grupo fazendo uso de **Wellbutrin® XL** apresentou melhora estatisticamente significativa sobre o placebo para o parâmetro primário, a mudança da linha de base na escala de autorresposta IDS escala nominal ( $p = 0,018$ ). Também foi mostrada significância estatística numa série de objetivos secundários, incluindo a avaliação clínica da IDS, CGI gravidade da doença e melhora. [5]

Em um estudo ativo controlado de 12 semanas de **Wellbutrin® XL** (300-450 mg/dia) *versus* venlafaxina em pacientes adultos com TDM (WXL100368, n = 348), **Wellbutrin® XL** mostrou impacto significativamente menos negativo sobre o funcionamento sexual (o parâmetro primário;  $p = 0,005$ ) e uma eficácia global semelhante à da venlafaxina. **Wellbutrin® XL** e venlafaxina são comparáveis conforme a avaliação da pontuação total HAMD-17, no item de humor depressivo, na sub-escala de melancolia do Bech, taxas de resposta HAMD-17 e mudança a partir da randomização no CGI-S. A significância estatística a favor de **Wellbutrin® XL** *versus* venlafaxina mostrou-se para a proporção de pacientes que alcançaram a remissão na HAMD e resposta na CGI-I. [6]

[1] GlaxoSmithKline internal document HM/2005/00250/00 (Study WXL101497)

[2] GlaxoSmithKline internal document HM/2005/00248/00 (Study AK130939)

[3] GlaxoSmithKline internal document HM2005/00249/00 (Study AK130940)

[4] Clayton AH, Croft H, Horrigan JP, Wightman DS, Krishen A, Richard NE, Modell JG. Bupropion XL compared with escitalopram: effects on sexual functioning and antidepressant efficacy in two randomized, double-blind, placebo-controlled studies. *J Clin Psychiatry* 2006; 67:736-746

[5] Jefferson JW, Rush AJ, Nelson JC, VanMeter SA, Krishen A, Hampton KD, Wightman DS, Modell JG. Extended-release bupropion for major depressive disorder with symptoms of reduced energy, pleasure, and interest: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Clin Psychiatry*, 2006; 67:865-873

[6] Thase ME, Clayton AH, Haight BR, Krishen A, Modell JG. A double-blind comparison between bupropion XL and venlafaxine XR: sexual functioning, antidepressant efficacy and tolerability. *Journal of Neuropsychopharm*, 2006;26(5):482-8

### 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

#### Propriedades Farmacodinâmicas

##### Mecanismo de Ação

A bupropiona é um inibidor seletivo da recaptação neuronal de catecolaminas (norepinefrina e dopamina), com efeito mínimo na recaptação de indolaminas (serotonina) e que não inibe a monoaminoxidase (MAO). O mecanismo exato de ação da bupropiona, assim como o de muitos antidepressivos, é desconhecido. Presume-se que o mecanismo de ação da bupropiona seja mediado por mecanismos noradrenérgicos e/ou dopaminérgicos.

Em estudo com voluntários saudáveis, não foi observado efeito clinicamente significativo sobre o intervalo QTcF, após o intervalo de 14 dias de administração (para atingir a dosagem de equilíbrio), ao se comparar os comprimidos de liberação prolongada (450 mg/dia) com o placebo.

#### Propriedades Farmacocinéticas

##### Absorção

Após administração oral da bupropiona a voluntários saudáveis, os picos de concentração plasmática são alcançados após aproximadamente cinco horas. A bupropiona e seus metabólitos apresentam cinética linear após administração crônica de 150 a 300 mg, diariamente. Não existem alterações significativas na absorção da bupropiona quando administrada com alimentos.

##### Distribuição

A bupropiona é largamente distribuída, com volume aparente de distribuição de aproximadamente 2.000 litros. A bupropiona e a hidroxibupropiona se ligam moderadamente às proteínas plasmáticas (84% e 77%, respectivamente). A extensão da ligação do metabólito treidrobupropiona às proteínas é aproximadamente metade da observada com a bupropiona.

##### Metabolismo

A bupropiona é extensivamente metabolizada em humanos. Três metabólitos farmacologicamente ativos da bupropiona foram identificados no plasma: a hidroxibupropiona e os isômeros aminoálcool, treidrobupropiona e eritroidrobupropiona. Estes metabólitos podem ter importância clínica quando suas concentrações plasmáticas são altas ou maiores que as da bupropiona.

A eritroidrobupropiona não pôde ser medida no plasma após uma dose única de **Wellbutrin® XL**. Os metabólitos ativos são posteriormente metabolizados em metabólitos inativos e excretados na urina.

Estudos *in vitro* demonstram que a bupropiona é metabolizada em seus principais metabólitos ativos primariamente pelo CYP2B6, e que o sistema enzimático citocromo P450 não está envolvido na formação da treidrobupropiona (ver Interações Medicamentosas).

A bupropiona e a hidroxibupropiona são inibidores competitivos, relativamente fracos, da isoenzima CYP2D6, com valores de  $K_i$  de 21 e 13,3  $\mu\text{M}$ , respectivamente. Em voluntários que metabolizam largamente pela isoenzima CYP2D6, a administração concomitante de



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

bupropiona e desipramina resultou em aumento da Concentração máxima ( $C_{\max}$ ) e da área sob a curva (ASC) da desipramina de duas e cinco vezes, respectivamente. Este efeito tende a permanecer por pelo menos sete dias após a última dose de bupropiona. Uma vez que a bupropiona não é metabolizada pela via CYP2D6, a desipramina não afeta a farmacocinética da bupropiona. Recomenda-se cuidado quando Wellbutrin® XL é administrado com substratos da via CYP2D6 (ver Interações Medicamentosas).

Em animais, a bupropiona demonstrou induzir seu próprio metabolismo após administração subcrônica. Em humanos, não existem evidências de indução enzimática da bupropiona e hidroxibupropiona em voluntários ou pacientes recebendo as doses recomendadas de bupropiona por 10 a 45 dias.

Concentrações plasmáticas máximas de hidroxibupropiona são, aproximadamente, 10 vezes o nível de pico do fármaco no estado estacionário. Os tempos para as concentrações máximas para o eritroidrobupropiona e metabólitos treoidrobupropiona são semelhantes aos metabólitos da hidroxibupropiona.

Em humanos, as concentrações plasmáticas do pico de hidroxibupropiona ocorrem cerca de 7 horas após a administração de bupropiona de liberação prolongada.

Em um estudo com voluntários saudáveis, ritonavir, numa dose de 100 mg duas vezes ao dia, reduziu a ASC e a  $C_{\max}$  de bupropiona em 22% e 21%, respectivamente. A ASC e a  $C_{\max}$  dos metabólitos da bupropiona foram reduzidas a 0 a 44%. Em um segundo estudo com voluntários saudáveis, ritonavir, numa dose de 600 mg duas vezes por dia, diminuiu a ASC e a  $C_{\max}$  da bupropiona em 66% e 62%, respectivamente. A ASC e a  $C_{\max}$  de metabólitos da bupropiona foram reduzidas a 42 e 78%, respectivamente.

Em outro estudo com voluntários saudáveis, lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg, duas vezes ao dia, diminuíram a ASC e a  $C_{\max}$  da bupropiona em 57%. A ASC e a  $C_{\max}$  da hidroxibupropiona foram reduzidas em 50% e 31%, respectivamente.

### Eliminação

Após administração oral de 200 mg de bupropiona marcada com C14 em humanos, 87% e 10% da dose radiomarcada foram eliminados na urina e nas fezes, respectivamente. A fração da dose oral de bupropiona excretada inalterada foi de apenas 0,5%, um dado que está de acordo com o extenso metabolismo da bupropiona. Menos de 10% da dose radiomarcada foi encontrada na urina, como metabólito ativo.

Após administração oral, o *clearance* médio aparente da bupropiona é, aproximadamente, 200 litros/hora, e a meia-vida de eliminação média da bupropiona é de cerca de 20 horas.

A meia-vida de eliminação da hidroxibupropiona é de, aproximadamente, 20 horas, e a área sob a curva da concentração plasmática da droga versus tempo (ASC), no estado de equilíbrio, é cerca de 17 vezes a da bupropiona. As meias-vidas de eliminação da treoidrobupropiona e da eritroidrobupropiona são mais longas (37 e 33 horas, respectivamente), e os valores da área sob a curva, no estado de equilíbrio, são 8 e 1,6 vezes maiores do que os valores da bupropiona, respectivamente. O estado de equilíbrio para a bupropiona e seus metabólitos é alcançado dentro de oito dias.

O revestimento insolúvel do comprimido de liberação prolongada pode permanecer intacto durante o trânsito gastrointestinal e ser eliminado nas fezes.

### Pacientes com insuficiência renal

A eliminação da bupropiona e dos seus principais metabólitos pode ser reduzida em pacientes com insuficiência renal (ver Advertências e Precauções). Em indivíduos com danos renais moderados a graves ou insuficiência renal, a exposição à bupropiona e/ou seus metabólitos foi aumentada.

### Pacientes com insuficiência hepática

A farmacocinética da bupropiona e dos seus metabólitos ativos não foi estatisticamente diferente em pacientes com cirrose leve a moderada, quando comparada a voluntários saudáveis. Entretanto, uma variação maior foi observada entre pacientes, individualmente. Em pacientes com cirrose hepática grave, a  $C_{\max}$  e a área sob a curva (ASC) da bupropiona foram significativamente aumentadas (diferença média de, aproximadamente, 70% e três vezes, respectivamente) e mais variáveis, quando comparadas aos valores de voluntários saudáveis. O tempo de meia-vida também foi aumentado em, aproximadamente, 40%. Para os metabólitos, a  $C_{\max}$  média foi menor (em aproximadamente 30 a 70%), a área sob a curva (ASC) média tendeu a ser maior (em aproximadamente 30 a 50%), o  $T_{\max}$  médio foi retardado (em aproximadamente 20 horas) e as meias-vidas foram aumentadas (aproximadamente duas a quatro vezes), quando comparados aos valores encontrados em voluntários saudáveis (ver Advertências e Precauções).

### Pacientes idosos

Estudos farmacocinéticos em idosos têm demonstrado resultados variáveis. Um estudo com dose única revelou parâmetros similares entre idosos e adultos jovens. Outro estudo farmacocinético, de dose única e múltipla, sugeriu maior acúmulo da bupropiona e dos seus metabólitos nestes pacientes. A experiência clínica não identificou diferenças na tolerabilidade à bupropiona entre idosos e pacientes mais jovens. Entretanto, uma maior sensibilidade a este agente por acúmulo ou por outras patologias sistêmicas associadas não pode ser descartada neste grupo.



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

### 4. CONTRAINDICAÇÕES

**Wellbutrin® XL** é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida à bupropiona ou a qualquer componente da fórmula.

A bupropiona é contraindicada em pacientes com diagnóstico de epilepsia ou outros distúrbios convulsivos e diagnóstico atual ou prévio de bulimia ou anorexia nervosa, uma vez que foi observada alta incidência de convulsões nestes pacientes quando a bupropiona foi administrada.

**Wellbutrin® XL** não deve ser administrado em pacientes tratados com qualquer outro medicamento que contenha bupropiona, uma vez que a incidência das convulsões é dose-dependente.

É contraindicada a administração concomitante de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) ou o uso associado de bupropiona dentro de até 14 dias após a interrupção do tratamento com IMAOs.

**Wellbutrin® XL** é contraindicado em pacientes em processo de descontinuação abrupta do uso de sedativos ou álcool.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.**

**Categoria D de risco na gravidez.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

### 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

**Wellbutrin® XL** não deve ser utilizado concomitantemente com outros medicamentos que contenham bupropiona.

#### Convulsões

A dose recomendada de **Wellbutrin® XL** não deve ser excedida, uma vez que a bupropiona está associada a risco de convulsão dose-dependente. A incidência de convulsões com **Wellbutrin® XL** em doses maiores que 300 mg/dia é de aproximadamente 0,1%.

O risco de convulsão decorrente do uso de bupropiona parece estar fortemente associado a fatores de risco predisponentes. Portanto, **Wellbutrin® XL** deve ser administrado com extrema precaução em pacientes com uma ou mais condições predisponentes que possam baixar o limiar de convulsão. Estas incluem:

- histórico de traumatismo craniano;
- tumor no sistema nervoso central;
- histórico de convulsões;
- administração concomitante de medicamentos que baixem o limiar da convulsão.

Além disso, os cuidados devem ser redobrados em circunstâncias clínicas associadas ao aumento do risco de convulsões. Estas incluem abuso de álcool ou sedativos (ver Contraindicações), diabetes tratado com hipoglicemiantes ou insulina e uso de estimulantes ou produtos anorexígenos.

**Wellbutrin® XL** deve ser descontinuado e não deve ser reiniciado em pacientes que apresentem convulsão durante o tratamento.

#### Reações de hipersensibilidade

**Wellbutrin® XL** deve ser suspenso imediatamente em pacientes que apresentem reações de hipersensibilidade durante o tratamento (ver Reações Adversas). Os médicos devem estar cientes de que os sintomas podem permanecer, mesmo após a suspensão do medicamento. Portanto, um monitoramento clínico adequado deve ser providenciado.

#### ECG tipo Brugada

A bupropiona pode desmascarar a síndrome de Brugada, uma doença hereditária rara do canal de sódio cardíaco com alterações características no ECG (elevação do segmento ST e anormalidades da onda T nas derivações precordiais direitas), que pode levar à parada cardíaca e/ou morte súbita. Recomenda-se cautela em pacientes com síndrome de Brugada ou fatores de risco, como histórico familiar de parada cardíaca ou morte súbita.

#### Insuficiência hepática

No fígado, a bupropiona é extensamente metabolizada em metabólitos ativos, que serão posteriormente metabolizados. Não existe diferença estatisticamente significativa na farmacocinética da bupropiona entre pacientes com cirrose hepática moderada e voluntários saudáveis. Entretanto, os níveis plasmáticos de bupropiona apresentaram maior variabilidade entre pacientes individuais. Portanto, **Wellbutrin® XL** deve ser usado com precaução em pacientes com insuficiência hepática, e a redução na frequência das doses deve ser considerada em pacientes com cirrose hepática leve a moderada (ver Posologia e Modo de Usar e Propriedades Farmacocinéticas, em Características Farmacológicas).

**Wellbutrin® XL** deve ser utilizado com extremo cuidado em pacientes com cirrose hepática grave. Nestes pacientes, a frequência das doses deverá ser reduzida, uma vez que níveis sanguíneos de bupropiona podem mostrar-se substancialmente aumentados, podendo ocorrer acúmulo da substância numa extensão maior do que a usual (ver Posologia e Modo de Usar e Propriedades Farmacocinéticas, em Características Farmacológicas).

Todos os pacientes com insuficiência hepática devem ser monitorados, em virtude da possibilidade de efeitos adversos, que podem indicar altos níveis da droga ou de seus metabólitos, como insônia, boca seca e convulsões.



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

### **Insuficiência renal**

Após a passagem pelo fígado, a bupropiona é metabolizada, e os metabólitos ativos serão posteriormente metabolizados e excretados pelos rins. Portanto, os pacientes com insuficiência renal devem iniciar o tratamento com doses e/ou frequência reduzidas, uma vez que tanto a bupropiona quanto seus metabólitos tendem a se acumular numa extensão maior do que a usual nestes indivíduos. O paciente deve ser cuidadosamente monitorado em relação às possíveis reações adversas (por exemplo: insônia, boca seca e convulsões), que poderiam indicar altos níveis da droga ou de seus metabólitos.

### **Idosos**

A experiência clínica com a bupropiona não demonstrou qualquer diferença na tolerabilidade entre pacientes idosos e outros pacientes. Entretanto, a maior sensibilidade de alguns pacientes idosos à bupropiona não pode ser ignorada. Por isso, podem necessitar de redução da dosagem e/ou da frequência das doses (ver Propriedades Farmacocinéticas, em Características Farmacológicas).

### **Crianças e adolescentes menores de 18 anos**

O tratamento com antidepressivos está associado ao aumento do risco de pensamentos e comportamentos suicidas em crianças e adolescentes com desordem depressiva principal e outras desordens psiquiátricas.

### **Agravamento clínico e risco de suicídio associados a transtornos psiquiátricos**

Os pacientes com depressão podem experimentar agravamento dos sintomas depressivos e/ou o aparecimento de ideação e comportamentos suicidas (suicidalidade), quer estejam ou não tomando medicações antidepressivas. Esse risco persiste até que ocorra remissão significativa. Como há a possibilidade de que não ocorra melhora durante as primeiras semanas ou mais de tratamento, os pacientes devem ser rigorosamente monitorados para detecção de agravamento clínico (incluindo desenvolvimento de novos sintomas) e suicidalidade, principalmente no início de um ciclo de tratamento ou nas ocasiões de mudança da dose, seja aumento ou diminuição. Segundo a experiência clínica geral com todos os tratamentos antidepressivos, o risco de suicídio pode aumentar nos estágios iniciais de recuperação.

Pacientes com histórico de comportamento e pensamentos suicidas, adultos jovens e aqueles pacientes que exibem grau significativo de ideação suicida antes do início do tratamento correm maior risco de pensamentos suicidas ou tentativas de suicídio, e devem ser cuidadosamente monitorados durante o tratamento.

Além disso, uma meta-análise de ensaios clínicos de medicamentos antidepressivos controlados por placebo em adultos com transtorno depressivo maior e outros transtornos psiquiátricos mostraram aumento do risco de pensamentos e comportamentos suicidas associados com uso de antidepressivos em comparação ao placebo nos pacientes com menos de 25 anos.

Os pacientes (e as pessoas que cuidam deles) devem ser alertados sobre a necessidade de estarem atentos para qualquer agravamento da doença (incluindo desenvolvimento de novos sintomas) e/ou o aparecimento de ideação/comportamento suicidas ou pensamentos sobre ferir a si mesmos e devem buscar assistência médica imediatamente se esses sintomas surgirem.

Deve-se reconhecer que o início de alguns sintomas neuropsiquiátricos podem estar relacionados tanto com a doença subjacente ou com a terapia medicamentosa (ver Sintomas neuropsiquiátricos incluindo mania e o transtorno bipolar, abaixo e Reações Adversas).

Pode ser necessário considerar a alteração do regime terapêutico, assim como a possível descontinuação da medicação, em pacientes que apresentaram agravamento clínico (incluindo desenvolvimento de novos sintomas) e/ou aparecimento de ideias e comportamentos suicidas, especialmente se estes sintomas forem graves, abruptos no início, ou se não faziam parte dos sintomas apresentados inicialmente pelo paciente.

### **Sintomas neuropsiquiátricos, incluindo mania e transtorno bipolar.**

Sintomas neuropsiquiátricos foram relatados (ver Reações Adversas). Em particular, sintomas psicóticos e maníacos têm sido observados, principalmente em pacientes com histórico de doenças psiquiátricas. Além disso, um episódio depressivo maior pode ser a manifestação inicial do transtorno bipolar. Em geral, considera-se (embora isso não tenha sido estabelecido em estudos controlados) que tratar esse episódio com um antidepressivo como monoterapia pode aumentar a probabilidade de precipitação de um episódio misto/maníaco em pacientes com risco de apresentar transtorno bipolar. Dados clínicos limitados sobre o uso de bupropiona em combinação com estabilizadores do humor em pacientes com histórico de transtorno bipolar sugerem baixo índice de mudança para mania. Antes de iniciar o tratamento com um antidepressivo, os pacientes devem ser adequadamente avaliados para determinar se correm risco de apresentar um transtorno bipolar. Essa avaliação deve englobar histórico psiquiátrico detalhado, incluindo histórico familiar de suicídio, transtorno bipolar e depressão.

### **Doença cardiovascular**

É limitada a experiência clínica com o uso de bupropiona para tratar depressão em pacientes com doença cardiovascular. Deve-se ter cautela se Wellbutrin® XL for usado nestes pacientes. No entanto, bupropiona demonstrou ser bem tolerada em um estudo para interrupção do tabagismo em pacientes com doença cardiovascular isquêmica.

### **Pressão arterial**

Em um estudo com indivíduos não-deprimidos (incluindo fumantes e não-fumantes) com hipertensão de Estágio I não-tratada, bupropiona não produziu efeito estatisticamente significativo sobre a pressão arterial. No entanto, relatos espontâneos de aumento da pressão arterial



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

(algumas vezes, severo) foram recebidos (ver Reações Adversas), e o uso concomitante de bupropiona e um Sistema Transdérmico de Nicotina pode resultar em elevações da pressão arterial (ver Interações Medicamentosas).

### Vias de administração inadequadas

A bupropiona é destinada apenas para uso oral. A inalação de comprimidos triturados ou a injeção de bupropiona dissolvida foram relatadas, podendo levar a uma rápida liberação e absorção, além de potencial overdose. Convulsões e/ou casos de morte foram relatados quando a bupropiona foi administrada por via intranasal ou por injeção parenteral.

### Síndrome da serotonina

A síndrome da serotonina foi relatada quando a bupropiona é coadministrada com medicamentos conhecidos por estarem associados à síndrome da serotonina, incluindo inibidores seletivos da recaptção da serotonina (ISRSs) ou inibidores da recaptção da serotonina norepinefrina (IRSNs). Se o tratamento concomitante com outros agentes serotoninérgicos for clinicamente justificado, recomenda-se a observação cuidadosa do paciente, particularmente durante o início do tratamento e aumentos de dose (ver Interações Medicamentosas).

A síndrome da serotonina também foi relatada em casos de superdosagem com bupropiona (ver Superdose).

### Efeitos na capacidade de dirigir e operar máquinas

Como ocorre com outras substâncias que atuam no sistema nervoso central, a bupropiona pode afetar a capacidade de desenvolver tarefas que requeiram raciocínio, habilidade cognitivas e motoras. Desta forma, os pacientes devem ter cuidado ao dirigir ou operar máquinas até que estejam certos de que Wellbutrin® XL não afetou adversamente seu desempenho.

**Oriente seu paciente a não dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.**

**O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.**

### Fertilidade

Não existem dados sobre o efeito da bupropiona na fertilidade humana. Um estudo de reprodução em ratas não apresentou evidências de alteração da fertilidade em doses de até 7 vezes a dose humana máxima recomendada com base em mg/m<sup>2</sup>.

### Gravidez

Alguns estudos epidemiológicos sobre os resultados da gravidez após a exposição materna à bupropiona no primeiro trimestre têm relatado uma associação com o aumento do risco de algumas malformações congênitas cardiovasculares. Estes resultados não são consistentes em todos os estudos. O médico deverá ponderar a opção de tratamentos alternativos em mulheres que estão grávidas ou que estão planejando engravidar, e só devem prescrever bupropiona se os benefícios esperados forem maiores que os riscos potenciais.

A proporção de defeitos cardíacos congênitos observada prospectivamente em gestações com exposição pré-natal à bupropiona no primeiro trimestre no Registro Internacional de Gravidez (*International Pregnancy Registry*) foi 9/675 (1,3%).

Um estudo retrospectivo de banco de dados de atendimento incluiu 7.005 bebês. Segundo esses dados, entre os bebês de mulheres que fizeram uso de bupropiona no primeiro trimestre de gravidez (n=1.213 bebês) a frequência de malformações congênitas foi de 2,3% e a de malformações cardiovasculares de 1,1%. Entre os bebês daquelas que nesse mesmo período de gestação tomaram outros antidepressivos (n=4.743 bebês), as proporções foram as mesmas: 2,3% e 1,1%, respectivamente. Os índices referentes aos bebês cujas mães só usaram bupropiona após o primeiro trimestre de gravidez (n=1.049 bebês) foram de 2,2% e 1%.

Em uma análise retrospectiva de caso-controle, utilizando dados do Estudo Nacional de Prevenção de malformações congênitas (*National Birth Defects Prevention Study*), tinham 12.383 casos de recém-nascido e 5.869 recém-nascidos de controle. Uma associação estatisticamente significativa foi observada entre a ocorrência de um defeito de escoamento do trato cardíaco esquerdo na criança e o autorrelato do uso de bupropiona materna no início da gravidez (n = 10; OR ajustado = 2,6 IC 95% 1,2, 5,7). Nenhuma associação foi observada entre o uso de bupropiona materna e qualquer outro tipo de defeito cardíaco ou todas as categorias de defeitos cardíacos combinados.

Uma recente análise de um caso-controle relatado a partir do *Slone Epidemiology Center Birth Defects* incluiu 7.913 casos de recém-nascidos com defeitos cardíacos e 8.611 controles. Este não encontrou nenhum aumento estatisticamente significativo de defeitos de escoamento do trato cardíaco esquerdo com o uso de bupropiona materna (n = 2; OR ajustado = 0,4, IC 95% 0,1, 1,6). No entanto, uma associação estatisticamente significativa foi observada para os defeitos do septo ventricular (n = 17; ajustado OR = 2,5 IC 95% 1,3, 5,0) após o uso de bupropiona durante o primeiro trimestre.

### Categoria D de risco na gravidez.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

### Lactação

Foi demonstrado que a bupropiona e seus metabólitos são excretados pelo leite materno. Portanto, devido às potenciais reações adversas, recomenda-se que mães que estejam recebendo tratamento com Wellbutrin® XL não amamentem.



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

**Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano. Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.**

Este produto contém bupropiona, que está incluída na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping. **Este medicamento pode causar doping.**

### **Carcinogênese/mutagênese**

Estudos de oncogenicidade em ratos e camundongos confirmaram a ausência de carcinogenicidade nestas espécies.

### **Toxicologia animal e/ou farmacológica**

Alterações hepáticas foram observadas em estudos com animais, mas estes refletem a ação de um indutor de enzima hepática. No homem, em doses clínicas, não há nenhuma evidência de qualquer indução enzimática, o que sugere que os achados hepáticos em animais de laboratório têm apenas importância limitada na evolução e avaliação do risco da bupropiona.

### **Teratogenicidade**

Não há evidências de teratogenicidade em ratos ou coelhos em doses de até 11 e 7 vezes a dose humana máxima recomendada, com base em mg/m<sup>2</sup>, respectivamente (a exposição em altas doses em um dos estudos com ratos, a 300 mg/kg/dia, foi 1,7 vezes a dose humana, com base nos valores de ASC no estado de equilíbrio). Em coelhos, um leve aumento em alterações no esqueleto (aumento da incidência de variação anômica comum de uma costela torácica acessória e ossificação tardia de falanges) foi observado em doses aproximadamente iguais à dose máxima humana ou superiores, e o peso fetal diminuiu em doses maternas tóxicas. Em exposições de até 7 vezes a dose humana máxima recomendada com base em mg/m<sup>2</sup>, nenhum evento adverso foi observado nos descendentes de ratos em que a bupropiona foi administrada antes do acasalamento e durante a gravidez e lactação.

**Atenção: Contém o corante óxido de ferro preto.**

## **6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Estudos *in vitro* indicam que a bupropiona é metabolizada em seu principal metabólito ativo, a hidroxibupropiona, principalmente através do citocromo P450 2B6 (CYP2B6) (ver Propriedades Farmacocinéticas, em Características Farmacológicas). Deve-se ter cuidado ao administrar **Wellbutrin® XL** concomitantemente com drogas que afetam a isoenzima CYP2B6, como orfenadrina, ciclofosfamida, isofosfamida, triclopídina e clopidogrel.

Embora a bupropiona não seja metabolizada pela isoenzima CYP2D6, estudos *in vitro* com citocromos P450 humanos têm demonstrado que a bupropiona e a hidroxibupropiona são inibidores da via CYP2D6. Em um estudo de farmacocinética em humanos, a administração de bupropiona aumentou os níveis plasmáticos da desipramina. Este efeito foi mantido por pelo menos sete dias após a última dose de bupropiona. A terapia concomitante com drogas predominantemente metabolizadas por esta isoenzima (como betabloqueadores, antiarrítmicos, ISRSs, TCAs, antipsicóticos) deve ser iniciada pela dose inferior, segundo a faixa de doses da medicação concomitante. Se **Wellbutrin® XL** for adicionado ao tratamento em pacientes que já estejam recebendo drogas metabolizadas pela isoenzima CYP2D6, deve ser considerada a redução da dose da medicação original, particularmente para aquelas medicações concomitantes com estreito índice terapêutico (ver Propriedades Farmacocinéticas, em Características Farmacológicas).

Drogas que requerem ativação metabólica pelo CYP2D6, a fim de serem eficazes (por exemplo, tamoxifeno), podem ter uma eficácia reduzida quando administradas concomitantemente com inibidores da CYP2D6, como a bupropiona

Embora o citalopram (um ISRS) não seja primariamente metabolizado pelo CYP2D6, em um estudo, a bupropiona aumentou a C<sub>máx</sub> e a ASC do citalopram em 30% e 40%, respectivamente.

Uma vez que a bupropiona é extensamente metabolizada, a coadministração com drogas capazes de induzir o metabolismo (como carbamazepina, fenobarbitona, fenitoína, ritonavir e efavirenz) ou inibi-lo pode afetar sua atividade clínica.

Em uma série de estudos com pacientes saudáveis, ritonavir (100 mg, duas vezes ao dia, ou 600 mg, duas vezes ao dia) ou ritonavir 100 mg associado a lopinavir 400 mg, duas vezes ao dia, reduziu a exposição da bupropiona e de seus principais metabólitos de maneira dose-dependente em aproximadamente 20% a 80%. De modo similar, efavirenz 600 mg, uma vez por dia por duas semanas, reduziu a exposição da bupropiona e de seus principais metabólitos de maneira dose-dependente em aproximadamente 55%. Acredita-se que esse efeito do ritonavir, ritonavir associado a lopinavir e do efavirenz ocorra devido à indução do metabolismo da bupropiona. Pacientes que estejam recebendo qualquer uma dessas drogas associadas à bupropiona podem precisar de doses maiores de bupropiona, mas a dose máxima recomendada não deve ser excedida.

Mesmo não havendo estudos clínicos que identifiquem interações farmacocinéticas entre a bupropiona e o álcool, existem raros relatos de eventos adversos neuropsiquiátricos ou redução da tolerância alcoólica em pacientes que fazem uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento. O consumo de álcool durante o tratamento deve ser minimizado ou evitado.

Os dados pós-comercialização mostram uma possível interação farmacodinâmica entre bupropiona e ISRSs e IRSNs resultando em um risco aumentado de síndrome da serotonina (ver Advertências e Precauções).



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

Dados clínicos limitados sugerem uma alta incidência de eventos adversos neuropsiquiátricos em pacientes que receberam bupropiona juntamente com levodopa ou amantadina. A administração concomitante de **Wellbutrin® XL** em pacientes que tomam levodopa ou amantadina deve ser feita com cautela.

O uso concomitante de **Wellbutrin® XL** e Sistemas Transdérmicos de Nicotina (STN) pode resultar na elevação da pressão sanguínea.

Doses orais múltiplas de bupropiona não tiveram efeitos estatisticamente significativos sobre a farmacocinética de dose única de lamotrigina em 12 indivíduos e mostraram apenas um ligeiro aumento na área sob a curva (ASC) de lamotrigina glicuronídeo.

A coadministração de digoxina com bupropiona pode diminuir os níveis de digoxina.

A ASC<sub>0-24h</sub> de digoxina diminuiu 1,6 vezes e o *clearance* renal aumentou 1,8 vezes em um estudo com voluntários saudáveis.

### Testes laboratoriais

Bupropiona tem demonstrado interferir em testes usados para detecção de drogas em urina, podendo resultar em falsos positivos, particularmente para anfetaminas. Um método laboratorial alternativo mais específico deve ser utilizado para confirmar um resultado positivo.

### 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C.

O prazo de validade é de 18 meses a partir da data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### Aspecto físico e características organolépticas

Comprimido redondo, branco-amarelado a amarelo pálido, gravado “GS 5FV 150” para a concentração 150mg e “GS 5YZ 300” para a concentração 300mg, em tinta preta em uma face e liso na outra face. Algumas vezes **Wellbutrin® XL** pode estar com um cheiro diferente do original. Isso não altera sua função terapêutica. Isto é normal, logo, o comprimido deve continuar a ser tomado normalmente.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Os comprimidos de **Wellbutrin® XL** devem ser engolidos inteiros. Os comprimidos não podem ser partidos, triturados ou mastigados, pois isto pode ocasionar aumento no risco de efeitos adversos, incluindo convulsões.

**Wellbutrin® XL** pode ser administrado com ou sem alimentos.

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

### Adultos

A dose diária máxima de **Wellbutrin® XL** é 300 mg.

Deve haver um intervalo de pelo menos 24 horas entre doses sucessivas.

Insônia é um efeito adverso muito comum, frequentemente transitório, e pode ser reduzido evitando-se a administração do medicamento próxima ao horário de dormir (contanto que haja o intervalo de, no mínimo, 24 horas entre as doses) ou, se clinicamente indicado, reduzir a dose.

### Tratamento inicial:

A dose inicial é de 150 mg, administrada como dose única diária, pela manhã. Pacientes que não estão respondendo adequadamente à dose de 150 mg/dia podem se beneficiar com um aumento para a dose adulta usual de 300 mg/dia, administrada pela manhã. A dose diária máxima é de 300 mg, uma vez ao dia.

O início da ação da bupropiona foi observado no período de 14 dias após o início do tratamento.

O efeito antidepressivo completo do **Wellbutrin® XL** pode não ser evidente até depois de algumas semanas de tratamento, assim como acontece com quase todos os antidepressivos.

Pacientes que estavam em tratamento com **Wellbutrin® SR**:

Quando se altera o tratamento de pacientes de **Wellbutrin® SR** para os comprimidos de **Wellbutrin® XL**, deve-se administrar, quando possível, a mesma dose máxima diária. Os pacientes que estão atualmente sendo tratados com 300 mg/dia de **Wellbutrin® SR** (por exemplo, 150 mg duas vezes ao dia) podem ter a terapia trocada para 300 mg de **Wellbutrin® XL** uma vez por dia.

### Terapêutica de manutenção:

Considera-se que episódios agudos de depressão necessitam de seis meses ou mais de tratamento com drogas antidepressivas. **Wellbutrin® XL** (300 mg/dia) tem demonstrado eficácia durante tratamentos prolongados (estudos com até um ano de duração).



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

# Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

### **Crianças e adolescentes com menos de 18 anos**

Não é indicado o uso de Wellbutrin® XL em crianças ou adolescentes com menos de 18 anos de idade (ver Advertências e Precauções). A segurança e eficácia do Wellbutrin® XL comprimidos em pacientes com menos de 18 anos não foram estabelecidas.

### **Idosos:**

Uma maior sensibilidade de alguns idosos à bupropiona não pôde ser descartada. Assim, a redução na frequência e/ou na dose pode ser necessária. (ver Advertências e Precauções).

### **Uso em pacientes com insuficiência hepática**

Wellbutrin® XL deve ser utilizado com cautela em pacientes com insuficiência hepática.

Face à maior variação da farmacocinética em pacientes com cirrose hepática leve a moderada, deve ser considerada a redução na frequência da dosagem (ver Advertências e Precauções). Nestes casos, Wellbutrin® XL deve ser usado com extremo cuidado em pacientes com cirrose hepática grave. Nestes pacientes, a dose não deve exceder 150 mg em dias alternados (ver Advertências e Precauções).

### **Uso em pacientes com insuficiência renal:**

O tratamento de pacientes com insuficiência renal deve ser iniciado com frequência e/ou dose reduzidas, uma vez que a bupropiona e seus metabólitos ativos podem se acumular nestes pacientes mais que o normal. (ver Advertências e Precauções).

**Este medicamento não deve ser partido, triturado ou mastigado.**

## **9. REAÇÕES ADVERSAS**

Os dados abaixo fornecem informações sobre as reações adversas, identificadas em estudos clínicos, listadas por frequência das reações.

**Reações muito comuns (>1/10):** insônia, cefaleia, boca seca, transtornos gastrointestinais como náusea e vômito.

**Reações comuns (>1/100 e ≤1/10):** reações de hipersensibilidade, como urticária, anorexia, agitação, ansiedade, tremor, vertigem, transtornos no paladar, transtornos na visão, tinnito, aumento da pressão sanguínea (em alguns casos, grave), calor e rubor, dor abdominal, constipação, *rash* (erupções cutâneas), prurido, sudorese, febre, dores no peito, astenia.

**Reações incomuns (>1/1.000 e ≤1/100):** perda de peso, depressão, confusão mental, taquicardia, distúrbios de concentração.

**Reação rara (>1/10.000 e ≤1.000):** convulsões (ver Advertências e Precauções).

**Reações muito raras (≤1/10.000):** Reações de hipersensibilidade mais graves, incluindo angioedema, dispneia, broncoespasmo e choque anafilático; artralgia, mialgia e febre também foram relatadas em associação com *rash* e outros sintomas sugestivos de hipersensibilidade tardia. Esses sintomas podem lembrar a Doença do soro. Agressão, hostilidade, irritabilidade, inquietação, alucinações, sonhos anormais, despersonalização, delírio, ideação paranoide, ataque de pânico; alterações da glicemia, hiponatremia; distonia, ataxia, parkinsonismo, alterações na coordenação motora, alterações de memória, parestesias, disfemia, síncope; palpitações; vasodilatação, hipotensão postural; elevação no nível de enzimas hepáticas, icterícia, hepatite; eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, síndrome de lúpus eritematoso sistêmico agravado, lúpus eritematoso cutâneo, pustulose exantemática generalizada aguda; movimentos involuntários; aumento da frequência urinária ou retenção urinária; incontinência urinária, alopecia.

### **Dados pós-comercialização**

As reações adversas a seguir foram identificadas durante o uso pós-aprovação de Wellbutrin® XL. Uma vez que essas reações foram relatadas voluntariamente por uma população com tamanho incerto, nem sempre é possível estimar a frequência ou estabelecer uma relação de exposição à droga.

**Generais:** artralgia, mialgia e febre com erupção cutânea e outros sintomas sugestivos de hipersensibilidade tardia. Estes sintomas podem assemelhar-se à doença do soro (ver Advertências e Precauções);

**Cardiovascular:** hipertensão (em alguns casos grave), hipotensão ortostática, bloqueio cardíaco de terceiro grau;

**Endócrino:** síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético, hiperglicemia e hipoglicemia;

**Gastrointestinal:** esofagite e hepatite;

**Circulatório e linfático:** equimose, leucocitose, leucopenia e trombocitopenia. Alterações no INR e/ou TP, raramente associadas a complicações hemorrágicas ou trombóticas, foram observadas quando a bupropiona foi coadministrada com varfarina;

**Músculo-esquelético:** rigidez muscular/ rabdomiólise e fraqueza muscular;

**Sistema nervoso:** agressão, coma, suicídio completo, delírio, sonhos anormais, ideias paranóicas, parestesia, inquietação, tentativa de suicídio e discinesia tardia desmascarada;

**Pele e anexos da pele:** síndrome de Stevens-Johnson, angioedema, dermatite esfoliativa e urticária;

**Sentidos especiais:** tinnito e aumento da pressão intraocular.

**Em caso de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da ANVISA.**



## Modelo de Texto de Bula – Profissional de saúde

### Wellbutrin®XL comprimidos revestidos de liberação prolongada

#### 10. SUPERDOSE

Foram descritos casos de ingestão aguda de doses até 10 vezes maiores que as doses terapêuticas máximas. Além dos eventos descritos no item Reações adversas, a superdosagem tem ocasionado sintomas que incluem sonolência, redução do nível de consciência e alterações ECGs, tais como distúrbios de condução (incluindo prolongamento do intervalo QRS) e arritmias. Foram relatados alguns casos que resultaram em morte.

Tratamento: na ocorrência de superdosagem, o paciente deve ser hospitalizado. ECG e sinais vitais devem ser monitorados.

É necessário assegurar oxigenação e ventilação adequadas. O uso de carvão ativado também é recomendado. Não se conhece nenhum antídoto específico para a bupropiona. O gerenciamento futuro deve ser feito de acordo com as indicações clínicas e as recomendações do centro de toxicologia de referência, quando disponível.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### III) DIZERES LEGAIS

Registro: 1.0107.0238

Produzido por: Bausch Health Companies Inc.  
100 Lifesciences Parkway, Steinbach, MB, R5G 1Z7,- Canadá.

Importado e Registrado por: **GlaxoSmithKline Brasil Ltda.**  
Estrada dos Bandeirantes, 8.464 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 33.247.743/0001-10

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

L2262\_wellbutrin xl\_com\_rev\_lib\_prol\_GDS36\_IPI20



### Histórico de Alteração de Bula

| Dados da Submissão Eletrônica |               |  | Dados da petição/notificação que altera a bula |               |  |                   | Dados das alterações de bulas  |                |   |
|-------------------------------|---------------|--|--|---------------|--|-------------------|--|----------------|---|
| Data do Expediente            | Nº Expediente | Assunto  | Data do Expediente                             | Nº Expediente | Assunto  | Data da Aprovação | Itens de bula  | Versões VP/VPS | Apresentações Relacionadas  |
| 15/08/2013                    | 0677827/13-5  | 10458 – MEDICAMENTO NOVO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12         | 15/08/2013                                     | 0677827/13-5  | 10458 – MEDICAMENTO NOVO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12         | 15/08/2013        | III) Dizeres Legais  | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 11/02/2014                    | 0105981/14-5  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 26/11/13                                       | 0955247122    | Alteração nos cuidados de conservação  | 10/10/13          | <u>VPS</u><br>7. Cuidados de Armazenamento do Medicamento<br><u>VP</u><br>5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento ?                          | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30   |
| 28/04/2014                    | 0318789/14-6  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 28/04/2014                                     | 0318789/14-6  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 28/04/2014        | <u>VPS</u><br>5. Advertências e Precauções<br><u>VP</u><br>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 25/08/2014                    | 0700421/14-4  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 25/08/2014                                     | 0700421/14-4  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 25/08/2014        | <u>VP</u><br>10. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?  | VP             | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30   |
| 10/02/2015                    | 0128971/15-3  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 10/02/2015                                     | 0128971/15-3  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 10/02/2015        | <u>VPS</u><br>9. Reações Adversas<br><u>VP</u><br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 03/02/2016                    | 1231235/16-5  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 03/02/2016                                     | 1231235/16-5  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 03/02/2016        | <u>VPS</u><br>6. Interações Medicamentosas<br><u>VP</u><br>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 09/12/2016                    | 2585486/16-1  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 09/12/2016                                     | 2585486/16-1  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 09/12/2016        | <u>VPS</u><br>I) Composição<br>3. Características farmacológicas<br>5. Advertências e Precauções<br>6. Interações Medicamentosas<br>9. Reações Adversas<br><u>VP</u> | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |

| Dados da Submissão Eletrônica |                       |  | Dados da petição/notificação que altera a bula |               |  |                   | Dados das alterações de bulas   |                |   |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---------------|--|-------------------|---|----------------|---|
| Data do Expediente            | Nº Expediente         | Assunto  | Data do Expediente                             | Nº Expediente | Assunto  | Data da Aprovação | Itens de bula   | Versões VP/VPS | Apresentações Relacionadas  |
|                               |                       |  |  |               |  |                   | I) Composição<br>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?<br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?  |                |   |
| 27/04/2017                    | 0727880/17-2          | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                       | 27/04/2017                                     | 0727880/17-2  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 27/04/2017        | <u>VPS</u><br>9. Reações Adversas<br><u>VP</u><br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?  | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 08/05/2019                    | 0412049/19-3          | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                       | 12/02/2019                                     | 0135707/19-7  | Exclusão de indicação terapêutica  | 06/05/2019        | <u>VPS</u><br>1. Indicações<br><u>VP</u><br>1. Para que este medicamento é indicado?  | VP / VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30   |
|                               |                       |  | 25/04/2019                                     | 0371091/19-2  | Alteração de razão social do local de fabricação                                 | 25/04/2019        | <u>VP e VPS</u><br>I) Composição<br>III) Dizeres legais   | VP / VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30  |
| 23/12/2019                    | 3552346/19-8          | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                       | 23/12/2019                                     | 3552346/19-8  | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 23/12/2019        | <u>VPS</u><br>5. Advertências e precauções<br>9. Reações Adversas<br>10. Superdose<br><u>VP</u><br>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?<br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?<br>9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 18/02/2021                    | Gerado após submissão | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -  | -                 | <u>VPS</u><br>4. Contraindicações<br>5. Advertências e Precauções<br>6. Interações Medicamentosas<br>9. Reações Adversas<br>III) Dizeres Legais<br><u>VP</u><br>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?<br>III) Dizeres Legais  | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |

| Dados da Submissão Eletrônica |               |  | Dados da petição/notificação que altera a bula |               |   |                   | Dados das alterações de bulas   |                |   |
|-------------------------------|---------------|--|--|---------------|---|-------------------|---|----------------|---|
| Data do Expediente            | Nº Expediente | Assunto  | Data do Expediente                             | Nº Expediente | Assunto   | Data da Aprovação | Itens de bula   | Versões VP/VPS | Apresentações Relacionadas  |
| 22/06/2021                    | 2417944/21-9  | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -   | -                 | <u>VPS</u><br>7. Cuidados de armazenamento do medicamento<br>9. Reações Adversas<br><u>VP</u><br>5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?<br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar? | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 12/07/2021                    | 2707803/21-9  | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | 14/06/2021                                     | 2309174/21-6  | 11017 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de local de embalagem primária do medicamento | 14/06/2021        | III) Dizeres Legais   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30  |
| 27/08/2021                    | 3374294/21-9  | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -   | -                 | <u>VPS</u><br>I) Composição<br>9. Reações Adversas<br><u>VP</u><br>I) Composição<br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?  | VP e VPS       | 150 mg com rev lib lenta ct bl al/al x 30<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 24/02/2023                    | 0183878/23-0  | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -   | -                 | <u>VPS</u><br>9. Reações Adversas<br>III. Dizeres Legais<br><u>VP</u><br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?<br>III. Dizeres Legais  | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30  |
| 04/08/2023                    | 0817896/23-6  | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -   | -                 | <u>VPS</u><br>7. Cuidados de Armazenamento do medicamento<br><u>VP</u><br>5. Onde, Como e Por quanto tempo posso guardar este medicamento?  | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30  |

| Dados da Submissão Eletrônica |                         |  | Dados da petição/notificação que altera a bula |               |         |                   | Dados das alterações de bulas  |                |  |
|-------------------------------|-------------------------|--|--|---------------|---------|-------------------|--|----------------|--|
| Data do Expediente            | Nº Expediente           | Assunto  | Data do Expediente                             | Nº Expediente | Assunto | Data da Aprovação | Itens de bula  | Versões VP/VPS | Apresentações Relacionadas   |
| 14/12/2023                    | 1424741/23-8            | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -       | -                 | VPS<br>9. Reações Adversas<br>VP<br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 02/08/2024                    | 1058019/24-4            | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -       | -                 | VPS<br>5.Advertências e precauções<br>VP<br>4.o que devo saber antes de usar este medicamento?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 27/05/2025                    | 0713117/25-7            | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -  | -             | -       | -                 | VPS<br>I) Composição<br>5.Advertências e precauções<br>III – DIZERES LEGAIS<br>VP<br>I) Composição<br>4) O que devo saber antes de usar este medicamento?<br>III. Dizeres Legais | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 16/09/2025                    | 1227737/25-4            | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                       | N/A  | N/A           | N/A     | N/A               | VPS<br>5.Advertências e precauções<br>9. Reações Adversas<br>VP<br>4) O que devo saber antes de usar este medicamento?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |
| 24/11/2025                    | Gerado após a submissão | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                       | N/A  | N/A           | N/A     | N/A               | VPS:<br>9. REAÇÕES ADVERSAS<br>VP:<br>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?   | VP e VPS       | 150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>150 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 07<br>300 mg com rev lib prolong ct fr plas opc x 30 |