

**Vagicand<sup>®</sup>**  
**(nitrato de fenticonazol)**

Supera Farma Laboratórios S.A  
Creme Vaginal  
0,02 G

**VAGICAND®**  
**nitrate de fenticonazol****MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA****Crema Vaginal****FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:**

Crema vaginal, 0,02 g/g. Embalagem com 1 bisnaga contendo 40 g + 7 aplicadores descartáveis de 5 g cada.

**USO VAGINAL****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO:**

Cada 100 g de crema vaginal contém:

nitrate de fenticonazol..... 2 g\*

excipientes\*\* q.s.p ..... 100 g

\*Equivalente a 1,757 g de fenticonazol

\*\*Excipientes: propilenoglicol, edetato dissódico, metilparabeno, propilparabeno, álcool cetosteárilico, polissorbato 60, miristato de isopropila, petrolato líquido, álcool lanolina, álcool oleílico e água purificada.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE****1. INDICAÇÕES**

**Vagicand®** é indicado para o tratamento de candidíase da mucosa vaginal (vulvovaginite, vaginite e leucorreia).

**2. RESULTADOS DE EFICÁCIA**

Estudo prospectivo não comparativo foi realizado para avaliar a eficácia e tolerabilidade do fenticonazol no tratamento da vulvovaginite por *Candida albicans*. Nesse estudo 46 mulheres entre 19 e 60 anos com diagnóstico clínico e micológico de candidíase foram submetidas ao tratamento com fenticonazol crema vaginal a 2% na dose de 5 g/dia por 7 noites consecutivas. A eficácia foi avaliada clínica e micologicamente, após 10 a 14 dias do tratamento (visita 1) e após 30 a 44 dias (visita 2). Houve redução estatisticamente significativa da intensidade dos sinais e sintomas: ardor, leucorreia, prurido, hiperemia, edema, descamação do epitélio; assim como também houve redução significativa das pacientes com exame micológico positivo, demonstrando a eficácia do tratamento. Apenas 6,5% das pacientes relataram a ocorrência de eventos adversos, sendo eles: sangramento vaginal discreto (2 pacientes) e prurido (1 paciente).

Em um estudo duplo cego, foi avaliado comparativamente o tratamento da candidíase vaginal com fenticonazol crema vaginal ou com clotrimazol crema vaginal com duração de tratamento de 7 dias. Das 54 pacientes avaliadas após o término do estudo, 95% apresentaram regressão dos sintomas com boa tolerância, não havendo registro de ocorrência de eventos adversos.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

HALBE, Hans Wolfgang et al. Estudo da eficácia e tolerabilidade do fenticonazol no tratamento da vulvovaginite por *Candida albicans*. Rev Bras Med, v. 57, n. 11, p. 1306- 1311, nov. 2000.

BREWSTER, Earl et al. Effect of fenticonazole in vaginal candidiasis: a double-blind clinical trial versus clotrimazole. J Int Med Res, v. 14, n. 6, p. 306-310. 1986.

**3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS****Farmacodinâmica**

O nitrate de fenticonazol é um antimicótico de amplo espectro.

*In vitro*: Alta atividade fungistática e fungicida em dermatófitos (todas as espécies de *Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*), em *Candida albicans* e outros agentes micóticos causadores de infecções da pele e mucosa.

*In vivo*: Cura em 7 dias de micoses cutâneas causadas por *Candida* e dermatófitos em cobaias. O nitrato de fenticonazol também tem atividade antibacteriana contra microrganismos Gram-positivos.

Mecanismo de ação: inibição da oxidase do citocromo P450 da célula fúngica, inibindo a formação de ergosterol e alterando a permeabilidade da membrana. O fenticonazol causa desintegração da estrutura de mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos e do retículo endoplasmático, induzindo assim a destruição do fungo.

O nitrato de fenticonazol também tem se mostrado ativo, tanto *in vivo* como *in vitro* em *Trichomonas vaginalis*.

O início da ação do fenticonazol ocorre após cerca de 3 horas da aplicação vaginal, quando os níveis do medicamento no tecido vaginal atingem níveis significativos.

#### **Farmacocinética**

O grau de absorção do nitrato de fenticonazol tritiado (ou triciado) em humanos, medido após aplicação dérmica ou vaginal foi muito baixo. A exposição máxima observada após aplicação dérmica de 1,3 g de nitrato de fenticonazol, na forma de creme vaginal 2% (correspondente a 26 mg/kg de princípio ativo), sobre uma área de 400 cm<sup>2</sup>, ou 25 µmol de spray 2% (correspondente a 5,4 mg/kg de princípio ativo), sobre uma área de 50 cm<sup>2</sup> foi, respectivamente de 1,2 µg/kg e 1,6 µg/kg. Após administração vaginal de óvulos de 200 mg ou 1000 mg a voluntárias saudáveis e pacientes com candidíase vulvovaginal, foi observada uma média de 1,34% +/- 0,82 (desvio padrão) e 1,81% +/- 0,57 (desvio padrão), a exposição máxima correspondente foi de 91 µg/kg e 400 µg/kg.

Levando em conta o grau da absorção oral em ratos e cães, e que 20 mg/kg/dia foi o nível da dose sem efeito na toxicidade crônica e nos estudos reprodutivos, pode-se observar que animais toleraram bem a administração repetida de quantidades de nitrato de fenticonazol 5.000 a 10.000 vezes e 21 a 134 vezes maiores do que aquelas sistematicamente absorvidas em humanos após administração dérmica ou vaginal, respectivamente.

A baixa absorção sistêmica do nitrato de fenticonazol após aplicação cutânea ou vaginal é confirmada pela monitorização dos níveis plasmáticos da droga durante e ao final da terapia, em pacientes tratados com espuma dérmica 2%, loção 2% ou ducha vaginal 0,2%. Em todas as amostras analisadas, a concentração plasmática do nitrato de fenticonazol foi de 5 ng/ml.

#### **4. CONTRAINDICAÇÕES**

Hipersensibilidade aos componentes do produto.

**Este medicamento é contraindicado para crianças.**

**Este medicamento é contraindicado para uso por homens.**

#### **5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Na hora da aplicação na lesão ou da inserção intravaginal, pode ocorrer uma leve sensação de ardência que desaparece rapidamente.

Mulheres grávidas não devem utilizar aplicador sem orientação médica.

Existem relatos de que preparações intravaginais de fenticonazol podem danificar os contraceptivos de látex (preservativos) e, dessa maneira, medidas contraceptivas adicionais são necessárias durante a aplicação local.

Embora a absorção vaginal de **Vagicand**<sup>®</sup> seja muito baixa, o uso do produto durante a gravidez não é recomendado.

**Categoria de risco na gravidez: C.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano. O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento contém componentes que podem reduzir a eficácia de métodos contraceptivos de barreira à base de látex (por exemplo, preservativos ou camisinhas e diafragmas). Informe ao paciente sobre o risco de infecção por doenças sexualmente transmissíveis e sobre a necessidade de uso de outros métodos contraceptivos durante o tratamento.**

## 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A absorção sistêmica do **Vagicand®** é muito baixa, e não existem evidências na literatura de ocorrência de interações clinicamente relevantes com outros medicamentos nem outras formas de interação.

## 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto: Creme uniforme branco a levemente amarelado, livre de partículas estranhas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

### Creme vaginal 0,02 g/g

O creme deve ser introduzido na vagina com o aplicador cheio (5 g de creme). Deve-se utilizar um aplicador por dia, que deve ser descartado após o uso. O creme deve ser utilizado por 7 dias consecutivos.

Para evitar uma reinfeção, o parceiro também deve ser tratado conforme orientação médica específica.

Siga as instruções ilustradas nos seguintes diagramas.

Assegure-se que o aplicador está perfeitamente limpo.


### Instruções para o uso

Lave bem as mãos antes e depois das aplicações com **Vagicand®**.


Todas as aplicações devem ser feitas à noite, antes de deitar.

### Aplicador do creme (bisnaga)


1. Fure completamente o bico da bisnaga com a parte de trás da tampa e rosqueie o aplicador na bisnaga no lugar da tampa. Aperte a bisnaga suavemente em sua parte inferior (fundo), para que o aplicador seja preenchido. Caso haja uma certa resistência do êmbolo, puxe-o delicadamente. O aplicador deve ser preenchido por completo.



2. Remova o aplicador da bisnaga, que deve ser fechada imediatamente com a tampa.



3. Deitada, com as pernas flexionadas e separadas, introduza delicadamente o aplicador profundamente na vagina e empurre o êmbolo completamente. Puxe o aplicador para fora sem tocar no êmbolo. Depois, descartar o aplicador.



## 9. REAÇÕES ADVERSAS

Em estudos clínicos, o nitrato de fenticonazol tem se demonstrado muito bem tolerado, com baixa ocorrência de eventos adversos.

Algumas reações adversas podem ocorrer em casos isolados.

**Reação rara ( $> 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ ):** ardor, irritação e/ou prurido no local, sangramento vaginal discreto, reação de hipersensibilidade.

**Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.**

## 10. SUPERDOSE

Até o momento não foram observados casos de superdosagem com o produto, pois **Vagicand®** é muito pouco absorvido, quando usado conforme instruções, e repercussões de natureza sistêmica podem, portanto, ser excluídas.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## DIZERES LEGAIS

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO.

Nº do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

Registro: 1.0372.0256

Farm. Resp.: Dra. Silmara Souza Carvalho Pinheiro.

CRF-SP nº 37.843

**Registrado por: Supera Farma Laboratórios S.A.**

Avenida das Nações Unidas, 22.532, bloco 1, Vila Almeida – São Paulo – SP.

CNPJ: 43.312.503/0001-05

Indústria Brasileira

**Produzido por: Eurofarma Laboratórios S.A.**

Rod. Pres. Castello Branco, 3.565 - Itapevi – SP.

**Comercializado por: Supera RX Medicamentos Ltda.**

Extrema – MG.

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 01/12/2025.**

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
WWW.SUPERAFARMA.COM.BR  
supera.atende@superarx.com.br  
0800-708-1818



| Dados submissão eletrônica |                |                                                                        | Dados da petição/notificação que altera a bula |                  |         |                   | Dados das alterações de bulas                                |                  |                                   |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Data do expediente         | No. expediente | Assunto                                                                | Data do expediente                             | Nº do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula                                                | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas        |
| 14/12/2015                 | N/A            | 10457 – SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12        | -----                                          | -----            | -----   | -----             | -----                                                        | VPS00            | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |
| 07/07/2016                 | N/A            | 10450- SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | -----                                          | -----            | -----   | -----             | DIZERES LEGAIS- Restrição de uso                             | VPS01            | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |
| 09/11/2016                 | N/A            | 10450- SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | -----                                          | -----            | -----   | -----             | 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR                                  | VPS02            | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |
| 02/03/2017                 | N/A            | 10450- SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | -----                                          | -----            | -----   | -----             | N.A                                                          | VPS03            | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |
| 07/08/2019                 | N/A            | 10450- SIMILAR – Notificação de Alteração                              | -----                                          | -----            | -----   | -----             | 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO<br>DO MEDICAMENTO<br>9. REAÇÕES | VPS04            | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |

|            |     | de Texto de Bula – RDC 60/12                                          |       |       |       |       | ADVERSAS                                                                                                                                                  |       |                                   |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 15/04/2020 | N/A | 10450-SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | ----- | ----- | ----- | ----- | IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO<br>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO<br>8. POSOLOGIA E MODO DE USAR<br>DIZERES LEGAIS                              | VPS05 | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |
| 03/11/2020 | N/A | 10450-SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9. REAÇÕES ADVERSAS                                                                                                                                       | VPS06 | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |
| 23/02/2026 | N/A | 10450-SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA<br>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES<br>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO<br>8. POSOLOGIA E MODO DE USAR<br>DIZERES LEGAIS | VPS07 | 0,02 G/G CREM VAG CT BG AL X 40 G |