



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

Rua Michigan, 735

São Paulo, Brasil

CEP: 04566-905

T: (11) 5536-7000

F: (11) 5536-7345

**Influvac<sup>®</sup>**  
**vacina influenza trivalente**  
**(inativada, subunitária)**

**Cepas influenza: cepa tipo A (H1N1) + cepa tipo A  
(H3N2) + cepa tipo B**

**ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**  
**Suspensão injetável 0,5 mL**  
**15 mcg de hemaglutinina/ cepa**



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000

## I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**INFLUVAC<sup>®</sup>**  
**vacina influenza trivalente**  
**(inativada, subunitária)**

**HEMISFÉRIO SUL**

**Cepas 2026**

**APRESENTAÇÕES**

INFLUVAC<sup>®</sup> (cepas influenza) suspensão injetável apresentada embalagem contendo:

- 1 seringa, com agulha, preenchida com 0,5 mL ou
- 10 seringas, com agulha, preenchidas com 0,5 mL cada

**VIA INTRAMUSCULAR (PREFERENCIAL) OU SUBCUTÂNEA PROFUNDA (ALTERNATIVA).**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES**

**COMPOSIÇÃO**

Cada seringa de 0,5 mL de INFLUVAC<sup>®</sup> contém:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 *	15 mcg de hemaglutinina
A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) **	15 mcg de hemaglutinina
B/Austria/1359417/2021 ***	15 mcg de hemaglutinina
cloreto de potássio	0,10 mg
fosfato de potássio monobásico	0,10 mg
fosfato dissódico di-hidratado	0,67 mg
cloreto de sódio	4,0 mg
cloreto de cálcio di-hidratado	0,067 mg
cloreto de magnésio hexaidratado	0,05 mg
água para injetáveis	q.s.p. 0,5 mL

As cepas análogas utilizadas na produção desta vacina foram:

\*A/Switzerland/6849/2025, IVR-278

\*\* A/Singapore/GP20238/2024, IVR-277

\*\*\*B/Austria/1359417/2021, BVR-26

Os antígenos de superfície do vírus influenza (hemaglutinina e neuraminidase) das cepas utilizadas na produção desta vacina, citadas acima, são propagados em ovos fertilizados de galinhas saudáveis.

A vacina é produzida com uso de substâncias auxiliares que podem estar presentes no produto final:

citrato de sódio	≤ 1,0 mg
brometo de cetiltrimetilamônio	≤ 15,0 mcg
sacarose	≤ 0,2 mg
formaldeído 35%	≤ 0,01 mg
polissorbato 80	traços

Outras substâncias utilizadas na preparação da suspensão de semente viral, e que não são parte do produto final: traços de ovo (como a ovalbumina e proteínas de galinha), hidrocortisona e tartarato de tilosina e menos de 1 ng de sulfato de gentamicina.

## II) INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

### 1. INDICAÇÕES

INFLUVAC<sup>®</sup> (cepas influenza) é indicada para a profilaxia da influenza. A vacina é recomendada para crianças a partir de 6 (seis) meses de idade e adultos sem limite de idade. Para indicações específicas, favor verificar as recomendações oficiais.

### 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

A imunidade conferida pela vacina na temporada de 2015 desenvolveu-se após 21 dias da vacinação. Os títulos máximos de anticorpos diminuem gradativamente e, devido à característica mutante do vírus influenza, recomenda-se que a vacinação seja anual e durante os meses de outono para que se possa obter máximo potencial imunogênico durante o inverno, quando a circulação do vírus influenza é maior.

Estudo clínico conduzido com as cepas presentes na vacina influenza A(H3N2), A(H1N1) e B, avaliou 120 pacientes adultos divididos em dois grupos, 60 pacientes entre  $\geq 18$  e  $\leq 60$  anos e 60 idosos com  $\geq 61$  anos de idade. Os resultados de eficácia analisados no 22º dia após a vacinação, demonstraram as seguintes taxas de soroproteção por grupo de pacientes analisados:

Taxa de soroproteção pós-vacinal:

	Cepa A(H3N2)*	Cepa A(H1N1)*	Cepa B*(#)
Pacientes entre $\geq 18$ e $\leq 60$ anos (N=60)	96,6%	96,6%	93,2% (96,6%)
Pacientes com $\geq 61$ anos (N=58)	98,3%	88,1%	64,4% (88,1%)

\*análise por inibição por hemoaglutinação

#análise por hemólise radial simples

Os resultados deste estudo indicaram que a vacina influenza da temporada de 2015 induziu uma reposta de anticorpos adequada na população estudada, cumprindo com o requerimento do Comitê Europeu de Produtos Médicos para uso Humano (CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use) para a imunogenicidade da vacina influenza, para ambos os grupos de idade. A vacina influenza foi segura e bem tolerada neste estudo.

Com os resultados do estudo anual descrito acima<sup>1</sup> e com resultados de estudos clínicos realizados durante 30 anos de comercialização da vacina<sup>2</sup> é possível concluir que esta vacina encontra todos os critérios de imunogenicidade, estabelecidos pelo EU CHMP e a segurança desta vacina nesses estudos está de acordo com as informações descritas nesta bula.

### Referências Bibliográficas

1. Dados não publicados: Investigador: Dr. M. Arya



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000

Immunogenicity, Reactogenicity and Safety of the Trivalent Influenza Subunit Vaccine Influvac® for the Southern Hemisphere Season 2015. An Open-Label, Baseline-Controlled Study in Two Age Groups: Adult Subjects  $\geq 18$  and  $\leq 60$  Years and Elderly Subjects  $\geq 61$  Years of Age.

2. S.V. van de Witte, J. Nauta, K.M. Giezevan-Smiths, J.M. de Voogd. Trivalent inactivated subunit influenza vaccine Influvac®: 30-year experience of safety and immunogenicity. *Trials in Vaccinology* 1 (2012) 42- 48.

### 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

INFLUVAC® é utilizada na prevenção da gripe. INFLUVAC® contém antígenos de superfície hemaglutinina e neuraminidase; 0,5 mL da vacina por injeção contém 15 microgramas do antígeno hemaglutinina de cada cepa de vírus recomendada pela OMS para cada temporada. Os antígenos estimulam a produção dos anticorpos contra a cepa do vírus influenza especificada, prevenindo a gripe especialmente naqueles indivíduos que tenham risco aumentado de complicações associadas à gripe. A imunidade é geralmente obtida em 2 a 3 semanas após a vacinação. A duração da imunidade pós-vacinação para a cepa homóloga ou cepas intimamente relacionadas às cepas da vacina varia, mas é usualmente de 6 a 12 meses.

### 4. CONTRAINDICAÇÕES

**Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com hipersensibilidade conhecida às substâncias ativas, a qualquer um dos excipientes presentes no item COMPOSIÇÃO, ou à qualquer substância que pode estar presente na forma de traços como ovo (ovalbumina e proteínas de galinha), formaldeído, brometo de cetiltrimetilamônio, polissorbato 80 ou gentamicina.**

A imunização deverá ser adiada em pacientes com febre ou infecção aguda.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 6 meses de idade.**

### 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

INFLUVAC® não deve, em nenhuma circunstância, ser administrada por via intravenosa.

Administrar preferencialmente por via intramuscular, podendo também ser administrada por via subcutânea profunda (alternativa).

Como para todas as vacinas injetáveis, supervisão e tratamento médico apropriado devem estar prontamente disponíveis em caso de um evento anafilático após a administração da vacina.

Tal como acontece com outras vacinas administradas por via intramuscular, esta vacina deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação, uma vez que pode ocorrer hemorragia após uma administração intramuscular nestes indivíduos.

Reações relacionadas com ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas com estresse podem ocorrer após, ou mesmo antes, de qualquer vacinação como resposta psicogênica à injeção com agulhas. Isto pode ser acompanhado por vários sinais neurológicos tais como distúrbios visuais transitórios, parestesia e movimentos dos membros tônico-clônicos durante recuperação. É importante que haja procedimentos estabelecidos no local para evitar danos provocados por desmaios.

Esta vacina não é eficaz contra todas as cepas possíveis do vírus da gripe. Esta vacina destina-se a fornecer proteção contra as cepas de vírus a partir das quais a vacina é preparada e está intimamente relacionada.

Como acontece com qualquer vacina, uma resposta imune protetora pode não ser induzida em todos os vacinados. A resposta imunológica em pacientes com imunossupressão endógena ou iatrogênica pode ser insuficiente.



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000

**A resposta imunológica à vacina pode ser alterada se o paciente estiver sob tratamento imunossupressor.**

#### **Fertilidade, Gravidez ou lactação**

Vacinas de influenza inativada podem ser utilizadas em todos os estágios da gravidez. Um grande número de dados de segurança está disponível para o segundo e o terceiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre de gravidez. No entanto, dados do uso mundial da vacina influenza não indicam qualquer efeito adverso fetal ou maternal atribuído à vacina.

**O uso desse medicamento não interfere no aleitamento do bebê. Uso compatível com o aleitamento ou doação de leite humano.**

**Categoria de risco na gravidez: C**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

#### **Amamentação**

INFLUVAC<sup>®</sup> pode ser usada durante a amamentação.

#### **Fertilidade**

Não existem dados disponíveis relacionados à fertilidade com o uso de INFLUVAC<sup>®</sup>.

#### **Efeitos na habilidade de dirigir ou operar máquinas**

INFLUVAC<sup>®</sup> tem uma influência insignificante ou inexistente na habilidade de dirigir ou operar máquinas.

## **6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

INFLUVAC<sup>®</sup> pode ser administrada simultaneamente a outras vacinas. Neste caso, a imunização deve ocorrer em membros distintos, com seringas e agulhas diferentes. Pode ocorrer intensificação das reações adversas.

A resposta imunológica pode ser comprometida se o paciente estiver em tratamento imunossupressor.

Após a vacinação, resultados falso-positivos em testes sorológicos utilizando o método ELISA para detectar anticorpos contra HIV1, Hepatite C e, especialmente, HTLV-1 foram observados. A realização da técnica de Western Blot, de maior especificidade, demonstra que tais resultados são falso-positivos. As reações falso-positivas transitórias podem ocorrer devido a resposta tipo IgM à vacina.

## **7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

INFLUVAC<sup>®</sup> deve ser armazenada em temperatura entre +2°C e +8°C (Refrigerador), na embalagem original e protegida da luz. Não congelar.

Se armazenado nas condições indicadas, o medicamento se manterá próprio para consumo pelo prazo de validade de 12 meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem externa.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**INFLUVAC<sup>®</sup> (0,5 mL cada seringa):** suspensão injetável, líquido límpido incolor em seringas de vidro preenchidas de dose-única.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **8. POSOLOGIA E MODO DE USAR**

**Adultos e crianças a partir de 36 meses:** 0,5 mL

**Crianças de 6 a 35 meses:** 0,25 mL embora os dados clínicos sejam limitados.

**Para crianças de 6 meses a 8 anos que ainda não tenham sido previamente vacinadas:** uma segunda dose deverá ser administrada após um intervalo de pelo menos 4 semanas.

**Para adultos e crianças a partir de 9 anos de idade:** é necessária apenas uma dose de 0,5 mL.

A vacinação deve ser realizada anualmente, antes do início da temporada da gripe com a vacina preconizada pela Organização Mundial da Saúde para o período.

Crianças com menos de 6 meses: a segurança e eficácia de INFLUVAC<sup>®</sup> em crianças com menos de 6 meses não está estabelecida. Não há dados disponíveis.

### **Modo de usar:**

INFLUVAC<sup>®</sup> deve ser mantida em temperatura entre +2°C e +8°C e administrada em temperatura ambiente.

Não deve ser congelada.

Proteger da luz.

Agite imediatamente antes de usar.

INFLUVAC<sup>®</sup> deve ser administrada por via intramuscular (preferencial) ou por via subcutânea profunda (alternativa). Remova a proteção da agulha e elimine o ar da seringa segurando-a verticalmente com a agulha apontada para cima, empurrando o êmbolo lentamente. O conteúdo deve ser utilizado imediatamente. Após a aplicação, não reencapar a agulha e descartar em local adequado.

Para as apresentações do produto com seringa preenchida sem agulha, remover o batoque ou tampa da seringa e acoplar a agulha apenas no momento da administração, nunca antes disso. Higienizar adequadamente as mãos antes e sempre que realizar este procedimento.

Inspecionar visualmente a vacina antes do uso. A suspensão deve estar límpida e incolor. Não utilizar se a suspensão se apresentar turva, com partículas em suspensão ou precipitados.

INFLUVAC<sup>®</sup> não deve ser misturada com outra vacina na mesma seringa.

### **Como administrar uma dose de 0,25 mL**

Antes de administrar: empurre a parte frontal do êmbolo exatamente até o início da marcação existente na seringa; isto fará com que um volume de apenas 0,25 mL permaneça na seringa para ser administrado.

Qualquer porção não utilizada do produto deve ser descartada.

## **9. REAÇÕES ADVERSAS**

### **Resumo do perfil de segurança**

As reações adversas mais frequentemente notificadas após a administração são reações locais e/ou sistêmicas, como dor no local da injeção ou fadiga e cefaleia. A maioria dessas reações adversas são de intensidade leve a moderada. Essas reações geralmente desaparecem no prazo de 1-2 dias após a administração.

Em casos raros, as reações alérgicas podem evoluir para choque e angioedema.

### **Resumo das reações adversas**



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000

Os seguintes efeitos indesejáveis foram observados durante os ensaios clínicos ou são resultantes da experiência pós-comercialização com as seguintes frequências:

**Reações comuns ( $\geq 1/100$  e  $<1/10$ ):**

- Distúrbios do Sistema Nervoso: cefaleia\*;
- Distúrbios da pele e tecido subcutâneo: sudorese\*;
- Distúrbios músculo-esquelético e do tecido conectivo: mialgia e artralgia\*;
- Distúrbios gerais e no local de administração: febre, mal-estar, calafrio, fadiga. Reações locais: eritema, edema, dor, equimose e endurecimento. \*

\*Estas reações são transitórias e normalmente desaparecem espontaneamente em 1-2 dias.

**Frequência desconhecida<sup>a</sup>:**

Sistema sanguíneo e linfático: trombocitopenia transitória, linfadenopatia transitória;  
Desordens do sistema imune: reações alérgicas (em casos raros podendo levar a choque), angioedema;  
Desordens do sistema nervoso: neuralgia, parestesia, convulsões associadas a febre, desordens neurológicas como encefalomielite, neurite e síndrome de Guillain-Barré;  
Desordens vasculares: vasculite associada, em casos muito raros, problemas renais transitórios;  
Desordens gerais e do local de aplicação: reações de pele generalizadas, incluindo prurido, urticária e erupções cutâneas não-específicas.

<sup>a</sup>Como essas reações são relatadas voluntariamente de uma população tamanho incerto, não é possível realizar uma estimativa confiável da frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição à droga.

**Comunicação de suspeitas de reações adversas**

Relatar suspeitas de reações adversas após o registro do medicamento é importante. Isto permite o monitoramento contínuo da relação benefício / risco do medicamento.

Os profissionais de saúde são convidados a relatar quaisquer suspeitas de reações adversas através do site descrito na frase abaixo.

**Em casos de eventos adversos, notifique à empresa e ao Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.**

**10. SUPERDOSE**

É improvável que uma superdose de INFLUVAC<sup>®</sup> cause qualquer efeito adverso.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**III) DIZERES LEGAIS**

**Registro:** 1.0553.0336

**Produzido por:** Abbott Biologicals B.V.  
Weesp - Holanda

**Embalado por:** Abbott Biologicals B.V.  
Olst - Holanda



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000

**Registrado e Importado por:** Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo - SP  
CNPJ 56.998.701/0001-16

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**BU 34**

### **ABBOTT CENTER**

Central de Relacionamento com o Cliente  
0800 703 1050  
[www.abbottbrasil.com.br](http://www.abbottbrasil.com.br)

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 25/11/2025.**





Abbott Laboratórios do  
Brasil Ltda  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000  
F: (11) 5536-7345

**Histórico de alterações do texto de bula – INFLUVAC®**

Dados da Submissão Eletrônica			Dados da Petição/ notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
16/03/2026	Versão atual	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	12/03/2026	0243710/26-7	11983 - PRODUTOS BIOLÓGICOS - 74. Atualização de cepa(s) de produção da vacina influenza sazonal - Menor (*)	12/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO</li> <li>APRESENTAÇÕES</li> <li>COMPOSIÇÃO</li> <li>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</li> <li>7.CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO</li> <li>DIZERES LEGAIS</li> </ul>	VP e VPS	SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML
08/02/2023	0132573/23-7	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	08/02/2023	0129036/23-3	11983 - PRODUTOS BIOLÓGICOS - 74. Atualização de cepa(s) de produção da vacina influenza sazonal - Menor (*)	08/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composição</li> <li>7.CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO</li> </ul>	VP e VPS	SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML
10/02/2022	0508944/22-8	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	04/02/2022	0441282/22-6	11983 - PRODUTOS BIOLÓGICOS - 74. Atualização de cepa(s) de produção da vacina influenza sazonal - Menor (*)	04/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apresentações</li> <li>Composição</li> <li>1.INDICAÇÕES</li> <li>3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS</li> <li>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</li> <li>6.INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS</li> <li>7.CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>

INFLUVAC\_Histórico de alterações de bula-ATUALIZAR



Abbott Laboratórios do  
Brasil Ltda  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000  
F: (11) 5536-7345

							DO MEDICAMENTO •8. POSOLOGIA E MODO DE USAR •10. SUPERDOSE • Dizeres Legais		
08/03/2021	0906639/21-0	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	22/10/2020	3668258/20-6	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	08/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição</li> <li>• 5.ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</li> <li>• 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
09/03/20	0709130/20-3	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	14/11/2019	3175215/19-2	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	09/03/20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
25/02/19	0176923/19-5	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	23/11/2018	1112427/18-0	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	25/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
06/04/18	0266464/18-0	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	07/12/2017	2269796/17- 9	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	19/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
31/03/17	0515571/17-1	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	13/12/2016	2594768/16-1	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	06/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
11/05/16	1727429/16-0	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação	---	---	---	---	VPS: • ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES e	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> </ul>

INFLUVAC\_Histórico de alterações de bula-ATUALIZAR



Abbott Laboratórios do  
Brasil Ltda  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000  
F: (11) 5536-7345

		de alteração de texto de bula – RDC 60/12					<p>REAÇÕES ADVERSAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSOLOGIA E MODO DE USAR</li> </ul> <p>VP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?</li> <li>• COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
10/03/2016	1347796/16-0	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	15/12/2015	1093477/15-4	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	07/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação do medicamento</li> <li>• Composição</li> <li>• Dizeres Legais</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
07/04/2015	0298787/15-2	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	15/12/2014	1129866/14-9	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	23/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação do medicamento</li> <li>• Composição</li> <li>• Dizeres Legais</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML</li> </ul>
21/02/2014	0137802/14-3	10456 – PRODUTO BIOLÓGICO – Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	14/11/2013	0958810/13-8	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	10/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação do medicamento</li> <li>• Composição</li> <li>• Dizeres Legais</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 1 SER PREENC VD INC X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> </ul>
17/04/2013	0295771/13-0	10463 - PRODUTO BIOLÓGICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2012	0896618/12-4	1518 - PRODUTO BIOLÓGICO - Atualização da(s) Cepa(s) de Produção da Vacina Influenza	04/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1ª submissão</li> </ul>	VP e VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUS INJ CT 1 SER PREENC VD INC X 0,5 ML</li> <li>• SUS INJ CT 1 SER PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML</li> </ul>

INFLUVAC\_Histórico de alterações de bula-ATUALIZAR