



BULA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE:

POMADA MINANCORA®
Minancora & Cia LTDA.
Pomada dermatológica
Cloreto de benzalcônio + Óxido de zinco + Cânfora
0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g



POMADA MINANCORA®

Cloreto de benzalcônio + Óxido de zinco + Cânfora

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica com 30g, contendo 0,005 g/g de cloreto de benzalcônio, 0,200 g/g de óxido de zinco e 0,050 g/g de cânfora.

USO DERMATOLÓGICO (EXTERNO/ TÓPICO).

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS.

SOMENTE UTILIZAR EM CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS, POIS PODE PROVOCAR INTOXICAÇÃO E CONVULSÕES.

COMPOSIÇÃO

Cada g de pomada contém:

Cloreto de benzalcônio.....0,005 g

Óxido de zinco.....0,200 g

Cânfora.....0,050 g

Excipientes: petrolato branco, parafina, cera amarela de abelha, propilenoglicol, corante vermelho de ponceau, butil-hidroxitolueno.

II -INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

A POMADA MINANCORA® é destinada para tratamento doenças de pele tais como: espinhas, frieiras (disidrose), escaras e ainda como coadjuvante no tratamento de picadas de insetos, urticárias e pequenos ferimentos superficiais inclusive os ocasionados pelo barbear. Previne os odores desagradáveis das axilas e dos pés e o ressecamento da pele.

2. RESULTADO DE EFICÁCIA

A pesquisa clínica cujo escopo foi a avaliação do efeito anti-inflamatório e adstringente da POMADA MINANCORA® nos estágios inflamatórios da acne vulgar e na disidrose plantar demonstrou os seguintes resultados:

- Casos de Acne Vulgar: melhora 61,5% dos tratados.

- Casos de Disidrose: melhora clínica em 44% e – sensação de alívio em 78% dos pacientes.

Bibliografia: PETRI, V.; Avaliação do efeito anti-inflamatório e adstringente da associação de cloreto de benzalcônio, cânfora e óxido de zinco nos estágios inflamatórios da acne vulgar e na disidrose plantar.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS



A POMADA MINANCORA® é um antisséptico, adstringente e cicatrizante que tem como finalidade a prevenção e o tratamento das doenças da pele, com ação tópica e localizada. A POMADA MINANCORA® é indicada para tratamento sintomático.

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento é contraindicado para uso em indivíduos hipersensíveis aos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Somente utilizar em crianças acima de 2 anos, pois pode provocar intoxicação e convulsões.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilizar a POMADA MINANCORA® em mucosas e/ou ferimentos abertos, pois poderão ocorrer irritações. Caso o produto entre em contato com os olhos, região mucosa, ferimentos abertos, retire-o imediatamente, lavando delicadamente com água e sabão em abundância, e procure orientação médica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista (Categoria C).

Há evidências que associam o uso pediátrico de cânfora à ocorrência de intoxicação, inclusive com convulsões. Este medicamento não deve ser utilizado por menores de 2 anos nem por crianças pequenas ou malnutridas, pois nesses casos a absorção pela pele pode ser substancial. Além disso, crianças possuem mecanismos de desintoxicação hepática imaturos.

Não remova o selo de segurança presente no produto. Para abrir a embalagem da POMADA MINANCORA®, puxe a tampa.

Atenção: Contém o corante vermelho de ponceau que pode eventualmente causar reações alérgicas.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento, não foram relatadas quaisquer interações medicamentosas com a POMADA MINANCORA®.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

A POMADA MINANCORA® deve ser conservada em temperatura ambiente (de 15° a 30°C). Proteger da luz. Este medicamento tem prazo de validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Não remova o selo de segurança presente no produto. Para abrir a embalagem da POMADA MINANCORA®, puxe a tampa.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas: Massa untuosa, cor rósea e odor característico de cânfora.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR



A POMADA MINANCORA® é indicada para uso dermatológico. Aplicar uma fina camada da POMADA MINANCORA®, em quantidade suficiente para cobrir a região afetada, sobre a pele limpa e seca, duas vezes ao dia (a cada 12 horas). Não utilizar a POMADA MINANCORA em mucosas e/ou ferimentos abertos, pois poderão ocorrer irritações. Caso o produto entre em contato com os olhos, região mucosa, ferimentos abertos, retire-o imediatamente, lavando delicadamente com água e sabão em abundância, e procure orientação médica. Duração de tratamento: A POMADA MINANCORA é indicada para tratamento sintomático. Via de administração: A POMADA MINANCORA é indicada para uso dermatológico (Externo/Tópico).

9. REAÇÕES ADVERSAS

As frequências das reações adversas estão listadas a seguir de acordo com a seguinte convenção:

Reações muito comuns (ocorrem em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento).

Reações desconhecidas (não podem ser estimadas a partir dos dados disponíveis).

A ocorrência de reação adversa com o uso do produto é muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): todas as reações adversas ocorrem na pele e caracterizam-se por dermatite de contato, sendo esta ardência, hiperemia (vermelhidão), prurido (coceira), formação de pápulas (elevação da pele) e vesículas (pequenas bolhas) e exsudato (secreção), podendo evoluir para descamação e crostas.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

O quadro clínico por ingestão acidental ou superdosagem, ainda não é conhecido. Na eventualidade, adotar as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de intoxicação ligue para 0800-722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

Reg. M.S. 1.0690.0003.002-6.

Registrado e Produzido por: Minancora & Cia Ltda.

Rua Dona Francisca, 14.795 Joinville/SC.

CNPJ 84.683.382/0003-57. Indústria Brasileira.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 0800 0 467676.

Responsável Técnico: Ana Maria Gibertoni - CRF/SC 23066.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.



Esta bula foi atualizada pela Anvisa em __/__/__





Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VP S)	Apresentações relacionadas
		10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	DIZERES LEGAIS: alteração responsável técnico, atualização do logo, número de SAC e VIGIMED.	VP/VPS	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g POM DER PT PLAS OPC X 30 G
06/05/2021	1747024212	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	DIZERES LEGAIS: alteração responsável técnico	VP/VPS	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g POM DER PT PLAS OPC X 30 G
16/04/2013	0291321136	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - publicação no	NA	NA	NA	NA	Versão Inicial	VP/VPS	Pomada Minâncora 0,005 g/g + 0,200 g/g + 0,050 g/g

