

**Polvilho Antisséptico Granado
Tradicional**

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Pó de uso tópico

100 g e 200 g

BULA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:
POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO TRADICIONAL
ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

APRESENTAÇÃO:
PÓ DE USO TÓPICO
USO ADULTO

Composição

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g
Excipientes: amido e talco.

Cada 200 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,704 g, enxofre 35,204 g, ácido bórico 6 g, óxido de zinco 23,47 g
Excipientes: amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PROFISSIONAL DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras e brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos. Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa.

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde. Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde. Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS:

Registros:

100 g - 1.0817.0030.0025

200 g - 1.0817.0030.0033

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0001-17

Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0004-60

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:

Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**Póvilho Antisséptico Granado
Sport**

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Pó de uso tópico

100 g

BULA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:
POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO SPORT**

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

**APRESENTAÇÃO:
PÓ DE USO TÓPICO
USO ADULTO**

Composição

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PROFISSIONAL DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras e brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos.

Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa.

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde. Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.

Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS:

Registro: 1.0817.0030.0068

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0001-17

Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0004-60

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:

Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**Polvilho Antisséptico Granado
Fresh**

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Pó de uso tópico

100 g

BULA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO FRESH

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

APRESENTAÇÃO:

PÓ DE USO TÓPICO

USO ADULTO

Composição

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PROFISSIONAL DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras e brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos.

Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa.

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde. Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.

Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS:

Registros: 1.0817.0030.0041

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0001-17

Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.
CNPJ: 33.109.356/0004-60
Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447
Indústria Brasileira
Atendimento ao consumidor:
Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**Polvilho Antisséptico Granado
Pink**

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Pó de uso tópico

100 g

BULA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO PINK

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

APRESENTAÇÃO:

PÓ DE USO TÓPICO

USO ADULTO

Composição

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PROFISSIONAL DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras e brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos.

Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa.

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde. Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.

Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS:

Registro: 1.0817.0030.0084

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0001-17

Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0004-60

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:

Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
2025	Incluir após protocolo	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	Incluir após protocolo	Incluir após protocolo	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	Incluir após protocolo	Adequação a RDC 769/22, RDC 770/22 e IN 200/22	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink 200 g - Tradicional
11/10/2023	1087008239	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	11/10/2023	1087008239	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	11/10/2023	Dizeres legais: nome e CRF do responsável técnico	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink 200 g - Tradicional
01/10/2021	3875914210	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	01/10/2021	3875914210	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	01/10/2021	Inclusão da frase obrigatória Vigimed	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink 200 g - Tradicional
16/04/2021	1461870212	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de	16/04/2021	1461870212	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de	16/04/2021	Inclusão da frase obrigatória Vigimed	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink

		Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12			Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12				200 g - Tradicional
04/06/2014	Transação 4780412014	10458 – MEDICAMENTO NOVO – Inclusão inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	04/06/2014	Transação 4780412014	10458 – MEDICAMENTO NOVO – Inclusão inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	04/06/2014	Adequação à RDC 60/2012	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink 200 g - Tradicional
N/A Petição física	N/A Petição física	N/A Petição física	16/11/2009	875092091	10270 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – Adequação à RDC 47/09	16/11/2009	Adequação à RDC 47/2009	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink 200 g - Tradicional