



**PREBICTAL<sup>®</sup>**

**(pregabalina)**

**Adium S.A.**

**cápsula dura**

**50 mg**

**PREBICTAL®**

pregabalina

**APRESENTAÇÕES**

Cápsula dura

Prebictal® 50 mg é apresentado em embalagem contendo 7, 30 ou 60 cápsulas duras.

**USO ORAL****USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS****COMPOSIÇÃO**

Cada cápsula dura de Prebictal® 50 mg contém:

pregabalina ..... 50 mg

Excipientes: lactose monoidratada, amido de milho, povidona, talco, dióxido de titânio e gelatina.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE****1. INDICAÇÕES****Dor Neuropática**

Prebictal® (pregabalina) é indicado para o tratamento da dor neuropática, dor causada por lesão ou disfunção do sistema nervoso, como ocorre, por exemplo, na neuropatia diabética, neuropatia pós-herpética e na lesão medular em adultos.

**Epilepsia**

Prebictal® é indicado como terapia adjunta das crises parciais, com ou sem generalização secundária.

**Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)**

Prebictal® é indicado para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG) em adultos.

**Fibromialgia**

Prebictal® é indicado para o controle de fibromialgia.

**2. RESULTADOS DE EFICÁCIA****Dor neuropática**

A pregabalina foi avaliada em 9 estudos clínicos controlados por até 13 semanas duas vezes por dia e até 8 semanas com esquema posológico de três vezes ao dia. No geral, o perfil de segurança e eficácia para esquemas posológicos de duas e três vezes ao dia foram similares.

Dor neuropática associada à neuropatia periférica diabética

Estudos duplo-cegos, controlados com placebo e multicêntricos, respeitando o esquema posológico de três vezes ao dia, avaliaram a eficácia de pregabalina em pacientes com diagnóstico de polineuropatia diabética. Os pacientes foram randomizados em dois grupos, grupo tratado com pregabalina e grupo placebo. Em ambos os estudos, a eficácia de pregabalina para a redução de pelo menos 50% da dor foi comprovada com uma diferença estatisticamente significativa.

Neuralgia pós-herpética

Em dois estudos duplo-cegos, randomizados e placebo-controlados, a eficácia de pregabalina foi superior à do placebo no alívio da dor associada à neuropatia pós-herpética. Além disso, houve uma melhora estatisticamente significativa do sono no grupo tratado com pregabalina pela menor interferência do sono pela dor. Um dos estudos mostrou uma redução de pelo menos 30% de dor em 63% dos pacientes tratados com pregabalina *versus* 25% no grupo placebo.

#### Dor neuropática associada à lesão medular

A eficácia de pregabalina na dor neuropática associada à lesão medular foi estabelecida em dois estudos multicêntricos, duplo-cegos e placebo-controlados, um de 12 semanas e outro de 17 semanas de duração. Ambos os estudos confirmaram a eficácia estatisticamente significativa da pregabalina em reduzir progressivamente o *escore* da dor. Além disso, ao longo dos estudos, foi observado um aumento crescente e gradual da proporção de pacientes com redução significativa da dor. Alguns pacientes apresentaram a redução da dor desde a primeira semana de tratamento, a qual persiste ao longo dos estudos.

#### **Epilepsia**

A pregabalina foi avaliada em 3 estudos clínicos controlados de 12 semanas de duração com esquema posológico de duas ou três vezes ao dia. No geral, o perfil de segurança e eficácia para ambos os esquemas foram similares.

Uma redução significativa na frequência das crises foi observada na Semana 1.

#### **Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)**

A pregabalina foi avaliada em 6 estudos controlados de 4-6 semanas de duração, um estudo em idosos com 8 semanas de duração e um estudo de prevenção da recidiva a longo prazo com fase de prevenção da recidiva duplo-cego de 6 meses de duração.

A redução dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada (TAG) avaliados pela Escala de Avaliação da Ansiedade de Hamilton (HAM-A) foi observada na primeira semana.

Em estudos clínicos controlados (4-8 semanas de duração), 52% dos pacientes tratados com pregabalina e 38% dos pacientes tratados com placebo tiveram no mínimo 50% de melhora ao final do tratamento em relação à linha de base (pré-tratamento), aferida pela diferença na pontuação segundo a Escala de Avaliação da Ansiedade de Hamilton, avaliada nestes dois momentos.

#### **Fibromialgia**

A eficácia, o perfil de segurança e a tolerância de pregabalina foram estabelecidos através dos seguintes estudos consistentes: um estudo duplo-cego, controlado com placebo e multicêntrico de 14 semanas, além de demonstrar a eficácia da pregabalina em fibromialgia, não constou a superioridade de 600 mg ao dia em relação a 450 mg ao dia. Além disso, foi observado um aumento de eventos adversos, diretamente proporcional ao aumento da dose. Em outro estudo, randomizado de 6 meses, avaliando a taxa de abandono do tratamento pela ineficácia ou pelo aparecimento de eventos adversos, 53% dos pacientes tratados com pregabalina tiveram uma redução significativa da dor e mantiveram a resposta terapêutica por 26 semanas de estudo, *versus* apenas 33% no grupo placebo. Alguns pacientes apresentaram uma redução da dor desde a primeira semana do tratamento e a eficácia se manteve ao longo do período do estudo. Além disso, o tratamento com pregabalina também proporcionou um período mais longo livre da dor em relação ao grupo placebo, fato evidenciado por vários instrumentos de avaliação da dor.

#### **Referências:**

- Bula Lyrica® publicada no Bulário eletrônico da Anvisa.
- Bula Lyrica® disponível no FDA.
- Product Information: LYRICA(R) oral capsules, pregabalin oral capsules. Pfizer, Inc, New York, NY, 2007. Doi: 10.1016/j.jpain.2008.03.013. Epub 2008 Jun 3.

- vanSeventer R, Feister HA, Young JP, et al: Efficacy and tolerability of twice-daily pregabalin for treating pain and related sleep interference in postherpetic neuralgia: a 13-week, randomized trial. *Curr Med Res Opin* 2006; 22(2):375-384.
- Dworkin RH, Corbin AE, Young JP, et al: Pregabalin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized, placebo-controlled trial. *Neurology* 2003; 60(8):1274-1283.
- Cardenas DD, Nieshoff EC, Suda K, et al: A randomized trial of pregabalin in patients with neuropathic pain due to spinal cord injury. *Neurology* 2013; 80(6):533-539.
- Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A, et al: Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. *Neurology* 2006; 67(10):1792-1800
- Arnold LM et al. A 14-week, randomized, double-blinded, placebo-controlled monotherapy trial of pregabalin in patients with fibromyalgia. *J Pain*. 2008 Sep;9(9):792-805.
- Crofford LJ et al. Fibromyalgia relapse evaluation and efficacy for durability of meaningful relief (FREEDOM): a 6-month, double-blind, placebo-controlled trial with pregabalin. *Pain*. 2008 Jun;136(3):419-31.

### 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

#### Propriedades Farmacodinâmicas

O ingrediente ativo, pregabalina (ácido (S)-3-(aminometil)-5-metil-hexanoico), é um análogo do ácido gama-aminobutírico (GABA).

#### Mecanismo de Ação

Estudos *in vitro* mostram que a pregabalina liga-se a uma sub-unidade auxiliar (proteína  $\alpha 2-\delta$ ) dos canais de cálcio voltagem-dependentes no sistema nervoso central, deslocando fortemente a [3H]-gabapentina.

Duas evidências indicam que a ligação da pregabalina ao sítio  $\alpha 2-\delta$  é necessária para a atividade analgésica e anticonvulsiva em modelos animais: (1) estudos com o enantiômero-R inativo e outros derivados estruturais da pregabalina e (2) estudos com a pregabalina em camundongos mutantes com ligação defeituosa do fármaco à proteína  $\alpha 2-\delta$ . Além disso, a pregabalina reduz a liberação de vários neurotransmissores, incluindo o glutamato, noradrenalina e substância P. O significado desses efeitos na farmacologia clínica da pregabalina não é conhecido.

A pregabalina não apresenta afinidade por sítios de receptor, nem altera respostas associadas à ação de vários medicamentos comuns no tratamento de crises epiléticas ou dor. A pregabalina não interage com qualquer receptor GABA-A ou GABA-B; não é convertida metabolicamente em GABA ou em agonista GABA; não é um inibidor da assimilação nem degradação do GABA.

A pregabalina inibe comportamentos relacionados à dor em modelos animais de dor neuropática e pós-cirúrgica, incluindo a hiperalgesia e a alodinia.

A pregabalina também é ativa em modelos animais de crises epiléticas, incluindo as tônicas do extensor por eletrochoque máximo em camundongos ou ratos, crises clônicas induzidas pelo pentilenotetrazol, crises comportamentais e eletrográficas em ratos com abrasamento hipocampal e crises tônico-clônicas em camundongos audiogênicos DBA/2. A pregabalina não reduz a incidência de crises espontâneas de ausência na Epilepsia Genética de Ausência em Ratos de Estrasburgo.

#### Propriedades Farmacocinéticas

A farmacocinética da pregabalina no estado de equilíbrio é semelhante em voluntários saudáveis, pacientes com epilepsia recebendo antiepiléticos e em pacientes com dor crônica.

#### Absorção

A pregabalina é rapidamente absorvida quando administrada em jejum, com o pico das concentrações plasmáticas ocorrendo dentro de uma hora após administração tanto de doses únicas como múltiplas. A biodisponibilidade oral da pregabalina foi estimada em  $\geq 90\%$ ,

sendo independente da dose. Após repetidas administrações, o estado de equilíbrio é alcançado dentro de 24 a 48 horas. O índice de absorção da pregabalina é reduzido quando administrado com alimentos, resultando numa diminuição da  $C_{\text{máx}}$  de aproximadamente 25-30% e retardo do  $T_{\text{máx}}$  em aproximadamente 2,5 horas. Entretanto, a administração de pregabalina com alimentos não apresenta efeito clinicamente significativo sobre o grau de absorção deste medicamento.

### **Distribuição**

Em estudos pré-clínicos, observou-se que a pregabalina atravessa a barreira hematoencefálica em camundongos, ratos e macacos. O fármaco demonstrou atravessar a placenta em ratas e está presente no leite de ratas lactantes. Em humanos, o volume aparente de distribuição após administração oral é de aproximadamente 0,56 L/kg. A pregabalina não se liga a proteínas plasmáticas.

### **Metabolismo**

A pregabalina sofre metabolismo desprezível em humanos. Após uma dose radiomarcada, aproximadamente 98% da radioatividade recuperada na urina foram da pregabalina inalterada. O derivado N-metilado da pregabalina, o principal metabólito encontrado na urina, foi responsável por 0,9% da dose. Em estudos pré-clínicos, não houve indicações de racemização do enantiômero S em enantiômero R da pregabalina.

### **Eliminação**

A pregabalina é eliminada da circulação sistêmica principalmente por excreção renal como fármaco inalterado.

A meia-vida de eliminação da pregabalina é de 6,3 horas. O *clearance* plasmático e o *clearance* renal são diretamente proporcionais ao *clearance* de creatinina (vide “Propriedades Farmacocinéticas – Farmacocinética em Grupos Especiais de Pacientes”).

É necessário o ajuste de dose em pacientes com função renal reduzida ou submetidos à hemodiálise (vide “Posologia – Tabela 2”).

### **Linearidade/não-linearidade**

A farmacocinética da pregabalina é linear na faixa de doses diárias recomendadas. A variabilidade entre indivíduos é baixa (< 20%). A farmacocinética das doses múltiplas é previsível a partir dos dados para dose única. Portanto, não há necessidade de monitoração de rotina das concentrações plasmáticas da pregabalina.

### **Farmacocinética em grupos especiais de pacientes**

#### **Raça**

A exposição ao fármaco pregabalina não é influenciada pela raça (caucasianos, negros, hispânicos e asiáticos).

#### **Sexo**

Estudos clínicos indicam que o sexo não tem influência clinicamente significativa sobre as concentrações plasmáticas da pregabalina.

#### **Insuficiência renal**

O *clearance* da pregabalina é diretamente proporcional ao *clearance* de creatinina. Além disso, a pregabalina é removida do plasma por hemodiálise de modo eficaz (após 4 horas de hemodiálise, as concentrações plasmáticas de pregabalina ficam reduzidas em aproximadamente 50%). Como a eliminação renal é a principal via de excreção, é necessária a redução da dose em pacientes com insuficiência renal e suplementação da dose após hemodiálise (vide “Posologia – Tabela 2”).

#### **Insuficiência hepática**

Nenhum estudo farmacocinético específico foi conduzido em pacientes com insuficiência hepática. Como a pregabalina não sofre metabolismo significativo, sendo excretada predominantemente como fármaco inalterado na urina, a insuficiência hepática não deve alterar significativamente as concentrações plasmáticas de pregabalina.

#### **Idosos (mais de 65 anos de idade)**

O *clearance* da pregabalina tende a diminuir com o avanço da idade. Esta diminuição no *clearance* da pregabalina oral está relacionada com as reduções no *clearance* de creatinina associadas à maior idade. Pode ser necessária redução na dose em pacientes com função renal comprometida devido à idade (vide “Posologia – Tabela 2”).

#### **4. CONTRAINDICAÇÕES**

Prebictal® (pregabalina) é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida à pregabalina ou a qualquer componente da fórmula.

**Prebictal® é um medicamento classificado na categoria de risco C na gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Pacientes com problemas hereditários raros de intolerância a galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de glicose-galactose não devem utilizar Prebictal® (pregabalina).

##### **Angioedema**

Houve relatos de pós-comercialização de angioedema em pacientes durante o tratamento inicial e crônico com pregabalina. Sintomas específicos incluem inchaço da face, boca (língua, lábios e gengivas) e do pescoço (garganta e laringe). Houve relatos de angioedema com risco de morte, com comprometimento respiratório que requereram tratamento de emergência. Prebictal® deve ser descontinuado imediatamente em pacientes com estes sintomas.

Devem ser tomadas precauções quando prescrever Prebictal® para pacientes que tiveram um episódio anterior de angioedema. Adicionalmente, os pacientes que estão em tratamento concomitante com outros medicamentos associados ao angioedema (por exemplo, inibidores da enzima conversora de angiotensina [inibidores da ECA]) podem estar em maior risco de desenvolver angioedema.

##### **Hipersensibilidade**

Houve relatos no período de pós-comercialização de hipersensibilidade em pacientes logo após o início do tratamento com Prebictal®. As reações adversas incluíram vermelhidão da pele, bolhas, urticária, prurido, dispneia e chiado no peito. Prebictal® deve ser descontinuado imediatamente em pacientes com estes sintomas.

Foram notificadas raramente reações adversas cutâneas graves (RACG), incluindo síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET), que podem ser potencialmente fatais em associação ao tratamento com pregabalina. No momento da prescrição, os pacientes devem ser orientados para os sinais e sintomas e cuidadosamente monitorados quanto a reações cutâneas. Se surgirem sinais e sintomas sugestivos destas reações, a pregabalina deve ser descontinuada imediatamente e um tratamento alternativo apropriado deve ser considerado.

##### **Retirada de drogas antiepilépticas (DAE)**

Tal como acontece com todas as drogas antiepilépticas, Prebictal® deve ser retirado gradualmente para minimizar o potencial aumento da frequência de crises convulsivas em pacientes com distúrbios convulsivos. Se Prebictal® for descontinuado, deve ser feito gradualmente durante um período mínimo de uma semana.

##### **Comportamento e ideação suicida**

Drogas antiepilépticas, incluindo Prebictal®, aumentam o risco de pensamentos ou comportamentos suicidas em pacientes que fazem uso destes medicamentos, independente da indicação. Os pacientes tratados com quaisquer drogas antiepilépticas para qualquer indicação devem ser monitorizados para o aparecimento ou agravamento da depressão, pensamentos ou comportamentos suicidas, e/ou quaisquer alterações incomuns no humor ou comportamento.

Meta-análises de 199 ensaios clínicos controlados com placebo (monoterapia e terapia adjuvante) de 11 drogas antiepilépticas diferentes mostraram que os pacientes randomizados para uma das drogas antiepilépticas tinham aproximadamente o dobro do risco (risco relativo ajustado 1.8, 95% CI: 1.2, 2.7) de pensamento ou comportamentos suicidas em comparação com pacientes randomizados para placebo. Nestes ensaios, que tiveram uma duração média do tratamento de 12 semanas, a taxa de incidência estimada de comportamento ou ideação suicida entre os 27.863 pacientes tratados com DAE foi de 0,43%, contra 0,24% entre os 16.029 pacientes tratados com placebo, o que representa um aumento de aproximadamente um caso de pensamentos ou de comportamentos suicidas para cada 530 pacientes tratados. Houve quatro suicídios em pacientes tratados com drogas nos ensaios e nenhum entre os pacientes tratados com placebo, mas o número é muito pequeno para permitir qualquer conclusão com relação ao efeito da droga sobre o suicídio. O aumento do risco de pensamentos ou comportamentos suicidas com DAE foi observado com uma semana após o início do tratamento com DAE e persistiu durante todo o período de tratamento avaliado. Uma vez que a maioria dos estudos incluídos na análise não se estendeu por mais de 24 semanas, o risco de pensamentos ou comportamentos suicidas além das 24 semanas não pôde ser avaliado. O risco de pensamentos ou comportamentos suicidas foi consistente entre os medicamentos nos dados analisados. O achado de maior risco com DAEs de diferentes mecanismos de ação e toda uma gama de indicações sugerem que o risco se aplica a todos os DAEs utilizados para qualquer indicação. O risco não variou substancialmente por idade (5-100 anos) nos ensaios clínicos analisados. A Tabela 1 apresenta o risco absoluto e relativo por indicação de todos os DAEs avaliados.

**Tabela 1. Risco por indicação de drogas antiepilépticas na análise conjunta**

| Indicação   | Pacientes tratados com placebo em eventos por 1000 pacientes | Pacientes tratados com DAE em eventos por 1000 pacientes | Risco relativo: Incidência de eventos em pacientes tratados com DAE/Incidência em pacientes tratados com placebo | Diferença do risco: Pacientes adicionais tratados com medicamentos em eventos por 1000 pacientes |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epilepsia   | 1.0                                                          | 3.4                                                      | 3.5                                                                                                              | 2.4                                                                                              |
| Psiquiatria | 5.7                                                          | 8.5                                                      | 1.5                                                                                                              | 2.9                                                                                              |
| Outros      | 1.0                                                          | 1.8                                                      | 1.9                                                                                                              | 0.9                                                                                              |
| Total       | 2.4                                                          | 4.3                                                      | 1.8                                                                                                              | 1.9                                                                                              |

O risco relativo de pensamentos ou comportamentos suicidas foi maior em ensaios clínicos para a epilepsia do que em ensaios clínicos para condições psiquiátricas ou outras, mas as diferenças de risco absoluto foram semelhantes para a epilepsia e indicações psiquiátricas.

Quando considerada a prescrição de Prebictal® ou qualquer outro DAE deve-se equilibrar o risco de pensamentos ou comportamentos suicidas com o risco de doença não tratada. Epilepsia e muitas outras doenças para as quais são prescritos DAE estão associadas com morbidade e mortalidade e um aumento do risco de pensamentos e comportamentos suicidas. Se pensamentos e comportamentos suicidas surgirem durante o tratamento, o médico deve considerar se o aparecimento desses sintomas em qualquer paciente pode estar relacionado com a doença a ser tratada.

Os pacientes, seus cuidadores e as famílias devem ser informados que DAEs aumentam o risco de pensamentos e comportamentos suicidas e devem ser advertidos sobre a necessidade de estar alerta para o surgimento ou piora dos sinais e sintomas de depressão, as alterações incomuns no humor ou comportamento, ou o surgimento de pensamentos ou comportamentos suicidas ou pensamentos sobre a automutilação. Comportamentos de preocupação deve ser imediatamente comunicado aos cuidadores e/ou médico.

## Edema periférico

O tratamento com Prebictal® pode causar edema periférico. Em ensaios de curta duração com pacientes sem doença cardíaca ou doença vascular periférica clinicamente significativa, não houve associação aparente entre edema periférico e complicações cardiovasculares, como a hipertensão ou insuficiência cardíaca congestiva. O edema periférico não foi associado a alterações laboratoriais sugestivas de deterioração da função renal ou hepática.

Em ensaios clínicos controlados, a incidência de edema periférico foi de 6% no grupo de pregabalina *versus* 2% no grupo de placebo. Em ensaios clínicos controlados, 0,5% dos pacientes tratados com pregabalina e 0,2% pacientes que receberam placebo foram retirados devido a edema periférico.

A elevada frequência de ganho de peso e edema periférico foram observados em pacientes que tomam conjuntamente pregabalina e o agente antidiabético tiazolidinedionas em comparação com os pacientes que tomam ambas as drogas isoladamente. A maioria dos pacientes que utilizam os agentes antidiabéticos de tiazolidinadiona, na base de dados de segurança global eram participantes de estudos de dor associada a neuropatia periférica diabética. Nesta população, edema periférico foi relatado em 3% (2/60) dos pacientes que estavam usando antidiabéticos tiazolidinadionas isoladamente, 8% (69/859) dos pacientes que foram tratados apenas com pregabalina, e 19% (23/120) dos pacientes que estavam sendo tratados com ambas as drogas, pregabalina e o antidiabético tiazolidinadiona. Da mesma forma, o ganho de peso foi relatado em 0% (0/60) dos pacientes tratados com tiazolidinadionas isoladamente; 4% (35/859) dos pacientes tratados com pregabalina isoladamente; e 7,5% (9/120) dos pacientes utilizando ambas as drogas.

A classe de drogas antidiabéticas das tiazolidinedionas pode causar ganho de peso e/ou retenção de líquidos, possivelmente, exacerbando ou levando a insuficiência cardíaca, deve ser tomado cuidado quando se coadministra pregabalina e estes agentes.

Uma vez que existem dados limitados sobre insuficiência cardíaca congestiva, em pacientes com estado cardíaco *New York Heart Association (NYHA)* classes III ou IV, pregabalina deve ser usada com precaução.

### **Distúrbios respiratórios**

Houve notificações de depressão respiratória grave em relação ao uso de pregabalina. Pacientes com função respiratória comprometida, doença respiratória ou neurológica, insuficiência renal, uso concomitante de depressores do SNC e idosos podem ter maior risco de apresentar esta reação adversa grave. Podem ser necessários ajustes de doses nestes pacientes (vide “Posologia – Tabela 2”).

### **Tonturas e sonolência**

Prebictal® pode causar tonturas e sonolência. Os pacientes devem ser informados que a tontura e sonolência relacionadas ao uso de Prebictal® podem prejudicar a sua capacidade de executar tarefas como dirigir ou operar máquinas.

Nos ensaios controlados com pregabalina, 31% dos pacientes tratados com pregabalina tiveram tontura, em comparação com 9% dos pacientes tratados com placebo; sonolência foi experimentada por 22% dos pacientes tratados com pregabalina em comparação com 7% dos pacientes tratados com placebo. Tonturas e sonolência começam geralmente logo após o início da terapia com pregabalina e ocorreram mais frequentemente com doses mais elevadas. Tonturas e sonolência foram as reações adversas que mais frequentemente levaram à suspensão do medicamento (4% cada) nos estudos controlados. Nos pacientes tratados com pregabalina relatando essas reações adversas em curto prazo, nos estudos controlados, a tontura persistiu até a última dose em 30% e sonolência persistiu até a última dose em 42% dos pacientes.

### **Ganho de peso**

Tratamento com pregabalina pode causar ganho de peso. Em ensaios clínicos controlados com pregabalina de até 14 semanas, um ganho de 7% ou mais em peso de linha de base foi observado em 9% de pacientes tratados com pregabalina e 2% dos pacientes tratados com placebo. Poucos pacientes tratados com pregabalina (0,3%) foram retirados dos estudos controlados devido ao ganho de peso. O ganho de peso associado à pregabalina foi relacionado com a dose e o tempo de exposição, mas não parece estar associado com a linha de base do IMC, sexo ou idade. O ganho de peso não foi limitado a pacientes com edema (vide “Advertências e Precauções”).

Embora o ganho de peso não estar associado a alterações clinicamente importantes na pressão arterial em estudos controlados de curto prazo, os efeitos cardiovasculares a longo prazo de ganho de peso associado à pregabalina são desconhecidos.

Entre os diabéticos, os pacientes tratados com pregabalina ganharam uma média de 1,6 kg (variando de -16 a 16 kg), em comparação com uma média de 0,3 kg (variação: -10 a 9 kg), ganho de peso em pacientes tratados com placebo. Em uma coorte de 333 pacientes diabéticos que receberam pregabalina por pelo menos 2 anos, o ganho de peso foi de 5,2 kg.

Embora os efeitos do ganho de peso associado à pregabalina no controle glicêmico não terem sido avaliados sistematicamente em ensaios clínicos controlados e abertos de longo prazo com pacientes diabéticos, o tratamento com pregabalina não pareceu estar associado à perda do controle glicêmico (medida pelo HbA1C).

### **Interrupção abrupta ou rápida**

Após a interrupção abrupta ou rápida de pregabalina, alguns pacientes relataram sintomas como insônia, náusea, ansiedade, dor de cabeça e diarreia. Há relato, na literatura científica, de encefalopatia associada à retirada abrupta de pregabalina. A dose de Prebictal® deve ser gradualmente reduzida ao longo de no mínimo uma semana, em vez de interrompido abruptamente.

### **Potencial oncogênico**

Em estudos padrão pré-clínicos de carcinogenicidade ao longo da vida *in vivo* de pregabalina, uma inesperada alta incidência de hemangiossarcoma foi identificada em duas linhagens diferentes de camundongos. O significado clínico deste achado é desconhecido. A experiência clínica durante a pré-comercialização do produto não fornece meios diretos para avaliar seu potencial para induzir tumores em seres humanos.

Em estudos clínicos com vários grupos de pacientes, abrangendo 6.396 pacientes/ano de exposição em pacientes > 12 anos de idade, o aparecimento ou agravamento de tumores pré-existentes foram relatados em 57 pacientes. Sem o conhecimento da incidência de base e recorrência em populações semelhantes não tratadas com pregabalina, é impossível saber se a incidência observada nestes grupos é ou não é afetada pelo tratamento.

### **Efeitos oftalmológicos**

Em estudos controlados, uma maior proporção de pacientes tratados com pregabalina notificou visão turva (7%) do que os pacientes tratados com placebo (2%), o que se resolveu, na maioria dos casos, com a continuação da terapêutica. Menos de 1% dos pacientes interromperam o tratamento devido aos eventos adversos relacionados com a visão (visão turva, principalmente).

Teste oftalmológico prospectivamente planejado, incluindo o teste de acuidade visual, teste do campo visual formal e exame de fundo de olho dilatado, foram realizados em mais de 3.600 pacientes. Nestes pacientes, a acuidade visual foi reduzida em 7% dos pacientes tratados com pregabalina e 5% dos pacientes tratados com placebo. Alterações do campo visual foram detectadas em 13% dos pacientes tratados com pregabalina e 12% dos pacientes tratados com placebo. Alterações de retina foram observadas em 2% dos pacientes tratados com pregabalina e 2% dos pacientes tratados com placebo.

Embora o significado clínico dos achados oftalmológicos seja desconhecido, os pacientes devem ser informados de que, se ocorrerem alterações na visão, seu médico deverá ser informado. Se o distúrbio visual persistir, uma avaliação adicional deve ser considerada. Uma avaliação mais frequente deve ser considerada para pacientes que já são monitorados rotineiramente para condições oculares.

### **Exames laboratoriais:**

#### Elevações de creatina quinase

O tratamento com pregabalina foi associado a elevações da creatina quinase. Alterações médias na creatina quinase da linha de base para o valor máximo foi de 60 U/L para os pacientes tratados com pregabalina e 28 U/L para os pacientes tratados com placebo. Em todos os ensaios clínicos em várias populações de pacientes, 1,5% dos pacientes tratados com pregabalina e 0,7% dos pacientes tratados com placebo tinham um valor de creatina quinase, pelo menos, três vezes o limite superior normal. Três sujeitos tratados com pregabalina relataram eventos como rabdomiólise em ensaios clínicos pré-comercialização. A relação entre esses eventos de miopatia e pregabalina não é completamente compreendida, porque os casos documentados tinham fatores que podem ter causado ou contribuído para a ocorrência destes eventos. Os prescritores devem instruir os pacientes a relatar imediatamente dor muscular inexplicável, sensibilidade ou fraqueza, especialmente se estes sintomas musculares são acompanhados de mal-estar ou febre. O tratamento com

pregabalina deve ser descontinuado se miopatia ou suspeita de miopatia forem diagnosticadas ou se ocorrerem níveis acentuadamente elevados de creatina quinase.

#### Diminuição da contagem de plaquetas

O tratamento com pregabalina foi associado com uma diminuição na contagem de plaquetas. Indivíduos tratados com pregabalina experimentaram um decréscimo máximo significativo na contagem de plaquetas de  $20 \times 10^3/\mu\text{L}$ , em comparação com  $11 \times 10^3/\mu\text{L}$  em pacientes tratados com placebo. Na base de dados global de ensaios controlados, 2% de pacientes tratados com placebo e 3% dos pacientes tratados com pregabalina experimentaram uma diminuição clínica potencialmente significativa do número de plaquetas, definido como 20% abaixo do valor da linha de base e  $< 150 \times 10^3/\mu\text{L}$ . Um único paciente tratado com pregabalina desenvolveu uma trombocitopenia grave, com uma contagem de plaquetas inferior a  $20 \times 10^3/\text{mL}$ . Em ensaios clínicos randomizados, Prebictal® não foi associado a um aumento de reações adversas relacionadas com sangramento.

#### Prolongamento do intervalo PR

O tratamento com pregabalina foi associado com prolongamento do intervalo PR. Em análise de dados de estudos clínicos de ECG, a média de aumento do intervalo de PR foi de 3-6 ms em doses de pregabalina  $\geq 300$  mg/dia. Essa diferença significa que a mudança não foi associada a um elevado risco de aumento de PR  $\geq 25\%$  da linha de base, uma elevação da percentagem de indivíduos com PR durante o tratamento  $> 200$  ms, ou um aumento do risco de reações adversas de bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau. As análises de subgrupos não identificaram um aumento do risco de prolongamento do intervalo PR em pacientes com valores basais prolongados de PR ou em pacientes tomando outros medicamentos para prolongamento do PR. No entanto, estas análises não podem ser consideradas definitivas devido ao número limitado de pacientes nestas categorias.

#### **Gravidez e lactação**

Não há dados adequados sobre o uso de pregabalina em mulheres grávidas.

Estudos em animais mostraram toxicidade reprodutiva (vide “Dados de Segurança Pré-Clínicos”). O risco potencial a seres humanos é desconhecido. Portanto, Prebictal® não deve ser utilizado durante a gravidez, a menos que o benefício à mãe justifique claramente o risco potencial ao feto. Métodos contraceptivos eficazes devem ser utilizados por mulheres com potencial de engravidar.

**Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Não se sabe se a pregabalina é excretada no leite materno de humanos. Entretanto, está presente no leite de ratas. Portanto, a amamentação não é recomendada durante o tratamento com Prebictal®.

**Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano. Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois pode ser excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.**

#### **Efeitos sobre a habilidade de dirigir e operar máquinas**

Prebictal® pode produzir tontura e sonolência que, portanto, podem prejudicar a habilidade de dirigir e operar máquinas. Os pacientes devem ser aconselhados a não dirigir, operar máquinas complexas, ou se engajar em outras atividades potencialmente perigosas até que se saiba se este medicamento afeta a sua capacidade de executar tais atividades.

**Orientar seu paciente a não dirigir veículos ou operar máquinas no início do tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas. O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.**

### **Populações especiais**

O tratamento com Prebictal® está associado com tontura e sonolência, que pode aumentar a ocorrência de acidentes (queda) na população idosa. Houve também relatos de perda de consciência, confusão e dano mental. Portanto, pacientes devem ser alertados para terem cautela até que os efeitos potenciais de Prebictal® sejam familiares.

Embora os efeitos da descontinuação sobre a reversibilidade da insuficiência renal não tenham sido sistematicamente estudados, foi relatada melhora da função renal após a descontinuação ou redução da dose de pregabalina.

### **Teratogenicidade**

A pregabalina não foi teratogênica em camundongos, ratos ou coelhos. A toxicidade fetal em ratos e coelhos ocorreu somente em exposições suficientemente acima da exposição humana. Em estudos de toxicidade pré e pós-natal, a pregabalina induziu toxicidade no desenvolvimento da cria em ratos, com exposições > 2 vezes a exposição máxima recomendada para humanos.

### **Mutagenicidade**

A pregabalina não é genotóxica, baseando-se nos resultados de uma bateria de testes *in vitro* e *in vivo*.

### **Carcinogenicidade**

Estudos de carcinogenicidade de 2 anos com pregabalina foram realizados com ratos e camundongos. Nenhum tumor foi observado em ratos expostos a até 24 vezes o valor médio da exposição humana na dose clínica máxima recomendada de 600 mg/dia. Em camundongos, não houve aumento da incidência de tumores com exposições semelhantes a média da exposição humana, mas observou-se um aumento da incidência de hemangiosarcoma com altas exposições. O mecanismo não-genotóxico da pregabalina de indução de formação de tumores em camundongos envolve alterações plaquetárias associadas à proliferação de células endoteliais. Estas alterações plaquetárias não estavam presentes em ratos ou seres humanos baseado em dados clínicos a curto prazo ou longo prazo limitado. Não há evidências sugerindo risco a seres humanos.

Em ratos jovens a toxicidade não diferiu qualitativamente da observada em ratos adultos. Entretanto, os ratos jovens foram mais sensíveis. Em exposições terapêuticas houve evidência de sinais clínicos de hiperatividade do SNC e bruxismo e algumas alterações no crescimento (supressão transitória do ganho de peso corporal). Foi observado efeito sobre o ciclo do oístris (período fértil) com 5 vezes a exposição terapêutica humana.

Efeitos neurocomportamentais/cognitivos foram observados em ratos jovens 1-2 semanas após a exposição > 2 vezes (resposta acústica de sobressalto) ou > 5 vezes (aprendizado/memória) a exposição terapêutica humana. Resposta acústica de sobressalto reduzida foi observada em ratos jovens, 1-2 semanas após exposição > 2 vezes a exposição terapêutica humana. Nove semanas após a exposição, este efeito não foi mais observado.

### **Dados de segurança pré-clínicos**

Em estudos convencionais de segurança farmacológica em animais, a pregabalina foi bem tolerada nas doses clinicamente relevantes. Em estudos de toxicidade das doses repetidas em ratos e macacos, foram observados efeitos no SNC, incluindo hipoatividade, hiperatividade e ataxia. Foi comumente observado um aumento da incidência de atrofia retinal em ratos albinos com idade avançada após exposições prolongadas à pregabalina em doses  $\geq 5$  vezes a média de exposição humana na dose clínica máxima recomendada.

**Atenção: Contém lactose monoidratada (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/cápsula dura, e o corante dióxido de titânio.**

**Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

**Informe a seu paciente que a doação de sangue é absolutamente contraindicada durante o tratamento com pregabalina devido ao dano que esse medicamento pode causar ao receptor.**

## **6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

A pregabalina provavelmente não produzirá, nem estará sujeita, a interações farmacocinéticas, uma vez que é predominantemente excretada inalterada na urina, sofre metabolismo desprezível em humanos (< 2% de uma dose recuperada na urina como metabólitos), não inibe o metabolismo de fármacos *in vitro* e nem se liga a proteínas plasmáticas.

Do mesmo modo, em estudos *in vivo*, nenhuma interação farmacocinética clinicamente relevante foi observada entre a pregabalina e a fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, gabapentina, lorazepam, oxicodona ou etanol. Além disso, a análise farmacocinética populacional indicou que hipoglicemiantes orais, diuréticos, insulina, fenobarbital, tiagabina e topiramato não tiveram efeito clinicamente significativo sobre o *clearance* da pregabalina.

A coadministração de pregabalina com os contraceptivos orais noretisterona e/ou etinilestradiol não influencia a farmacocinética de qualquer um dos agentes no estado de equilíbrio. A pregabalina pode potencializar os efeitos do etanol e lorazepam.

Em estudos clínicos controlados, doses orais múltiplas de pregabalina coadministradas com oxicodona, lorazepam ou etanol não resultaram em efeitos clinicamente importantes sobre a respiração. Houve relatos de insuficiência respiratória e coma em pacientes em tratamento com pregabalina e outros medicamentos depressores do SNC. A pregabalina parece ser aditiva no prejuízo da função cognitiva e coordenação motora grosseira causado pela oxicodona.

Há relatos de eventos relacionados à redução da função do trato gastrointestinal inferior (por ex., obstrução intestinal, íleo paralítico, constipação) quando a pregabalina foi coadministrada com medicamentos que têm o potencial para produzir constipação, tais como analgésicos opioides.

Não foram conduzidos estudos de interação farmacodinâmica específica em voluntários idosos.

## **7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

Prebictal® (pregabalina) apresenta prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação, devendo ser armazenado em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **Características físicas e organolépticas**

A cápsula dura de Prebictal® 50 mg é de cor branca contendo um granulado de coloração branca.

## **8. POSOLOGIA E MODO DE USAR**

### **Dor neuropática**

Neuropatia periférica diabética: A dose recomendada de Prebictal® (pregabalina) para tratamento de dor neuropática associada à neuropatia periférica diabética é de, no máximo, 100 mg três vezes ao dia (300 mg/dia) em pacientes com *clearance* de creatinina (CL<sub>cr</sub>) de pelo menos 60 mL/min. A titulação de dose deve iniciar com 50 mg três vezes ao dia (150 mg/dia) e pode ser aumentada para 300 mg/dia dentro de uma semana, dependendo da eficácia e tolerância. Doses acima de 300 mg/dia não são recomendadas devido aos eventos adversos dose-dependentes e nenhum benefício significativo adicional foi demonstrado durante estudos clínicos usando dose de 600 mg/dia.

Neuralgia pós-herpética: A dose recomendada de Prebictal®, para tratamento de neuralgia pós-herpética é de 75 mg a 150 mg duas vezes ao dia ou 50 mg a 100 mg três vezes ao dia (150 a 300 mg/dia) em pacientes com CL<sub>cr</sub> de, pelo menos, 60 mL/min. A dose inicial

deve ser de 75 mg duas vezes ao dia ou 50 mg três vezes ao dia (150 mg/dia) e pode ser aumentada para 300 mg/dia, dentro da primeira semana, dependendo da eficácia e tolerância. Pacientes que não tiverem alívio da dor, depois de 2 a 4 semanas de tratamento com 300 mg/dia e capazes de tolerar doses maiores de pregabalina, podem ser tratados com uma dose de até 300 mg duas vezes ao dia ou 200 mg três vezes ao dia (600 mg/dia). Dosagens acima de 300 mg/dia devem ser reservadas apenas para aqueles com dores refratárias a doses menores e que estejam tolerando a dose de 300 mg, porque os eventos adversos são dose-dependentes e a taxa de descontinuação por eventos adversos é maior.

**Lesão medular:** A dose recomendada para tratamento de dor neuropática associada à lesão medular é de 150 a 600 mg/dia. A dose inicial recomendada é de 75 mg duas vezes ao dia. As doses podem ser aumentadas a 150 mg duas vezes ao dia dentro de uma semana, dependendo da eficácia e tolerância. As doses podem ainda ser aumentadas para 300 mg duas vezes ao dia se não houver alívio da dor depois de 2 a 3 semanas de tratamento.

### **Epilepsia**

A dose inicial recomendada de pregabalina, como um adjuvante ao tratamento de crises parciais, não deve ultrapassar de 75 mg duas vezes ao dia ou 50 mg três vezes ao dia (150 mg/dia). A depender da resposta individual e da tolerância dos pacientes, a dose pode ser aumentada para, no máximo, 600 mg/dia dividida em duas ou três tomadas. A eficácia de pregabalina quando usada em adição a gabapentina não foi avaliada em estudos clínicos controlados. Portanto, não há recomendação para uso de pregabalina em adição a gabapentina. Para pacientes com crises refratárias a outros agentes anticonvulsivantes, o uso de pregabalina 150 a 600 mg/dia como adjuvante, em duas ou três tomadas, tem sido efetivo.

### **Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)**

A dose varia de 150 a 600 mg/dia, divididas em duas ou três doses. A necessidade para o tratamento deve ser reavaliada regularmente. A dose inicial eficaz recomendada de Prebictal® é de 75 mg duas vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem alimentos. Em estudos clínicos, a eficácia de pregabalina foi demonstrada em pacientes que receberam uma faixa de 150 a 600 mg/dia. Com base na resposta e tolerância individuais do paciente, a dose pode ser aumentada para 300 mg ao dia após uma semana. Depois de mais uma semana a dose pode ser aumentada para 450 mg ao dia. A dose máxima de 600 mg ao dia pode ser atingida após mais uma semana. Em um estudo, onde a retirada do medicamento foi realizada num período de, pelo menos, uma semana, após um tratamento de 4 semanas, não foram observados sinais de síndrome de abstinência. No entanto, em outros dois estudos semelhantes, sintomas de abstinência foram observados em pacientes tomando 600 mg/dia de pregabalina.

### **Fibromialgia**

A dose recomendada de Prebictal® é de 300 a 450 mg/dia. A dose deve ser iniciada com 75 mg duas vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem alimentos, e a dose pode ser aumentada para 150 mg duas vezes ao dia (300 mg/dia) em uma semana baseado na eficácia e tolerância individuais. Pacientes que não experimentaram benefícios suficientes com uma dose de 300 mg/dia podem ter a dose aumentada para 225 mg duas vezes ao dia (450 mg/dia). Não há evidência de benefícios adicionais com doses acima de 450 mg/dia. Além disso, eventos adversos dose-dependentes foram observados em estudos clínicos.

### **Descontinuação do tratamento**

Se Prebictal® for descontinuado, recomenda-se que isto seja feito gradualmente durante no mínimo uma semana.

### **Uso em pacientes com insuficiência renal**

A redução da dosagem em pacientes com a função renal comprometida deve ser individualizada de acordo com o *clearance* de creatinina ( $CL_{cr}$ ) (vide “Propriedades Farmacocinéticas – Farmacocinética em Populações Específicas de Pacientes - Insuficiência Renal”), conforme indicado na Tabela 2, utilizando a seguinte fórmula:

$$CL_{cr} \text{ (mL/min)} = \frac{[140 - \text{idade (anos)}] \times \text{peso (kg)} \times 0,85 \text{ para mulheres}}{72 \times \text{creatinina s rica (mg/dL)}}$$

Para pacientes submetidos   hemodi lise, a dose di ria de Prebictal<sup> </sup> deve ser ajustada com base na fun  o renal. Al m da dose di ria, uma dose suplementar deve ser administrada imediatamente ap s cada tratamento de 4 horas de hemodi lise (vide Tabela 2).

**Tabela 2. Ajuste da dose de Prebictal<sup> </sup> baseado na fun  o renal**

| Clearance de creatinina (CL <sub>cr</sub> ) (mL/min) | Dose di ria total de Prebictal <sup> </sup> (1) |                      | Regime terap utico  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      | Dose inicial (mg/dia)                           | Dose m xima (mg/dia) |                     |
|  60                                                  | 150                                             | 600                  | 2 ou 3 vezes ao dia |
|  30 - <60                                            | 75                                              | 300                  | 2 ou 3 vezes ao dia |
|  15 - <30                                            | 25 - 50                                         | 150                  | 1 ou 2 vezes ao dia |
| <15                                                  | 25                                              | 75                   | 1 vez ao dia        |
| Dosagem complementar ap s hemodi lise (mg)           |                                                 |                      |                     |
|                                                      | 25                                              | 100                  | Dose  nica (2)      |

(1) A dose di ria total (mg/dia) deve ser dividida conforme indicado pelo regime terap utico.

(2) Dose suplementar   uma dose  nica adicional.

#### Uso em pacientes com insufici ncia hep tica

Nenhum ajuste de dose   necess rio para pacientes com insufici ncia hep tica (vide “Propriedades Farmacocin ticas – Farmacocin tica em Grupos Especiais de Pacientes – Insufici ncia Hep tica”).

#### Uso em crian as

A seguran a e a efic cia de pregabalina em pacientes pedi tricos abaixo de 12 anos de idade ainda n o foram estabelecidas.

O uso em crian as n o   recomendado.

#### Uso em adolescentes (12 a 17 anos de idade)

A seguran a e a efic cia de pregabalina em pacientes abaixo de 18 anos de idade n o foram estabelecidas.

#### Uso em pacientes idosos (acima de 65 anos de idade)

Pacientes idosos podem necessitar de redu  o da dose de Prebictal<sup> </sup> devido   diminui  o da fun  o renal (vide “Propriedades Farmacocin ticas – Farmacocin tica em Grupos Especiais de Pacientes – Idosos (mais de 65 anos de idade)”).

#### Dose omitida

Caso o paciente esque a de tomar Prebictal<sup> </sup> no hor rio estabelecido, deve tom -lo assim que lembrar. Entretanto, se j  estiver perto do hor rio de tomar a pr xima dose, deve desconsiderar a dose esquecida e tomar a pr xima. Neste caso, o paciente n o deve tomar a dose duplicada para compensar doses esquecidas.

O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## 9. REAÇÕES ADVERSAS

O programa clínico de pregabalina envolveu mais de 12.000 pacientes expostos à pregabalina, dos quais mais de 7.000 participaram de estudos duplo-cegos, placebo-controlados. As reações adversas mais frequentemente notificadas foram tontura e sonolência. As reações adversas foram, em geral, de intensidade leve a moderada. Em todos os estudos controlados, o índice de descontinuação devido a eventos adversos foi de 14% para pacientes recebendo pregabalina e de 5% para pacientes recebendo placebo. As reações adversas mais comuns que resultaram em descontinuação nos grupos de tratamento com pregabalina foram tontura e sonolência.

Na tabela a seguir, todas as reações adversas, ocorridas numa incidência maior do que o placebo e em mais de um paciente estão listadas, por classe e frequência: Reações muito comuns ocorreram com uma frequência  $> 1/10$  ( $> 10\%$ ), as comuns entre  $> 1/100$  e  $\leq 1/10$  ( $> 1\%$  e  $\leq 10\%$ ), as incomuns entre  $> 1/1.000$  e  $\leq 1/100$  ( $> 0,1\%$  e  $\leq 1\%$ ) e as raras entre  $> 1/10.000$  e  $\leq 1/1.000$  ( $> 0,01\%$  e  $\leq 0,1\%$ ).

As reações adversas listadas poderão estar associadas a doenças subjacentes e/ou ao uso de medicamentos concomitantes.

| Sistema Corporal                  | Reações Adversas ao Medicamento                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infecções e infestações</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comum                             | nasofaringite                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sangue e sistema linfático</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raros                             | neutropenia                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Metabólicos e nutricionais</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comuns                            | aumento de apetite                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Incomuns                          | anorexia                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raros                             | hipoglicemia                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Psiquiátricos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comuns                            | humor eufórico, confusão, diminuição da libido, irritabilidade, desorientação, insônia                                                                                                                                                                                |
| Incomuns                          | despersonalização, anorgasmia, inquietação, depressão, agitação, mudanças de humor (por exemplo: agressividade), exacerbação de insônia, humor deprimido, dificuldade de encontrar palavras, alucinações, sonhos anormais, aumento da libido, crise de pânico, apatia |
| Raros                             | desinibição, humor elevado                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sistema Nervoso</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muito comuns                      | tontura, sonolência                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comuns                            | ataxia, distúrbios de atenção, coordenação anormal, dificuldade de memória, tremores, disartria, parestesia, amnésia, sedação, letargia, dor de cabeça                                                                                                                |
| Incomuns                          | distúrbios cognitivos, hipoestesia, nistagmo, distúrbios da fala, mioclonia, hiporreflexia, discinesia, hiperatividade psicomotora, vertigem postural, hiperestesia, ageusia, sensação de queimação, tremor de intenção, estupor, síncope                             |

|                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raros                                          | hipocinesia, parosmia, disgrafia                                                                                                                         |
| <b>Oftalmológicos</b>                          |                                                                                                                                                          |
| Comuns                                         | visão turva, diplopia                                                                                                                                    |
| Incomuns                                       | alteração visual, deficiência no campo visual, olhos secos, inchaço ocular, redução da acuidade visual, dor ocular, astenopia, aumento do lacrimejamento |
| Raros                                          | fotopsia, irritação ocular, midríase, oscilopsia, percepção visual de profundidade alterada, perda de visão periférica, estrabismo, brilho visual        |
| <b>Auditivos e de labirinto</b>                |                                                                                                                                                          |
| Comuns                                         | vertigem                                                                                                                                                 |
| Raros                                          | hiperacusia                                                                                                                                              |
| <b>Cardíacos</b>                               |                                                                                                                                                          |
| Incomuns                                       | bloqueio atrioventricular de primeiro grau, taquicardia                                                                                                  |
| Raros                                          | taquicardia sinusal, arritmia sinusal, bradicardia sinusal                                                                                               |
| <b>Vasculares</b>                              |                                                                                                                                                          |
| Incomuns                                       | rubores, ondas de calor, hipotensão arterial, hipertensão arterial, frio nas extremidades                                                                |
| <b>Respiratórios, torácicos e mediastinais</b> |                                                                                                                                                          |
| Comuns                                         | síndrome gripal                                                                                                                                          |
| Incomuns                                       | dispneia, tosse, secreta nasal                                                                                                                           |
| Raros                                          | congestão nasal, epistaxe, rinite, coriza, aperto na garganta                                                                                            |
| <b>Gastrointestinais</b>                       |                                                                                                                                                          |
| Comuns                                         | boca seca, constipação, vômitos, flatulência, distensão abdominal                                                                                        |
| Incomuns                                       | hipersecreção salivar, refluxo gastroesofágico, hipoestesia oral                                                                                         |
| Raros                                          | ascite, disfagia, pancreatite                                                                                                                            |
| <b>Pele e tecido subcutâneo</b>                |                                                                                                                                                          |
| Incomuns                                       | sudorese, erupções cutâneas papulares ( <i>rash</i> papular)                                                                                             |
| Raros                                          | suor frio, urticária, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica                                                                           |
| <b>Musculoesqueléticos e tecido conjuntivo</b> |                                                                                                                                                          |
| Comuns                                         | fraqueza muscular                                                                                                                                        |
| Incomuns                                       | contração muscular, inchaço articular, espasmo muscular, mialgia, artralgia, dor lombar, dor nos membros, rigidez muscular                               |
| Raros                                          | espasmo cervical, dor cervical, rabdomiólise                                                                                                             |
| <b>Renais e urinários</b>                      |                                                                                                                                                          |
| Incomuns                                       | disúria, incontinência urinária                                                                                                                          |
| Raros                                          | oligúria, insuficiência renal                                                                                                                            |
| <b>Sistema reprodutor e mama</b>               |                                                                                                                                                          |
| Comuns                                         | disfunção erétil                                                                                                                                         |
| Incomuns                                       | retardo na ejaculação, disfunção sexual                                                                                                                  |
| Raros                                          | amenorreia, dor mamária, secreção de mama, dismenorreia, hipertrofia de mama                                                                             |
| <b>Gerais</b>                                  |                                                                                                                                                          |

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comuns                      | fadiga, edema periférico, sensação de embriaguez, edema, marcha anormal, sensação anormal                                                         |
| Incomuns                    | astenia, quedas, sede, aperto no peito, edema generalizado, dor, calafrio                                                                         |
| Raros                       | pirexia                                                                                                                                           |
| <b>Exames laboratoriais</b> |                                                                                                                                                   |
| Comuns                      | aumento de peso                                                                                                                                   |
| Incomuns                    | elevação das enzimas: alanina aminotransferase, creatinafosfoquinase sanguínea e aspartato aminotransferase e diminuição da contagem de plaquetas |
| Raros                       | elevação da glicose sanguínea, elevação da creatinina sanguínea, diminuição do potássio sanguíneo, diminuição de peso, diminuição de leucócitos   |

As seguintes reações adversas foram relatadas após o uso da pregabalina (com frequência desconhecida):

**Sistema imune:** angioedema, reação alérgica, hipersensibilidade.

**Sistema nervoso:** perda de consciência, prejuízo mental, encefalopatia.

**Cardíacos:** insuficiência cardíaca congestiva.

**Oftalmológicos:** ceratite.

**Gastrointestinais:** edema de língua, diarreia, náusea.

**Geral:** mal-estar, ideação suicida.

**Pele e tecido subcutâneo:** inchaço da face, prurido.

**Renais e urinários:** retenção urinária.

**Respiratórios, torácicos e mediastinais:** edema pulmonar, depressão respiratória.

#### **Idosos (acima de 65 anos de idade)**

Num total de 998 pacientes idosos, não foram observadas diferenças quanto à segurança geral, em comparação aos pacientes com menos de 65 anos de idade.

**Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.**

#### **10. SUPERDOSE**

Em superdoses de até 15 g, nenhuma reação adversa inesperada foi notificada.

Os eventos adversos mais comumente relatados quando houve superdosagem de pregabalina incluem distúrbios afetivos, sonolência, estado de confusão, depressão, agitação e inquietação. Há relato, na literatura científica, de encefalopatia associada a superdosagem de pregabalina. O tratamento da superdose com Prebictal® deve incluir medidas gerais de suporte, podendo ser necessária hemodiálise (vide “Posologia – Tabela 2”).

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.2214.0092

**Registrado e produzido por:**

Adium S.A.

Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 3.400

Pindamonhangaba – SP

CNPJ 55.980.684/0001-27

**SAC: 0800 016 6575**

**[www.adium.com.br](http://www.adium.com.br)**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DE RECEITA.**

**Esta bula foi aprovada na Anvisa em 13/02/2026.**



VPS 0031/06

### Histórico de Alteração da Bula<sup>20</sup>

| Dados da submissão eletrônica |                  |                                                                                                        | Dados da petição/notificação que altera bula |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                           |                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº do expediente | Assunto                                                                                                | Data do expediente                           | Nº do expediente | Assunto                                                                                                                                                                                                                                                 | Data de aprovação | Itens de bula <sup>21</sup>                                                                                                             | Versões (VP/VPS) <sup>2</sup> | Apresentações relacionadas <sup>23</sup>                                           |
| 13/02/2015                    | 140755/15-4      | 10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12                               | NA                                           | NA               | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | NA                | Inclusão Inicial                                                                                                                        | VP/VPS: 349074.00             | 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 |
| 30/11/2015                    | 1037996/15-7     | 10451 - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                                          | 28/09/2015                                   | 0869179/15-7     | Alteração de local de fabricação do medicamento de liberação convencional com prazo de análise, com mudança múltipla paralela: Inclusão de tamanho de lote em até 10 vezes com alteração de equipamento com mesmo desenho e princípio de funcionamento. | 26/10/2015        | Dizeres Legais                                                                                                                          | VP/VPS: 349079.00             | 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 |
| 18/11/2020                    | 4062725/20-0     | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | NA                                           | NA               | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/11/2020        | 9. REAÇÕES ADVERSAS                                                                                                                     | VPS: 349079.00                | 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 |
| 02/08/2021                    | 3008881/21-1     | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | NA                                           | NA               | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/08/2021        | 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?<br><br>DIZERES LEGAIS | VP 0011/01                    | 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 |

|            |              |                                                                                                           |            |              |                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                           |            |              |                                                                                                           |            | 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES<br><br>9. REAÇÕES ADVERSAS<br><br>DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                           | VPS<br>0011/01                  |                                                                                                |
| 18/02/2022 | 0595947/22-1 | 10451 -<br>MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | 20/07/2021 | 2819868/21-9 | 11098 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de nova apresentação restrita ao número de unidades farmacotécnicas | 20/09/2021 | APRESENTAÇÕES<br>(criação de novo código de bula)                                                                                                                                                                                       | VP<br>0031/01<br>VPS<br>0031/01 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 21/02/2022 | 0631697/22-5 | 10451 -<br>MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | 20/07/2021 | 2819868/21-9 | 11098 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de nova apresentação restrita ao número de unidades farmacotécnicas | 20/09/2021 | DIZERES LEGAIS<br>Correção da data de aprovação da bula pela Anvisa                                                                                                                                                                     | VP<br>0031/01<br>VPS<br>0031/01 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 29/04/2022 | 2638572/22-5 | 10451 -<br>MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | NA         | NA           | NA                                                                                                        | 29/04/2022 | <u>Bula do Paciente</u><br>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?<br><u>Bula do Profissional de Saúde</u><br>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES<br>9. REAÇÕES ADVERSAS | VP<br>0031/02<br>VPS<br>0031/02 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 12/01/2023 | 0035157/23-2 | 10451 -<br>MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | 12/01/2023 | 0032726/23-3 | 11005 - RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de razão social do local de fabricação do medicamento              | 12/01/2023 | DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                          | VP<br>0031/03<br>VPS<br>0031/03 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |

|            |              |                                                                                                                          |            |              |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/04/2024 | 0553122/24-0 | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC 60/12 | 30/01/2024 | 0114609/24-2 | 11098 - RDC 73/2016 -<br>NOVO - Inclusão de nova<br>apresentação restrita ao<br>número de<br>unidades farmacotécnicas | 26/02/2024 | APRESENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                           | VP<br>0031/04<br>VPS<br>0031/04 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 7<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 60                                                                                                   |
|            |              |                                                                                                                          | NA         | NA           | NA                                                                                                                    | 26/04/2024 | <u>Bula Paciente</u><br>COMPOSIÇÃO<br>4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>DIZERES LEGAIS<br><br><u>Bula Profissional</u><br>COMPOSIÇÃO<br>5. ADVERTÊNCIAS<br>E PRECAUÇÕES<br>DIZERES LEGAIS |                                 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 14<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 7<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 60 |
| 17/12/2025 | 1614592/25-0 | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC 60/12 | NA         | NA           | NA                                                                                                                    | 17/12/2025 | <u>Bula Paciente</u><br>APRESENTAÇÕES<br>4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br><br><u>Bula Profissional</u><br>COMPOSIÇÕES<br>5. ADVERTÊNCIAS<br>E PRECAUÇÕES                                 | VP<br>0031/05<br>VPS<br>0031/05 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 7<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 60                                                  |
| 13/02/2026 |              | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de<br>Texto de Bula –<br>publicação no<br>Bulário RDC 60/12 | NA         | NA           | NA                                                                                                                    | 13/02/2026 | <u>Bula Paciente</u><br>4. O QUE DEVO<br>SABER ANTES DE<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>DIZERES LEGAIS<br><br><u>Bula Profissional</u><br>5. ADVERTÊNCIAS<br>E PRECAUÇÕES<br>DIZERES LEGAIS                             | VP<br>0031/06<br>VPS<br>0031/06 | 50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 7<br>50 MG CAP DURA<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 60                                                  |