

NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO
100.000 UI/G + 200 MG/G

CIMED INDÚSTRIA S.A.

POMADA DERMATOLÓGICA

Bula

Profissional de saúde

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

nistatina + óxido de zinco

Medicamento genérico lei n° 9.787, de 1999

APRESENTAÇÃO

nistatina 100.000 UI/g + óxido de zinco 200 mg/g pomada apresentada em bisnaga de 60g.

USO DERMATOLÓGICO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada grama contém:

óxido de zinco..... 200 mg
nistatina.....100.000 UI
Excipientes*.....q.s.p.: 1 g
*petrolato líquido, petrolato branco e essência de lavanda

II - INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Este medicamento tem como indicação principal o tratamento das assaduras infantis (dermatite das fraldas¹, dermatite amoniacal¹). Outras indicações são os intertrigos² (mamário, perineal, interdigital, axilar ou outros) e as paroníquias por fungos do gênero *Candida*³.

¹ CID: L22 – Dermatite das fraldas

² CID: L30.4 – Intertrigos eritematosos

³ CID: B37.2 - Candidíase da pele e de unha

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

A nistatina é um antibiótico polieno macrolídeo fungistático e fungicida contra uma variedade de fungos, principalmente *Candida sp.* É pouco absorvida pela pele, tendo demonstrado baixa toxicidade e baixo potencial de sensibilização alérgica. Na concentração de 100 U.I./ml é eficaz in vitro contra várias cepas de *Candida sp.* Demonstrou-se uma concentração inibitória mínima (MIC) de 20 U.I./ml para *C. albicans* em teste com 332 isolados de *C. albicans* provenientes de diferentes locais de infecção humana, sem registro de resistência. Aplicada topicamente na concentração de 100.000 U.I./g, a nistatina demonstrou eficácia para erradicar *C. albicans* em vários estudos, promovendo melhora das lesões em dois a três dias e cura em dez a vinte dias. In vitro demonstrou eficácia semelhante a dos imidazóis e da amorolfina ou foi o agente mais eficaz contra *Candida sp.* A associação com óxido de zinco a 20% não diminuiu a atividade antifúngica da nistatina em cobaias na concentração de 100.000 U.I./g.

O óxido de zinco funciona como protetor mecânico da barreira da pele, não apresentando efeitos tóxicos ou adversos conhecidos. Além da sua ação farmacológica, agiria também por meio da correção de um déficit local de zinco quando aplicado topicamente. Demonstrou-se in vitro que o óxido de zinco promove degradação do colágeno nos tecidos necróticos de crostas de pele, provavelmente pelo aumento da atividade de metaloproteinases: esse pode ser um dos mecanismos que explicam sua ação anti-inflamatória e o efeito positivo na cicatrização de úlceras da pele.

Provavelmente o óxido de zinco acelera o processo de cicatrização por meio do aumento da expressão dos genes para o fator de crescimento IGF-1 (insulina like) no tecido de granulação. Demonstrou-se ação do óxido de zinco estimulando a reepitelização: em células basais da epiderme, tanto de pele íntegra como não íntegra de ratos, aumento do índice mitótico, quando empregado em concentração de 25%. Além desses, há também um efeito antibacteriano indireto atribuído ao óxido de zinco, que seria mediado pelos sistemas locais de defesa e não por ação direta contra bactérias.

A aplicação de petrolato puro sobre a pele provoca redução de aproximadamente 50% na perda de água da pele medida após 40 minutos da aplicação devido à propriedade oclusiva do petrolato, e resulta em ação emoliente que melhora a função de barreira mecânica da pele. O petrolato é um veículo altamente lipofílico e hidrofóbico que, quando associado ao óxido de zinco, rodeia as partículas do pó deste último, impedindo a absorção de água ou de exsudatos. Preparados contendo dois componentes imiscíveis, como pó de óxido de zinco suspenso em um veículo lipofílico como petrolato, não têm características absorptivas, sendo altamente oclusivas. O petrolato pode incorporar-se à camada externa do estrato córneo da pele durante o processo de cicatrização e auxilia na diminuição do processo inflamatório até que se complete a migração das células epiteliais para a superfície da pele lesada.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Este medicamento é uma pomada que associa em sua fórmula a nistatina, óxido de zinco e petrolato, que formam uma camada protetora, reduzindo a fricção entre a pele e as fraldas e impedindo o contato da pele com urina e fezes, além de auxiliar a cicatrização de irritações da pele e combater a infecção pela *Cândida*, fungo frequentemente presente em assaduras mais intensas ou de maior duração.

Propriedades farmacocinéticas

A absorção tópica da nistatina é mínima. A absorção tópica do óxido de zinco é de 5 mcg/cm².h.

4. CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contraindicado em casos de hipersensibilidade à nistatina, ao óxido de zinco ou aos demais ingredientes do produto.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Em casos raros pode haver irritação da pele com o uso do produto.

Para uso externo, apenas.

Não deve ser utilizado em grandes áreas de pele danificada ou ferida.

Uso pediátrico

Não há advertências ou recomendações especiais para crianças.

Bula

Profissional de saúde



Uso geriátrico

Não há advertências ou recomendações especiais para pessoas idosas.

Gravidez, Categoria C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeito na capacidade de dirigir e operar máquinas

Este medicamento não possui influência na capacidade de dirigir e operar máquinas.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O óxido de zinco inibe os efeitos terapêuticos da hidroxiquinolona tópica.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser armazenado em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Protegido da luz e umidade.

Durante a fabricação do produto é possível a entrada de ar na bsnaga, porém isto não afeta o peso final nem a qualidade do produto. Para melhor conservação, o tubo deve ser armazenado no cartucho com a tampa para baixo.

Prazo de validade: até 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas

Este medicamento é uma pomada levemente amarelada, homogênea, com odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Este medicamento deve ser aplicado depois do banho e a cada troca de fraldas, após lavagem e secagem cuidadosa da pele. Quando usada nas demais indicações (intertrigos e paroníquias), aplicar duas ou mais vezes ao dia nas áreas afetadas.

Para aplicar este medicamento na pele da área em contato com as fraldas, siga as instruções abaixo:

- 1) A pele da área coberta pela fralda deve ser bem limpa, para eliminar qualquer resíduo de urina ou fezes, que pode agir como irritante para a pele do bebê. Quando houver somente urina, a região deve ser lavada apenas com água morna. Se houver fezes, lavar com água morna e sabonete de glicerina, ou sabonete suave para bebês, e enxaguar bem.
- 2) Em seguida, secar delicadamente, usando uma toalha macia. É importante evitar limpeza e esfregação exageradas, pois, além de desnecessárias, podem causar irritação da pele.
- 3) Após a secagem cuidadosa, aplicar uma camada fina deste medicamento em toda a região da pele coberta pelas fraldas.
- 4) As toalhas do bebê (e também as fraldas de pano) devem ser lavadas de preferência com sabão de coco e enxaguadas com água em abundância para que não fiquem resíduos de sabão. Não usar produtos para amaciar roupas ou outros produtos químicos.

9. REAÇÕES ADVERSAS

Pode haver irritação da pele e dermatite de contato com o uso do produto.

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade, incluindo *rash* e urticária.

Síndrome de Stevens-Johnson foi reportada raramente ($> 1/10.000$ e $\leq 1/1.000$).

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdose com o produto.

A nistatina é pouco absorvida pela pele intacta, e embora o zinco proveniente do óxido de zinco seja absorvido, este também está presente na dieta. Consequentemente, a superdosagem desse produto é muito improvável.

Em casos de superdosagem, o produto deve ser descontinuado, seguido de tratamento de suporte.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.

11. REFERÊNCIAS

1. Dobias B, Hazen EL. Nystatin. *Chemotherapia* 3:108-19, 1961.
2. Cooper SM, Shaw S. Contact allergy to nystatin: an unusual allergen. *Contact Dermatitis* 41:120, 1999.
3. Boyce ST, Holder IA. Selection of topical antimicrobial agents for cultured skin for burns by combined assessment of cellular cytotoxicity and antimicrobial activity. *Plast Reconstr Surg* 92:493-500, 1993.
4. Hamra LK, Pankiewicz JJ. The susceptibility of *Candida albicans* to amphotericin B, nystatin, and 5- fluorocytosine. *Med J Aust* 2:749-50, 1977.
5. Witten VH, Katz SI. Nystatin. *Med Clin N Am* 54:1329-37, 1970.
6. Alban J. Efficacy of nystatin topical cream in the management of cutaneous candidiasis in infants. *Curr Therap Res* 14:158-61, 1972.
7. de Wet PM, Rode H, van Dyk A, Millar AJ. Perianal candidosis: a comparative study with mupirocin and nystatin. *Int J Dermatol* 38:618-22, 1999.
8. Hoppe JE. Treatment of oropharyngeal candidiasis and candidal diaper dermatitis in neonates and infants: review and reappraisal. *Pediatr Infect Dis J* 16:885-94, 1997.
9. Kwok YKC, Tay YK, Goh CL, Kamarudin A, Koh MT, Seow CS. Epidemiology and in vitro activity of antimycotics against candidal vaginal/skin/nail infections in Singapore. *Int J Dermatol* 37:145-9, 1998.

Bula

Profissional de saúde

CIMED

10. Abu-Elteen KH. Incidence and distribution of Candida species isolated from human skin in Jordan. Mycoses 42:311-7, 1999.
11. Auger P, Colin P, Joly J, Poirier S, Colin D. Treatment of cutaneous candidosis in guinea pigs: effect of zinc oxide on the antifungal efficacy of nystatin. Mycoses 32:455-60, 1989.
12. Agren MS. Studies on zinc in wound healing. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 154:1-36, 1990.
13. Tarnow P, Agren M, Steenfos H, Jansson JO. Topical zinc oxide treatment increases endogenous gene expression of insulin-like growth factor-1 in granulation tissue from porcine wounds. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 28:255-9, 1994.
14. Jin L, Murakami TH, Janjua NA, Hori Y. The effects of zinc oxide and diethylthiocarbamate on the mitotic index of epidermal basal cells of mouse skin. Acta Med Okayama 48:231-6, 1994.
15. Lodén M. The increase in skin hydration after application of emollients with different amounts of lipids. Acta Derm Venereol 72:327-30, 1992.
16. Juch RD, Ruffi Th, Surber C. Pastes: what do they contain? How do they work? Dermatology 189:373-7, 1994.
17. Lodén M, Bárány E. Skin-identical lipids versus petrolatum in the treatment of tape-stripped and detergent-perturbed human skin. Acta Derm Venereol 80:412-5, 2000.

III - DIZERES LEGAIS

Registro: 1.4381.0222

Registrado por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**
Avenida Angélica, 2.248, 6º andar, conjunto 61,
Consolação - São Paulo - SP
CEP: 01228-200 - CNPJ: 02.814.497/0001-07

Produzido por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**
Pouso Alegre - MG

Indústria Brasileira

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)
0800 704 46 47 cimedremedios.com.br

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.



Bula

Profissional de saúde

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
28/01/2019	1097472019	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	28/01/2019	1097472019	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	28/01/2019	Inclusão inicial de texto de bula	VP/VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G
08/08/2019	1948483/19-6	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	08/08/2019	1948483/19-6	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	08/08/2019	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO? 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE	VP/VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G
09/11/2020	3933632/20-8	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário - RDC 60/12	09/11/2020	3933632/20-8	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário - RDC 60/12	09/11/2020	I – Identificação do medicamento 9- Reações Adversas	VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G
23/04/2021	1558151/21-9	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário - RDC 60/12	23/04/2021	1558151/21-9	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário - RDC 60/12	23/04/2021	I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 7- CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO	VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G

Bula Profissional de saúde

									100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G
28/06/2021	2506736/21-2	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário - RDC 60/12	28/06/2021	2506736/21-2	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula -publicação no Bulário - RDC 60/12	28/06/2021	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9- REAÇÕES ADVERSAS	VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G
02/08/2022	4494267/22-8	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula- publicação no Bulário - RDC 60/12	02/08/2022	4494267/22-8	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula- publicação no Bulário - RDC 60/12	02/08/2022	DIZERES LEGAIS	VP/VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G
04/12/2024	--	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula- publicação no Bulário - RDC 60/12	04/12/2024	--	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula- publicação no Bulário - RDC 60/12	04/12/2024	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO DIZERES LEGAIS	VP/VPS	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG PLAS AL OPC X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG AL X 60 G 100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CX 50 BG PLAS AL OPC X 60 G