



**FoQ XR<sup>®</sup>**  
**(cloridrato de metilfenidato)**

**Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.**

**Comprimido Revestido de Liberação Prolongada**

**18mg, 36mg e 54mg**

## **I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

**FoQ XR®**

**cloridrato de metilfenidato**

## **MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA**

### **APRESENTAÇÕES**

Comprimido revestido de liberação prolongada.

Embalagens contendo 30 comprimidos revestidos de liberação prolongada de 18mg, 36mg ou 54mg.

### **VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS**

### **COMPOSIÇÕES**

Cada comprimido revestido de liberação prolongada de 18mg contém:

cloridrato de metilfenidato (equivalente a 15,57mg de metilfenidato).....18mg  
excipientes q.s.p.....1 comprimido revestido de liberação prolongada  
(lactose monoidratada, hipromelose, dióxido de silício, estearato de magnésio, copolímero de ácido metacrílico e metacrilato de metila, copolímero de ácido metacrílico e metacrilato de metila (1:2), citrato de trietila, talco, ácido fumárico, álcool polivinílico, macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho, goma laca, álcool isopropílico, óxido de ferro preto, álcool butílico, propilenoglicol e hidróxido de amônio).

Cada comprimido revestido de liberação prolongada de 36mg contém:

cloridrato de metilfenidato (equivalente a 31,13mg de metilfenidato).....36mg  
excipientes q.s.p.....1 comprimido revestido de liberação prolongada  
(lactose monoidratada, hipromelose, dióxido de silício, estearato de magnésio, copolímero de ácido metacrílico e metacrilato de metila, copolímero de ácido metacrílico e metacrilato de metila (1:2), citrato de trietila, talco, ácido fumárico, álcool polivinílico, macrogol, dióxido de titânio, goma laca, álcool isopropílico, óxido de ferro preto, álcool butílico, propilenoglicol e hidróxido de amônio).

Cada comprimido revestido de liberação prolongada de 54mg contém:

cloridrato de metilfenidato (equivalente a 46,71mg de metilfenidato).....54mg  
excipientes q.s.p.....1 comprimido revestido de liberação prolongada  
(lactose monoidratada, hipromelose, dióxido de silício, estearato de magnésio, copolímero de ácido metacrílico e metacrilato de metila, copolímero de ácido metacrílico e metacrilato de metila (1:2), citrato de trietila, talco, ácido fumárico, álcool polivinílico, macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho, goma laca, álcool isopropílico, óxido de ferro preto, álcool butílico, propilenoglicol e hidróxido de amônio).

## II - INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

### 1. INDICAÇÕES

FoQ XR® é indicado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A eficácia do cloridrato de metilfenidato no tratamento do TDAH foi estabelecido em ensaios clínicos controlados de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos e adultos com idade entre 18 e 65 anos que preenchiam os critérios do Manual de Diagnóstico e Estatística, 4ª edição (DSM-IV) para TDAH.

### 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA


O cloridrato de metilfenidato mostrou-se eficaz no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em quatro estudos randomizados, duplo-cegos, controlados com placebo em crianças, adolescentes e dois estudos, duplo-cegos, controlados com placebo em adultos que preencheram os critérios do Manual de Diagnóstico e Estatística, 4ª edição (DSM-IV) para TDAH.

#### Crianças

Três estudos duplo-cegos, controlados com placebo e com ativo foram conduzidos em 416 crianças com idade entre 6 e 12 anos. Os estudos controlados compararam cloridrato de metilfenidato administrado uma vez ao dia (18, 36 ou 54mg), metilfenidato administrado três vezes ao dia ao longo de 12 horas (15, 30 ou 45mg - dose total diária) e placebo em dois estudos unicêntricos, cruzados, de três semanas (estudos 1 e 2) e em um estudo multicêntrico de 4 semanas e comparados com grupo paralelo (estudo 3). A comparação primária de interesse em todos os três estudos foi cloridrato de metilfenidato versus placebo. Nos estudos 1, 2 e 3, os sintomas de TDAH foram avaliados pelos professores das escolas da comunidade usando a escala de Conners para falta de atenção/hiperatividade com agressão (IOWA). Foi demonstrada redução significativa na subescala de falta de atenção/hiperatividade no grupo de tratamento versus placebo entre os três estudos controlados para cloridrato de metilfenidato.

As pontuações de cloridrato de metilfenidato e placebo para os três estudos são apresentadas na Figura 1


**Figura 1 - Média dos professores das escolas da comunidade IOAW Conners nas pontuações de falta de Atenção/hiperatividade com cloridrato de metilfenidato**



Nos estudos 1 e 2 os sintomas de TDAH foram avaliados pelos professores da escola de laboratório, usando a escala da escola de laboratório SKAMP (Swanson, Kotkin, Agler, M-Flynn and Pelham). Os resultados combinados a partir destes dois estudos, demonstraram melhoras estatisticamente significativas na atenção e no comportamento dos pacientes tratados com cloridrato de metilfenidato

versus placebo. A figura 2 apresenta a classificação SKAMP do professor da escola para cloridrato de metilfenidato e placebo.

**Figura 2 - Classificação do professor da escola laboratorial SKAMP: média (EPM - Erro Padrão da Média) da pontuação de atenção combinada (Estudos 1 e 2)**



#### Adolescentes

Em um estudo randomizado, duplo-cego, multicêntrico, controlado por placebo (estudo 4), envolvendo 177 pacientes, cloridrato de metilfenidato mostrou-se eficaz no tratamento de TDAH e foi bem tolerado em adolescentes com idade entre 13 e 18 anos em doses de até 72mg/dia (1,4mg/kg/dia). Dos 220 pacientes que entraram na fase aberta de 4 semanas de titulação da dose, 177 foram titulados para uma dose individual (máximo de 72mg/dia) com base no alcance de critérios específicos de melhora na escala de avaliação de TDAH e na avaliação global de efetividade, com tolerabilidade aceitável. Os pacientes que preencheram estes critérios foram então randomizados para receber a sua dose individualizada de cloridrato de metilfenidato (18-72mg/dia, n=87) ou placebo (n=90) durante uma fase duplo-cega de duas semanas. Ao final desta fase, a média das pontuações para classificação atribuída pelo investigador na escala de avaliação de TDAH demonstrou que cloridrato de metilfenidato apresentou superioridade significativa em relação ao placebo.

#### Adultos

Dois estudos duplo-cegos, controlados por placebo foram conduzidos em 627 adultos com idade entre 18 e 65 anos. Os estudos controlados compararam cloridrato de metilfenidato administrado uma vez ao dia e placebo em um estudo de titulação da dose, multicêntrico, de grupo paralelo, de 7 semanas (estudo 5) (36 a 108mg/dia) e em um estudo de dose fixa, multicêntrico, de grupo paralelo, de 5 semanas (estudo 6) (18, 36 e 72mg/dia).

O estudo 5 demonstrou a eficácia de cloridrato de metilfenidato no tratamento de TDAH em adultos de 18 a 65 anos, nas doses de 36mg/dia a 108mg/dia, com base na variação na escala de avaliação de TDAH (AISRS) pelo investigador, da condição de base para a visita final do estudo. Dos 226 pacientes que entraram no estudo de 7 semanas, 110 foram randomizados para cloridrato de metilfenidato e 116 foram randomizado para placebo. O tratamento foi iniciado com 36mg/dia e os pacientes continuaram com aumentos incrementais de 18mg/dia (36 a 108mg/dia) com base no alcance de critérios de melhora específicos com tolerabilidade aceitável. Na visita final do estudo, a variação média das pontuações (método dos mínimos quadrados, erro padrão da média) para a avaliação do investigador na AISRS

demonstrou que cloridrato de metilfenidato apresentou superioridade estatisticamente significativa em relação ao placebo.

O estudo 6, multicêntrico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo, (5 semanas de duração) com 3 grupos fixos de dose (18, 36, e 72mg). Os pacientes foram randomizados para receber cloridrato de metilfenidato administrado em doses de 18mg (n=101), 36mg (n=102), 72mg/dia, (n=102), ou placebo (n=96). Todas as três doses de cloridrato de metilfenidato tiveram superioridade estatisticamente significativa mais efetiva em relação ao placebo na melhora das pontuações totais de CAARS (Escala de Avaliação de Connor para TDAH em Adultos) na pontuação total de duplo-cego e de desfecho em indivíduos adultos com TDAH.

#### **Referências bibliográficas:**

1. James Swanson, Suneel Gupta, Andrew Lam, Ira Shoulson, Marc Lerner, Nishit Modi, Elizabeth Lindemulder, Sharon Wigal. Development of a New Once-a-Day Formulation of Methylphenidate for the Treatment of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder. Proof-of-Concept and Proof-of-Product Studies. ARCH. GEN. PSYCHIATRY, 2003; 60:204-211.
2. Mark L. Wolraich, Laurence L. Greenhill, William Pelham, James Swanson, Timothy Wilens, Donna Palumbo, Marc Atkins, Keith McBurnett, Oscar Bukstein, and Gerald August, on behalf of the Concerta Study Group. Randomized, Controlled Trial of OROS Methylphenidate Once a Day in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. PEDIATRICS Vol. 108 No. 4 October 2001. Pgs 883-892.
3. William E. Pelham, Elizabeth M. Gnagy, Lisa Burrows-Maclean, Andy Williams, Gregory A. Fabiano, Sean M. Morrisey, Andrea M. Chronis, Gregory L. Forehand, Celeste A. Nguyen, Martin T. Hoffman, Thomas M. Lock, Karl Fielbelkorn, Erika K. Coles, Carlos J. Panahon, Randi L. Steiner, David L. Meichenbaum, Adia N. Onyango, Gene D. Morse. Once-a-Day Concerta Methylphenidate Versus Three-Times-Daily Methylphenidate in Laboratory and Natural Settings. PEDIATRICS Vol. 107 No. 6 June 2001
4. Timothy E. Wilens, Keith McBurnett, Oscar Bukstein, James McGough, Laurence Greenhill, Marc Lerner, Mark A. Stein, C. Keith Connors, John Duby, Jeffrey Newcorn, Charles E. Bailey, Christopher J. Kratochvil, Daniel Coury, Charles Casat, Mary Joan C. Denisco, Patricia Halstead, Leslie Bloom, Brenda A. Zimmerman, Joan Gu, MSKimberly M. Cooper, Joseph M. Lynch. Multisite Controlled Study of OROS Methylphenidate in the Treatment of Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160:82-90
5. Lenard A. Adler, MD, Brenda Zimmerman, H. Lynn Starr, Steve Silber, Joseph Palumbo, Camille Orman, and Thomas Spencer. Efficacy and Safety of OROS Methylphenidate in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. A Randomized, Placebo- Controlled, Double-Blind, Parallel Group, Dose-Escalation Study. Journal of Clinical Psychopharmacology. Vol29, No.3, June 2009
6. Rossella Medori, J. Antoni Ramos-Quiroga, Miguel Casas, J.J.S. Kooij, Asko Niemelä, Götz-Erik Trott, Emma Lee, and Jan K. Buitelaar. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Three Fixed Dosages of Prolonged-Release OROS Methylphenidate in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. BIOL PSYCHIATRY 2008; 63:981-989

### **3.CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

#### **Farmacodinâmica**

O cloridrato de metilfenidato é um estimulante do Sistema Nervoso Central. O mecanismo de ação terapêutica no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) não é conhecido. Acredita-se que o metilfenidato bloqueie a recaptação de norepinefrina e dopamina no neurônio pré-sináptico e aumente a liberação destas monoaminas no espaço extraneuronal. O metilfenidato é uma mistura racêmica composta por isômeros d e l. O isômero d tem atividade farmacológica maior que o isômero l.

O efeito é observado até 12 horas após a administração.


#### **Farmacocinética**

##### **Absorção**

O metilfenidato é rapidamente absorvido. Após a administração oral de FoQ XR® a adultos, a concentração plasmática de metilfenidato aumenta rapidamente, atingindo um pico inicial em cerca de 1-2 horas, e continua a aumentar, gradualmente, nas horas subsequentes. A concentração plasmática máxima é atingida

em cerca de 6 a 8 horas, após o que se inicia uma redução gradual do nível plasmático de metilfenidato. A administração de FoQ XR® em dose única diária minimiza as flutuações entre as concentrações plasmáticas de pico e vale associadas com o metilfenidato de liberação imediata administrado 3 vezes ao dia - vide concentração plasmática média versus perfis de tempo na figura 3. A biodisponibilidade relativa de FoQ XR® em dose única diária é comparável à do metilfenidato administrado 3 vezes ao dia, em adultos.

**Figura 3 - Concentrações plasmáticas médias de metilfenidato em 36 adultos, após uma dose única de 18mg de cloridrato de metilfenidato uma vez ao dia, e metilfenidato de liberação imediata de 5mg três vezes ao dia administradas a cada 4 horas.**



Os parâmetros farmacocinéticos médios em 36 adultos após a administração de cloridrato de metilfenidato 18mg uma vez ao dia e cloridrato de metilfenidato 5mg três vezes ao dia estão resumidos na Tabela 1.

**Tabela 1: Parâmetros Farmacocinéticos (Média + DP)**

| Parâmetros                   | cloridrato de metilfenidato<br>(18mg uma vez/dia)(n=36) | cloridrato de metilfenidato<br>(5mg três vezes/dia) (n=35) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| C <sub>máx</sub> (ng/mL)     | 3,7 ± 1,0                                               | 4,2 ± 1,0                                                  |
| T <sub>máx</sub> (h)         | 6,8 ± 1,8                                               | 6,5 ± 1,8                                                  |
| ASC <sub>inf</sub> (ng.h/mL) | 41,8 ± 13,9                                             | 38,0 ± 11,0                                                |
| T <sub>1/2</sub> (h)         | 3,5 ± 0,4                                               | 3,0 ± 0,5                                                  |

Não foram observadas diferenças na farmacocinética de cloridrato de metilfenidato após administração única ou repetida da dose única diária, indicando não haver acúmulo significativo do fármaco. A área sob a curva de concentração plasmática (ASC) e a meia-vida de eliminação (t<sub>1/2</sub>) após administração repetida da dose única diária são semelhantes às observadas após a primeira dose de cloridrato de metilfenidato.

#### Proporcionalidade à dose

Após a administração de cloridrato de metilfenidato em dose única de 18, 36 e 54mg/dia a adultos saudáveis, a C<sub>máx</sub> e a ASC<sub>inf</sub> do d-metilfenidato foram proporcionais à dose, enquanto a C<sub>máx</sub> e a ASC<sub>inf</sub> do l-metilfenidato aumentaram desproporcionalmente em relação à dose. Após a administração de cloridrato de metilfenidato, as concentrações plasmáticas do isômero l foram aproximadamente 1/40 das concentrações plasmáticas do isômero d.

Em adultos saudáveis, a administração única e múltipla da dose única diária de cloridrato de metilfenidato variando de 54 a 144mg/dia resultou em aumentos na  $C_{\max}$  e na  $ASC_{\text{inf}}$  lineares e proporcionais à dose para o metilfenidato total e seu principal metabólito, o ácido alfa-fenil-piperidino acético (PPAA). A dose única, a depuração no estado de equilíbrio (dia 4) e os parâmetros de meia-vida foram semelhantes, indicando que não houve dependência do tempo na farmacocinética do metilfenidato. A relação de metabólito (PPAA) para o fármaco de origem (metilfenidato) foi constante ao longo das doses de 54 a 144mg/dia, tanto após uma dose única e com doses múltiplas.

Em um estudo de doses múltiplas em pacientes adolescentes com TDAH com idade entre 13 e 16 anos tomando de 18 a 72mg/dia de cloridrato de metilfenidato,  $C_{\max}$  média e  $ASC$  durante um intervalo de dose do d-isômero e de metilfenidato total aumentaram proporcionalmente em relação à dose.

#### **Distribuição**

Em adultos, as concentrações plasmáticas de metilfenidato declinam biexponencialmente após a administração oral. A meia-vida do metilfenidato em adultos após administração oral de cloridrato de metilfenidato é de aproximadamente 3,5 horas.

#### **Metabolismo**

Em humanos, o metilfenidato é essencialmente metabolizado por desesterificação, transformando-se em ácido alfa-fenil-piperidino acético (PPAA), que tem pouca ou nenhuma atividade farmacológica. Em adultos, o metabolismo de cloridrato de metilfenidato, administrado em dose única diária, avaliado pela transformação em PPAA, é semelhante à do metilfenidato de liberação imediata, administrado 3 vezes ao dia. O metabolismo de doses únicas ou repetidas de cloridrato de metilfenidato uma vez ao dia é semelhante.

#### **Eliminação**

Após administração oral de metilfenidato marcado com radioisótopo em humanos, cerca de 90% da radioatividade foi recuperada na urina. O principal metabólito urinário foi o PPA, correspondendo a aproximadamente 80% da dose do composto precursor.

#### **Efeito de alimentos**

Em pacientes, não houve diferença na atividade quer farmacodinâmica quer farmacocinética de cloridrato de metilfenidato quando administrado após uma refeição com elevado teor de gordura. Não há evidência de alteração da absorção na presença ou ausência de alimentos.

#### **Efeito do álcool**

Um estudo “in vitro” foi conduzido para explorar o efeito do álcool nas características de liberação do metilfenidato a partir dos comprimidos com a concentração de 18mg de cloridrato de metilfenidato. Em uma concentração de álcool de até 40% não houve aumento na liberação de metilfenidato na primeira hora. Os resultados com os comprimidos de concentração de 18mg são considerados representativos para todos os comprimidos das outras concentrações.

#### **Populações especiais**

**Sexo:** em adultos normais, a média dos valores da área sob a curva  $ASC_{\text{inf}}$  de cloridrato de metilfenidato ajustados pela dose foram de 36,7ng.h/mL em homens e de 37,1ng.h/mL em mulheres, sem diferença detectável entre os dois grupos.

**Raça:** em adultos em uso de cloridrato de metilfenidato, a área sob a curva  $ASC_{\text{inf}}$  ajustada pela dose foi consistente entre grupos étnicos. Entretanto, o tamanho da amostra pode ter sido insuficiente para detectar variações étnicas na farmacocinética.

**Idade:** a farmacocinética de cloridrato de metilfenidato não foi estudada em crianças com idade inferior a 6 anos.

#### **Insuficiência renal**

Não há experiência com o uso de cloridrato de metilfenidato em pacientes com insuficiência renal. Após a administração oral de metilfenidato marcado com radioisótopos em humanos, o metilfenidato foi extensamente metabolizado e cerca de 80% da radioatividade foi excretada na urina na forma de PPAA. Como a depuração renal não é uma via importante de depuração plasmática do metilfenidato, espera-se que a insuficiência renal tenha pouco efeito na farmacocinética de cloridrato de metilfenidato.

#### **Insuficiência hepática**

Não há experiência com o uso de cloridrato de metilfenidato em pacientes com insuficiência hepática.

#### **Estudos pré-clínicos**

Em um estudo de carcinogenicidade por toda a vida, conduzido em camundongos, o cloridrato de metilfenidato provocou um aumento em adenomas hepatocelulares, e apenas em machos, um aumento em hepatoblastomas na dose diária de aproximadamente 60mg/kg/dia. Esta dose é consideravelmente mais alta que a dose recomendada para humanos em mg/kg. Hepatoblastoma é um tipo de tumor maligno

relativamente raro em roedores. Não houve aumento no total de tumores hepáticos malignos. A linhagem de camundongo usada é sensível ao desenvolvimento de tumores hepáticos e a significância destes resultados para seres humanos é desconhecida.

Um estudo similar por toda a vida, conduzido em ratos, na dose de cloridrato de metilfenidato de até 45mg/kg/dia não mostrou evidência de carcinogenicidade.

Em um estudo de 24 semanas na linhagem p53+/- de camundongo transgênico não houve evidência de carcinogenicidade nas doses de cloridrato de metilfenidato de até 74mg/kg/dia.

Não foram observados eventos adversos toxicológicos em dois estudos separados de 30 dias em cães com administração oral de cloridrato de metilfenidato em doses de até 72mg/dia (até 8,6mg/kg/dia) e 144mg/dia (até 22mg/kg/dia), respectivamente.

O metilfenidato não foi mutagênico no teste de Ames “in vitro” de mutações reversas ou no teste de mutação antecipada de célula de linfoma de camundongo “in vitro”. Trocas de cromátides irmãs e aberrações cromossômicas estavam aumentadas em um teste “in vitro” em cultivo decélulas ovarianas de camundongo chinês (Chinese Hamster). O metilfenidato foi negativo “in vivo” no teste de micronúcleo de medula óssea de camundongo.

#### **4. CONTRAINDICAÇÕES**

FoQ XR® é contraindicado:

- em pacientes com ansiedade, tensão e agitação acentuadas, pois pode agravar estes sintomas;
- em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao metilfenidato ou a outros componentes da fórmula do produto;
- em pacientes com glaucoma;
- durante tratamento com inibidores da monoaminoxidase (MAO) e, também, durante um período mínimo de 14 dias após a descontinuação do inibidor da MAO (pode ocorrer crise hipertensiva) (vide “Interações medicamentosas”).

#### **5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

##### **Anormalidades cardíacas estruturais**

Embora uma relação causal não tenha sido estabelecida, mortes súbitas foram relatadas em pacientes com anormalidades cardíacas estruturais tratados com medicamentos de efeito estimulante usados no tratamento do TDAH. Estes tratamentos devem ser usados com cautela em pacientes com anormalidades cardíacas estruturais.

##### **Pacientes menores de 6 anos**

FoQ XR® não deve ser usado em crianças com menos de 6 anos. Não há ainda dados suficientes disponíveis sobre a segurança de uso de longo prazo do metilfenidato.

##### **Tiques motores e verbais, e agravamento da Síndrome de Tourette**

Estimulantes do Sistema Nervoso Central, incluindo o metilfenidato, têm sido associados com início ou exacerbação de tiques motores e verbais. O agravamento da Síndrome de Tourette também tem sido relatado. Recomenda-se que o histórico familiar seja avaliado e que o paciente seja clinicamente avaliado para tiques ou Síndrome de Tourette, antes de iniciar o metilfenidato. O acompanhamento regular para o surgimento ou agravamento de tiques ou Síndrome de Tourette durante o tratamento com metilfenidato é recomendado em cada ajuste de dose e a cada visita. O tratamento deve ser interrompido, se clinicamente apropriado.

##### **Uso prolongado**

Embora uma relação causal não esteja estabelecida, redução no crescimento (ganho ponderal e/ou estatural) tem sido relatada com o uso prolongado de estimulantes em crianças. Portanto, pacientes que necessitem tratamento de longo prazo devem ser cuidadosamente monitorados. Crianças que não estejam crescendo ou ganhando peso conforme o esperado devem ter o tratamento interrompido.

##### **Aumento da pressão intraocular e glaucoma**

Há relatos de uma elevação transitória da pressão intraocular (PIO) associada ao tratamento com metilfenidato. Recomenda-se prescrever FoQ XR® a pacientes com glaucoma de ângulo aberto ou aumento anormal da PIO somente se o benefício do tratamento for considerado superior ao risco. Os pacientes com histórico de aumento anormal da PIO ou glaucoma de ângulo aberto, e pacientes em risco de glaucoma de ângulo fechado agudo (ex.: pacientes com hipermetropia significativa) devem ser rigorosamente monitorados.

FoQ XR® não é recomendado a pacientes com glaucoma de ângulo fechado agudo.

**Administração da dose**

FoQ XR<sup>®</sup> deve ser deglutido inteiro, com auxílio de líquidos. Os comprimidos revestidos de liberação prolongada não devem ser mastigados, partidos ou esmagados. O medicamento é contido em um invólucro não absorvível, projetado para liberar o fármaco de maneira controlada. O invólucro do comprimido revestido de liberação prolongada, juntamente aos componentes insolúveis de seu núcleo, é eliminado do organismo. Os pacientes não devem se preocupar se, ocasionalmente, notarem nas fezes algo que se assemelhe a um comprimido.

Como o comprimido revestido de liberação prolongada de FoQ XR<sup>®</sup> não sofre alteração significativa de sua forma no trato gastrointestinal, FoQ XR<sup>®</sup> não deve ser administrado a pacientes com estenose gastrointestinal grave preexistente (patológica ou iatrogênica) ou em pacientes com disfagia ou dificuldade de deglutição significativa. Têm ocorrido relatos raros de sintomas obstrutivos relacionados à ingestão de fármacos em formulações não-deformáveis de liberação controlada em pacientes com estenose conhecida. Em razão do mecanismo de liberação controlada do medicamento, FoQ XR<sup>®</sup> só deve ser utilizado em pacientes capazes de deglutir o comprimido revestido de liberação prolongada inteiro.

**Uso em outras indicações**

FoQ XR<sup>®</sup> não deve ser usado para tratar depressão grave e/ou prevenir ou tratar estados normais de fadiga.

**Sintomas psicóticos ou maníacos**

Sintomas psicóticos (alucinações) ou maníacos foram relatados em pacientes sem histórico de psicose ou mania durante o tratamento com FoQ XR<sup>®</sup> nas doses usuais. Se tais sintomas ocorrerem, FoQ XR<sup>®</sup> deve ser considerado em uma possível relação causal e a descontinuação do produto pode ser apropriada (vide “Reações adversas”).

**Agressividade, ansiedade e agitação**

Comportamento agressivo, ansiedade acentuada ou agitação são frequentemente observados em pacientes com TDAH e foram relatados em pacientes tratados com cloridrato de metilfenidato (vide “Reações adversas”). Em alguns pacientes a ansiedade levou à descontinuação de FoQ XR<sup>®</sup>. Recomenda-se monitorar os pacientes no início do tratamento com FoQ XR<sup>®</sup> em relação ao aparecimento ou agravamento de comportamento agressivo, ansiedade acentuada ou agitação.

**Priapismo**

Ereções dolorosas e prolongadas requisitando atenção médica imediata (às vezes, incluindo intervenção cirúrgica) têm sido relatadas com produtos com metilfenidato, incluindo FoQ XR<sup>®</sup>, tanto em pacientes adultos (vide “Reações adversas”) como nos pediátricos. O priapismo pode se desenvolver após certo tempo com uso de metilfenidato, frequentemente após um aumento de dose. O priapismo também surgiu durante um período de retirada de metilfenidato (interrupções programadas ou durante a descontinuação). Os pacientes que desenvolverem ereções anormais sustentadas ou frequentes e ereções dolorosas devem procurar atendimento médico imediatamente.

**Distúrbios cerebrovasculares**

Foram relatados distúrbios cerebrovasculares (incluindo vasculite cerebral e hemorragia cerebral) com o uso de cloridrato de metilfenidato (vide “Reações adversas”). Durante a terapia com FoQ XR<sup>®</sup>, considerar distúrbios cerebrovasculares como um possível diagnóstico em qualquer paciente que desenvolva novos sintomas neurológicos consistentes com isquemia cerebral. Estes sintomas podem incluir dor de cabeça severa, fraqueza ou paralisia unilateral e comprometimento da coordenação, visão, fala, linguagem ou memória. Interromper o uso de FoQ XR<sup>®</sup> imediatamente se suspeitar de distúrbio cerebrovascular durante o tratamento. O diagnóstico precoce pode orientar o tratamento subsequente.

Em pacientes com distúrbios cerebrovasculares preexistentes (ex.: aneurisma, malformações/anomalias vasculares), o tratamento com FoQ XR<sup>®</sup> não é recomendado.

**Condições que necessitam cautela**

FoQ XR<sup>®</sup> deve ser administrado com cautela nas seguintes condições:

**Pacientes psicóticos:** a experiência clínica sugere que a administração de metilfenidato a pacientes psicóticos pode exacerbar sintomas de alteração do comportamento e distúrbio do pensamento.

**Condições médicas subjacentes que podem estar comprometidas com aumentos na pressão sanguínea ou na frequência cardíaca:** em estudos clínicos em crianças, tanto cloridrato de metilfenidato como o metilfenidato de liberação imediata aumentaram a frequência de pulso em repouso, em média em 2-6 bpm, e produziram aumentos médios de 1-4 mmHg na pressão sistólica e diastólica durante o dia, em comparação ao placebo. Em estudos clínicos controlados com placebo em adultos, foi observado aumento na média da frequência de pulso em repouso de aproximadamente 4-6 bpm com cloridrato de metilfenidato no ponto de desfecho versus a variação de aproximadamente -2 a 3 bpm com o placebo. Alterações na média da pressão

sanguínea no ponto de desfecho variaram de aproximadamente de -1 a 1 mm Hg (sistólica) e 0 a 1 mm Hg (diastólica) para cloridrato de metilfenidato e de -1 a 1 mm Hg (sistólica) e -2 a 0 mm Hg (diastólica) para o placebo. Portanto, recomenda-se cautela no tratamento de pacientes cuja condição médica subjacente possa ser comprometida por aumento da pressão arterial ou da frequência cardíaca. A pressão arterial e a frequência cardíaca devem ser monitoradas regularmente em pacientes em uso de FoQ XR<sup>®</sup>, especialmente naqueles com hipertensão.

**Histórico de dependência de drogas ou alcoolismo:** FoQ XR<sup>®</sup> deve ser administrado com cautela em pacientes com história de dependência de drogas ou alcoolismo. O uso abusivo crônico pode levar à tolerância acentuada e dependência psicológica, com graus variáveis de alteração do comportamento. Episódios psicóticos francos podem ocorrer, especialmente com abuso por via parenteral. Supervisão cuidadosa é necessária durante a retirada do uso abusivo, pois pode ocorrer depressão grave. A interrupção do medicamento após uso terapêutico crônico pode precipitar sintomas do transtorno subjacente, que podem necessitar acompanhamento.

#### **Monitoração hematológica**

Monitoração hematológica periódica (hemograma completo com contagem total e diferencial de leucócitos e contagem de plaquetas) é recomendável durante o tratamento prolongado.

#### **Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas**

Estimulantes podem diminuir a habilidade dos pacientes em operar máquinas potencialmente perigosas ou veículos. Recomenda-se que os pacientes sejam orientados sobre estes efeitos até que se certifique que FoQ XR<sup>®</sup> não afeta negativamente sua capacidade de dirigir ou operar máquinas. FoQ XR<sup>®</sup> pode causar tontura. É, portanto, recomendável cautela ao dirigir, operar máquinas ou realizar tarefas que necessitem atenção.

**Orientar seu paciente a não dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.**

**O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.**

#### **Gravidez (Categoria C) e lactação**

##### **Gravidez**

A segurança do metilfenidato para uso durante a gestação não está estabelecida. Não há estudos disponíveis sobre o uso de cloridrato de metilfenidato em mulheres grávidas. Portanto, FoQ XR<sup>®</sup> só deve ser usado durante a gravidez se os potenciais benefícios justificarem o potencial risco para o feto.

O cloridrato de metilfenidato apresentou efeitos teratogênicos em coelhos quando administrado na dose de 200mg/kg/dia, equivalente a aproximadamente 100 vezes a dose máxima recomendada em humanos com base em mg/kg.

Não foram observados efeitos teratogênicos em ratos em doses de até 30mg/kg/dia de cloridrato de metilfenidato, resultando em uma exposição sistêmica ao metilfenidato equivalente à aproximadamente 7 vezes a observada em estudos em voluntários e pacientes com a dose máxima recomendada de FoQ XR<sup>®</sup>, determinada com base em dados farmacocinéticos.

##### **Lactação**

O metilfenidato foi detectado no leite humano. Com base em amostras de leite de cinco mães, concentrações de metilfenidato no leite humano resultaram em doses no bebê de 0,16% a 0,7% da dosagem materna ajustada ao peso, e uma razão plasmática leite/mãe variando entre 1,1 e 2,7. Recomenda-se cautela ao se prescrever FoQ XR<sup>®</sup> para uma lactante.

##### **Fertilidade**

O metilfenidato não prejudicou a fertilidade em camundongos que receberam até 160mg/kg/dia de cloridrato de metilfenidato em um estudo de acasalamento contínuo por 18 semanas.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento pode causar doping.**

**Atenção: Contém lactose. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

#### **FoQ XR<sup>®</sup> 18mg**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho e óxido de ferro preto que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**FoQ XR® 36mg**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio e óxido de ferro preto que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**FoQ XR® 54mg**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho e óxido de ferro preto que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

FoQ XR® não deve ser usado em pacientes em tratamento (atual ou nas 2 semanas anteriores ao início do tratamento) com inibidores da MAO (vide “Contraindicações”).

Em razão de possíveis aumentos na pressão arterial, FoQ XR® deve ser usado com cautela em associação com agentes vasopressores.

FoQ XR® pode diminuir a efetividade de medicamentos usados para tratar a hipertensão. É recomendado monitorar a pressão arterial e ajustar a dose dos medicamentos anti-hipertensivos se necessário (vide “5. Advertências e Precauções - Condições médicas subjacentes que podem ser comprometidas por aumentos na pressão arterial ou na frequência cardíaca”).

Uso concomitante de anestésicos halogenados e FoQ XR® pode aumentar o risco, durante cirurgia, de aumento súbito da pressão arterial e frequência cardíaca. É recomendado evitar o uso de FoQ XR® em pacientes que utilizarão anestésicos no dia da cirurgia.

Houve relatos de Síndrome Serotoninérgica após a coadministração de metilfenidato com medicamentos serotoninérgicos. Se for necessário o uso concomitante de FoQ XR® com um medicamento serotoninérgico, é importante o reconhecimento imediato dos sintomas da Síndrome Serotoninérgica. FoQ XR® deve ser descontinuado o mais rapidamente possível se houver suspeita de Síndrome Serotoninérgica. Como a ação predominante do metilfenidato é aumentar os níveis extracelulares de dopamina, FoQ XR® pode associar-se a interações farmacodinâmicas quando coadministrado com alguns antipsicóticos, uma vez que podem surgir sintomas extrapiramidais quando estes medicamentos são administrados concomitantemente ou quando se ajusta a dose de um ou de ambos os medicamentos.

**Interação com alimentos**

Em pacientes, não houve diferença na atividade quer farmacodinâmica quer farmacocinética de FoQ XR® quando administrado após uma refeição com elevado teor de gordura. Não há evidência de alteração da absorção na presença ou ausência de alimentos.

**7. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

FoQ XR® 18 mg apresenta-se como comprimido revestido por uma película amarela, em forma de cápsula, biconvexo. Marcação '2392' impressa em tinta preta em um lado.

FoQ XR® 36 mg apresenta-se como comprimido revestido por película branca, em forma de cápsula, biconvexo. Marcação '2394' impressa em tinta preta em um lado.

FoQ XR® 54 mg apresenta-se como comprimido revestido por uma película castanho-avermelhada, em forma de cápsula, biconvexo. Marcação '2395' impressa em tinta preta em um lado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**8. POSOLOGIA E MODO DE USAR**

FoQ XR® é formulado para liberar 100% do seu princípio ativo, o cloridrato de metilfenidato, de uma maneira controlada, por um período de 10 horas. Na primeira hora, 22% do cloridrato de metilfenidato é liberado, seguido por uma taxa de liberação ascendente até que 100% do cloridrato de metilfenidato seja liberado após 10 horas.

FoQ XR® deve ser administrado por via oral, uma vez ao dia. Como o efeito é observado até 12 horas após a administração, o medicamento deve ser tomado pela manhã.

O comprimido revestido de liberação prolongada deve ser deglutido inteiro com um pouco de líquido,

e não deve ser mastigado, partido ou esmagado (vide “Advertências e precauções - Administração da dose”).

FoQ XR® pode ser administrado com ou sem alimentos (vide “Farmacocinética - Efeito de alimentos”).

A dose deve ser individualizada de acordo com a necessidade e a resposta do paciente.

A posologia deve ser ajustada em incrementos de 18mg até o máximo de 54mg/dia, em dose única diária, pela manhã para crianças com idade entre 6-12 anos e de 72mg/dia para adolescentes e adultos. Em geral, o aumento da dose pode ser realizado em intervalos de aproximadamente 1 semana.

#### Instruções para abrir o frasco



#### Pacientes que não estejam em uso de metilfenidato

A dose inicial de FoQ XR® recomendada para pacientes que não estejam em tratamento com metilfenidato ou para pacientes em uso de outros estimulantes é de 18mg, uma vez ao dia para crianças e adolescentes e 18 ou 36 mg, uma vez ao dia, para adultos.

#### Pacientes em tratamento com metilfenidato

A dose diária de FoQ XR® recomendada para pacientes que já estejam em uso de 5mg de cloridrato de metilfenidato duas ou três vezes ao dia é de 18mg. A dose diária de FoQ XR® recomendada para pacientes que estejam em uso de 10mg de cloridrato de metilfenidato duas ou três vezes ao dia é de 36mg. Em alguns casos, 54mg pode ser uma dose apropriada. As recomendações posológicas são baseadas na dose em uso e no julgamento clínico.

O julgamento clínico deve ser usado para selecionar a dose para pacientes que já estejam em tratamento com metilfenidato em outros regimes posológicos.

A dosagem deve ser individualizada de acordo com a resposta do paciente. A dose pode ser aumentada em 18mg em intervalos semanais.

A dose máxima diária de FoQ XR® é 54mg para crianças entre 6-12 anos e 72mg para adolescentes e adultos.

#### Tratamento prolongado/de manutenção

O uso prolongado do metilfenidato (mais de 4 semanas) não foi sistematicamente avaliado em estudos controlados. O médico que decidir utilizar FoQ XR® por período prolongado em pacientes com TDAH deve periodicamente reavaliar a utilidade do uso prolongado de FoQ XR® para cada paciente individualmente, com testes sem a medicação para avaliar o funcionamento do paciente sem a farmacoterapia.

#### Substituição de um produto de liberação prolongada de metilfenidato para outro

O perfil de eficácia e tolerabilidade de FoQ XR® durante o período de dosagem é determinado pelo perfil de liberação específica do produto. Outras formulações de liberação prolongada de metilfenidato com diferentes perfis de liberação podem apresentar diferentes perfis de eficácia e tolerabilidade. Se houver a substituição de um produto de liberação prolongada de metilfenidato para outro, recomenda-se que esta substituição seja realizada apenas sob supervisão médica.

#### Redução ou descontinuação da dose

Se ocorrer exacerbação paradoxal de sintomas ou outros eventos adversos, a dose deve ser reduzida, ou, se necessário, o medicamento deve ser descontinuado.

#### Populações especiais

##### Uso em crianças (menor que 6 anos)

O uso de FoQ XR® em crianças com menos de 6 anos não foi avaliado em estudos clínicos controlados. FoQ XR® não deve ser usado em crianças menores de 6 anos.

##### Uso em idosos (acima de 65 anos)

O uso de FoQ XR® em idosos acima de 65 anos não foi avaliado em ensaios clínicos controlados.

##### Insuficiência renal

Não há experiência com o uso de FoQ XR® em pacientes com insuficiência renal (vide “Farmacocinética - Populações especiais, insuficiência renal”).

##### Insuficiência hepática

Não há experiência com o uso de FoQ XR® em pacientes com insuficiência hepática.

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## 9. REAÇÕES ADVERSAS

Ao longo desta seção, as reações adversas são apresentadas.

As reações adversas são eventos adversos que foram considerados razoavelmente associados ao uso de cloridrato de metilfenidato, com base em avaliação abrangente da informação disponível de evento adverso. Uma relação causal com cloridrato de metilfenidato não pode ser seguramente estabelecida em casos individuais. Além disso, porque os ensaios clínicos são conduzidos sob condições amplamente diferentes, as taxas de reações adversas observadas nos estudos clínicos de um medicamento não podem ser diretamente comparadas com as taxas nos estudos clínicos de outro medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática clínica.

### Dados de estudos clínicos

#### Dados de estudos duplo-cegos - Relatos de reações adversas com frequência $\geq 1\%$ .

As reações adversas relevantes para população pediátrica e adulta estão mencionadas nas tabelas de reações adversas.

#### Pacientes pediátricos

A segurança de cloridrato de metilfenidato foi avaliada em 639 indivíduos (crianças e adolescentes) com TDAH que participaram de 4 estudos duplo-cegos controlados com placebo. As informações presentes nesta seção são provenientes dos dados desta pesquisa.

As reações adversas ao medicamento relatadas por  $\geq 1\%$  das crianças e pacientes adolescentes tratados com cloridrato de metilfenidato nestes estudos estão na Tabela 2.

| <b>Tabela 2: Reações adversas relatadas por <math>\geq 1\%</math> das crianças e adolescentes tratados com cloridrato de metilfenidato em 4 estudos duplo-cegos placebo controlados</b> |                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Sistemas/Órgãos</b><br>Reação Adversa                                                                                                                                                | <b>cloridrato de metilfenidato</b><br><b>(n=321)</b><br>% | <b>Placebo</b><br><b>(n=318)</b><br>% |
| <b>Infecções e infestações</b>                                                                                                                                                          |                                                           |                                       |
| Nasofaringite                                                                                                                                                                           | 2,8                                                       | 2,2                                   |
| <b>Distúrbios psiquiátricos</b>                                                                                                                                                         |                                                           |                                       |
| Insônia <sup>a</sup>                                                                                                                                                                    | 2,8                                                       | 0,3                                   |
| <b>Distúrbios do sistema nervoso</b>                                                                                                                                                    |                                                           |                                       |
| Tontura                                                                                                                                                                                 | 1,9                                                       | 0                                     |
| <b>Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino</b>                                                                                                                              |                                                           |                                       |
| Tosse                                                                                                                                                                                   | 1,9                                                       | 0,9                                   |
| Dor orofaríngea                                                                                                                                                                         | 1,2                                                       | 0,9                                   |
| <b>Distúrbio gastrointestinal</b>                                                                                                                                                       |                                                           |                                       |
| Dor abdominal superior                                                                                                                                                                  | 6,2                                                       | 3,8                                   |
| Vômito                                                                                                                                                                                  | 2,8                                                       | 1,6                                   |
| <b>Distúrbios gerais e condições no local da administração</b>                                                                                                                          |                                                           |                                       |
| Pirexia                                                                                                                                                                                 | 2,2                                                       | 0,9                                   |

<sup>a</sup> Os termos “insônia inicial” (cloridrato de metilfenidato = 0,6%) e “insônia” (cloridrato de metilfenidato = 2,2%) estão combinados como “insônia”.

A gravidade da maioria das reações adversas foi de leve a moderada.

#### Pacientes adultos

A segurança de cloridrato de metilfenidato foi avaliada em 905 pacientes adultos com TDAH que participaram de 3 estudos duplo-cegos controlados com placebo. As informações presentes nesta seção são provenientes da análise agrupada destes estudos.

As reações adversas relatadas por  $\geq 1\%$  dos pacientes adultos tratados com cloridrato de metilfenidato nestes estudos estão na Tabela 3.

| <b>Tabela 3: Reações adversas relatadas por <math>\geq 1\%</math> dos pacientes adultos tratados com cloridrato de metilfenidato em 3 estudos duplo-cegos controlados com placebo</b> |                                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sistemas/ Órgão</b>                                                                                                                                                                | <b>cloridrato de metilfenidato (n=596)</b> | <b>Placebo (n=309)</b> |
| <b>Reação Adversa</b>                                                                                                                                                                 | <b>%</b>                                   | <b>%</b>               |
| <b>Infecções e infestações</b>                                                                                                                                                        |                                            |                        |
| Infecção do trato respiratório superior                                                                                                                                               | 1,7                                        | 1,0                    |
| Sinusite                                                                                                                                                                              | 1,3                                        | 1,0                    |
| <b>Distúrbios do metabolismo e da nutrição</b>                                                                                                                                        |                                            |                        |
| Diminuição do apetite                                                                                                                                                                 | 24,8                                       | 6,1                    |
| Anorexia                                                                                                                                                                              | 4,2                                        | 1,3                    |
| <b>Distúrbios psiquiátricos</b>                                                                                                                                                       |                                            |                        |
| Insônia                                                                                                                                                                               | 13,3                                       | 7,8                    |
| Ansiedade                                                                                                                                                                             | 8,4                                        | 2,9                    |
| Insônia inicial                                                                                                                                                                       | 5,7                                        | 2,6                    |
| Humor depressivo                                                                                                                                                                      | 4,4                                        | 2,6                    |
| Inquietação                                                                                                                                                                           | 4,0                                        | 0                      |
| Agitação                                                                                                                                                                              | 3,2                                        | 0,6                    |
| Nervosismo                                                                                                                                                                            | 2,3                                        | 0,6                    |
| Bruxismo                                                                                                                                                                              | 1,5                                        | 0,6                    |
| Depressão                                                                                                                                                                             | 1,5                                        | 0,6                    |
| Labilidade do afeto                                                                                                                                                                   | 1,3                                        | 0,6                    |
| Diminuição da libido <sup>a</sup>                                                                                                                                                     | 1,5                                        | 0,6                    |
| Ataque de pânico                                                                                                                                                                      | 1,3                                        | 0,3                    |
| Tensão                                                                                                                                                                                | 1,3                                        | 0,3                    |
| Agressividade                                                                                                                                                                         | 1,2                                        | 0,6                    |
| Estado confusional                                                                                                                                                                    | 1,0                                        | 0,3                    |
| <b>Distúrbios do sistema nervoso</b>                                                                                                                                                  |                                            |                        |
| Cefaleia                                                                                                                                                                              | 24,2                                       | 18,8                   |
| Tontura                                                                                                                                                                               | 7,4                                        | 5,5                    |
| Tremor                                                                                                                                                                                | 3,4                                        | 0,6                    |
| Parestesia                                                                                                                                                                            | 1,2                                        | 0                      |
| Cefaleia tensional                                                                                                                                                                    | 1,0                                        | 0,3                    |
| <b>Distúrbios oculares</b>                                                                                                                                                            |                                            |                        |
| Distúrbios da acomodação visual                                                                                                                                                       | 1,3                                        | 0                      |
| Visão embaçada                                                                                                                                                                        | 1,3                                        | 1,0                    |
| <b>Distúrbios do labirinto e da audição</b>                                                                                                                                           |                                            |                        |
| Vertigem                                                                                                                                                                              | 2,0                                        | 0,3                    |
| <b>Distúrbios cardíacos</b>                                                                                                                                                           |                                            |                        |
| Taquicardia                                                                                                                                                                           | 6,0                                        | 0                      |
| Palpitação                                                                                                                                                                            | 4,5                                        | 0,6                    |
| <b>Distúrbios vasculares</b>                                                                                                                                                          |                                            |                        |
| Hipertensão                                                                                                                                                                           | 2,2                                        | 1,6                    |
| Ondas de calor                                                                                                                                                                        | 1,3                                        | 0,6                    |

|                                                                |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|
| <b>Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino</b>     |      |     |
| Dor orofaríngea                                                | 1,5  | 1,3 |
| Tosse                                                          | 1,2  | 1,0 |
| Dispneia                                                       | 1,2  | 0,6 |
| <b>Distúrbios gastrintestinais</b>                             |      |     |
| Boca seca                                                      | 15,1 | 3,6 |
| Náusea                                                         | 14,3 | 4,9 |
| Dispepsia                                                      | 2,0  | 1,9 |
| Vômito                                                         | 1,8  | 0,6 |
| Constipação                                                    | 1,5  | 0,6 |
| <b>Distúrbios da pele e tecido subcutâneo</b>                  |      |     |
| Hiperidrose                                                    | 5,7  | 1,3 |
| <b>Distúrbios musculoesquelético e do tecido conectivo</b>     |      |     |
| Rigidez muscular                                               | 1,3  | 0   |
| Espasmo muscular                                               | 1,0  | 0,3 |
| <b>Distúrbios do sistema reprodutor e das mamas</b>            |      |     |
| Disfunção erétil                                               | 1,0  | 0,3 |
| <b>Distúrbios gerais e condições no local da administração</b> |      |     |
| Irritabilidade                                                 | 5,2  | 2,9 |
| Fadiga                                                         | 4,7  | 4,2 |
| Sede                                                           | 1,8  | 0,6 |
| Astenia                                                        | 1,2  | 0   |
| <b>Investigações</b>                                           |      |     |
| Perda de peso                                                  | 8,7  | 3,6 |
| Aumento da frequência cardíaca                                 | 3,0  | 1,9 |
| Aumento da pressão sanguínea                                   | 2,5  | 1,9 |
| Aumento da alanina aminotransferase                            | 1,0  | 0   |

<sup>a</sup> A reação adversa “Diminuição da libido” inclui o termo preferencial “Perda da libido”.

A gravidade da maioria das reações adversas foi de leve a moderada.

#### Estudos abertos - Relatos de reações adversas com frequência $\geq 1\%$

A segurança de cloridrato de metilfenidato foi avaliada em 3.782 pacientes pediátricos e adultos com TDAH que participaram de 12 estudos abertos. As informações presentes nesta seção são provenientes dos dados agrupados destas pesquisas.

As reações adversas relatadas por  $\geq 1\%$  dos pacientes tratados com cloridrato de metilfenidato não listadas nas Tabelas 2 e 3 estão listadas na Tabela 4.

| <b>Tabela 4: Reações adversas relatadas por <math>\geq 1\%</math> dos pacientes tratados com cloridrato de metilfenidato em 12 estudos clínicos abertos.</b> |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemas/ Órgãos</b><br><b>Reação Adversa</b>                                                                                                             | <b>cloridrato de metilfenidato</b><br><b>(n=3782)</b><br><b>%</b> |
| <b>Distúrbios psiquiátricos</b>                                                                                                                              |                                                                   |
| Tique                                                                                                                                                        | 2,0                                                               |
| Oscilação de humor                                                                                                                                           | 1,1                                                               |
| <b>Distúrbios do sistema nervoso</b>                                                                                                                         |                                                                   |
| Sonolência                                                                                                                                                   | 1,0                                                               |
| <b>Distúrbios gastrintestinais</b>                                                                                                                           |                                                                   |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Diarreia                                                       | 2,4 |
| Desconforto abdominal                                          | 1,3 |
| Dor abdominal                                                  | 1,2 |
| <b>Distúrbios da pele e tecido subcutâneo</b>                  |     |
| Erupção cutânea                                                | 1,3 |
| <b>Distúrbios gerais e condições no local da administração</b> |     |
| Tensão emocional                                               | 1,4 |

A gravidade da maioria das reações adversas foi de leve a moderada.

#### Dados de estudo duplo-cego e aberto – Relatos de reações adversas com frequência < 1%

Reações adversas adicionais que ocorreram em < 1% dos pacientes pediátricos e adultos tratados com cloridrato de metilfenidato em estudos duplo-cegos e abertos; os dados foram listados na Tabela 5.

| <b>Tabela 5: Reações adversas relatadas por &lt; 1% dos pacientes pediátricos e adultos tratados com cloridrato de metilfenidato tanto nos estudos clínicos duplo-cegos quanto nos abertos.</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Sistema/ Classe de órgão</b>                                                                                                                                                                 |  |
| Reação adversa ao medicamento                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Distúrbios do sangue e sistema linfático</b>                                                                                                                                                 |  |
| Leucopenia                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Distúrbios psiquiátricos</b>                                                                                                                                                                 |  |
| Raiva, distúrbios do sono, hipervigilância, pranto, humor alterado                                                                                                                              |  |
| <b>Distúrbios do sistema nervoso</b>                                                                                                                                                            |  |
| Hiperatividade psicomotora, sedação, letargia                                                                                                                                                   |  |
| <b>Distúrbios oculares</b>                                                                                                                                                                      |  |
| Olhos secos                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Distúrbios da pele e tecido subcutâneo</b>                                                                                                                                                   |  |
| Erupção cutânea macular                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Investigações</b>                                                                                                                                                                            |  |
| Sopro cardíaco                                                                                                                                                                                  |  |

A gravidade da maioria das reações adversas foi de leve a moderada.

#### Dados de pós-comercialização

As reações adversas identificadas durante a experiência de pós-comercialização com cloridrato de metilfenidato estão descritas na Tabela 6. Nesta tabela as frequências são apresentadas de acordo com a seguinte convenção:

Muito comum  $\geq 1/10$  ( $\geq 10\%$ )

Comum  $\geq 1/100$  e  $< 1/10$  ( $\geq 1\%$  e  $< 10\%$ )

Incomum  $\geq 1/1.000$  e  $< 1/100$  ( $\geq 0,1\%$  e  $< 1\%$ )

Rara  $\geq 1/10.000$  e  $< 1/1.000$  ( $\geq 0,01\%$  e  $< 0,1\%$ )

Muito rara  $< 1/10.000$  ( $< 0,01\%$ ), incluindo relatos isolados

Desconhecida Não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis.

| <b>Tabela 6. Reações adversas identificadas durante a experiência de pós-comercialização com cloridrato de metilfenidato</b> |                                                                                  |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema/ Classe de Órgão</b>                                                                                              | <b>Frequência de categoria estimada a partir de taxas de relatos espontâneos</b> | <b>Frequência de categoria estimada a partir de estudos clínicos com cloridrato de metilfenidato</b> |
| <b>Reações Adversas</b>                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                      |
| <b>Distúrbios do sangue e do sistema linfático</b>                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      |
| Pancitopenia                                                                                                                 | Muito rara                                                                       | Desconhecida                                                                                         |
| Trombocitopenia                                                                                                              | Muito rara                                                                       | Desconhecida                                                                                         |
| Púrpura trombocitopênica                                                                                                     | Muito rara                                                                       | Desconhecida                                                                                         |
| <b>Distúrbios do sistema imunológico</b>                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Reações de hipersensibilidade tais como angioedema, reações anafiláticas, edema auricular, condições bolhosas, condições esfoliativas, urticária, prurido não classificado em outra parte, erupções cutâneas, erupções e exantemas não classificados em outra parte | Rara       | Incomum      |
| <b>Distúrbios psiquiátricos</b>                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Desorientação                                                                                                                                                                                                                                                       | Muito rara | Rara         |
| Alucinação                                                                                                                                                                                                                                                          | Muito rara | Desconhecida |
| Alucinação auditiva                                                                                                                                                                                                                                                 | Muito rara | Rara         |
| Alucinação visual                                                                                                                                                                                                                                                   | Muito rara | Desconhecida |
| Mania                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito rara | Incomum      |
| Logorreia                                                                                                                                                                                                                                                           | Muito rara | Incomum      |
| Distúrbios da libido*                                                                                                                                                                                                                                               | Muito rara | Desconhecida |
| <b>Distúrbios do sistema nervoso</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| Convulsão                                                                                                                                                                                                                                                           | Muito rara | Desconhecida |
| Convulsão do tipo grande mal                                                                                                                                                                                                                                        | Muito rara | Desconhecida |
| Distúrbio cerebrovascular (incluindo vasculite cerebral, hemorragia cerebral, arterite cerebral, oclusão vascular cerebral)                                                                                                                                         | Muito rara | Desconhecida |
| Discinesia                                                                                                                                                                                                                                                          | Muito rara | Incomum      |
| <b>Distúrbios oculares</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |
| Diplopia                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito rara | Rara         |
| Midríase                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito rara | Rara         |
| Insuficiência visual                                                                                                                                                                                                                                                | Muito rara | Rara         |
| <b>Distúrbios cardíacos</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |
| Angina pectoris                                                                                                                                                                                                                                                     | Muito rara | Rara         |
| Bradicardia                                                                                                                                                                                                                                                         | Muito rara | Desconhecida |
| Extrassístoles                                                                                                                                                                                                                                                      | Muito rara | Rara         |
| Taquicardia supraventricular                                                                                                                                                                                                                                        | Muito rara | Desconhecida |
| Extrassístole ventricular                                                                                                                                                                                                                                           | Muito rara | Rara         |
| <b>Distúrbios vasculares</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| Fenômeno de Raynaud                                                                                                                                                                                                                                                 | Muito rara | Desconhecida |
| <b>Distúrbios Respiratórios, Torácicos e do Mediastino</b>                                                                                                                                                                                                          |            |              |
| Epistaxe                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito rara | Rara         |
| <b>Distúrbios hepatobiliares</b>                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Aumento da fosfatase alcalina sérica                                                                                                                                                                                                                                | Muito rara | Desconhecida |
| Aumento da bilirrubina sanguínea                                                                                                                                                                                                                                    | Muito rara | Incomum      |
| Aumento das enzimas hepáticas                                                                                                                                                                                                                                       | Muito rara | Incomum      |
| Lesão hepatocelular                                                                                                                                                                                                                                                 | Muito rara | Desconhecida |
| Insuficiência hepática aguda                                                                                                                                                                                                                                        | Muito rara | Desconhecida |
| <b>Distúrbios da pele e tecido subcutâneo</b>                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Alopecia                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito rara | Incomum      |
| Eritema                                                                                                                                                                                                                                                             | Muito rara | Rara         |
| <b>Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo</b>                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| Artralgia                                                                                                                                                                                                                                                           | Muito rara | Comum        |
| Mialgia                                                                                                                                                                                                                                                             | Muito rara | Comum        |
| Contrações musculares                                                                                                                                                                                                                                               | Muito rara | Incomum      |
| Trismo                                                                                                                                                                                                                                                              | Muito rara | Desconhecida |
| <b>Distúrbios do sistema reprodutivo e das mamas</b>                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| Priapismo                                                                                                                                                                                                                                                           | Muito rara | Desconhecida |
| Ginecomastia                                                                                                                                                                                                                                                        | Muito rara | Rara         |
| <b>Distúrbios gerais e condições no local da administração</b>                                                                                                                                                                                                      |            |              |

|                                       |            |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Diminuição da resposta terapêutica    | Rara       | Desconhecida |
| Dor no peito                          | Muito rara | Incomum      |
| Desconforto peitoral                  | Muito rara | Incomum      |
| Diminuição da resposta ao fármaco     | Muito rara | Incomum      |
| Hiperpirexia                          | Muito rara | Desconhecida |
| <b>Investigações</b>                  |            |              |
| Diminuição da contagem de plaquetas   | Muito rara | Desconhecida |
| Contagem anormal dos glóbulos brancos | Muito rara | Desconhecida |

\* A reação adversa de “Distúrbios da libido” inclui termos além daqueles associados à diminuição da libido.

**Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa**

## 10. SUPERDOSE

### Sinais e sintomas

Sinais e sintomas de superdose de FoQ XR<sup>®</sup>, resultantes principalmente de hiperestimulação do Sistema Nervoso Central e de efeitos simpatomiméticos excessivos, podem incluir: vômito, agitação, mioclonias, convulsões, crise do tipo grande mal, estado confusional, alucinações (auditiva e/ou visual), hiperidrose, cefaleia, pirexia, taquicardia, palpitações, aumento da frequência cardíaca, arritmia sinusal, hipertensão arterial, midríase e boca seca.

### Tratamento

O tratamento consiste em medidas adequadas de suporte. O paciente deve ser protegido contra automutilação e de estímulos externos que possam agravar a hiperestimulação já existente. A eficácia do carvão ativado não foi estabelecida. Monitoração em terapia intensiva deve ser adotada para manter a circulação e a respiração adequadas. Procedimentos de resfriamento externo podem ser necessários para controlar a hipertermia.

A eficácia da diálise peritoneal ou hemodiálise extracorpórea não está estabelecida para o tratamento de superdose de FoQ XR<sup>®</sup>.

A liberação prolongada de metilfenidato dos comprimidos de FoQ XR<sup>®</sup> deve ser considerada ao se tratarem pacientes que ingeriram dose excessiva do medicamento.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações**



### III – DIZERES LEGAIS:

Registro: 1.7817.0937

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO - ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA**



**Importado e Registrado por: Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.**

Rua Bonnard (Green Valley I) n° 980 - Bloco 12 - Nível 3 - Sala A - Alphaville Empresarial  
Barueri - SP - CEP 06465-134 - C.N.P.J.: 61.082.426/0002-07

**Produzido por: Balkanpharma Dupnitsa AD**

Dupnitsa - Bulgária



**Anexo B**  
**Histórico de alteração da bula**

| Dados da submissão eletrônica |                  |                                                                                               | Dados da petição/notificação que altera bula |                  |                                                                                               |                   | Dados das alterações de bulas                                                   |                  |                            |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Data do expediente            | Nº do expediente | Assunto                                                                                       | Data do expediente                           | Nº do expediente | Assunto                                                                                       | Data de aprovação | Itens de bula                                                                   | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas |
| 01/03/2024                    | 0254940/24-2     | 10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12                               | 01/03/2024                                   | 0254940/24-2     | 10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12                               | 01/03/2024        | VERSÃO INICIAL                                                                  | VP/VPS           | Comprimido revestido       |
| 27/05/2025                    |                  | 10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12 | 27/05/2025                                   |                  | 10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12 | 27/05/2025        | 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>III – DIZERES LEGAIS | VP               | Comprimido revestido       |
|                               |                  |                                                                                               |                                              |                  |                                                                                               |                   | 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES<br><br>III – DIZERES LEGAIS                        | VPS              |                            |